NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR1100798 - La Bassée

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 10
6. GESTION DU SITE ..... 11

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR1100798

### 1.3 Appellation du site

La Bassée

### 1.4 Date de compilation

30/09/1998

### 1.5 Date d'actualisation

25/10/2024

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Ile-de-France | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/04/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028902751

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 3,28333°

**Latitude :** 48,45°

## 2.2 Superficie totale

1403 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 11 | Ile-de-France |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 77 | Seine-et-Marne | 100 % |
| | | % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 77019 | BALLOY |
| 77025 | BAZOCHES-LES-BRAY |
| 77133 | COURCELLES-EN-BASSEE |
| 77167 | EGLIGNY |
| 77174 | EVERLY |
| 77208 | GOUAIX |
| 77218 | GRISY-SUR-SEINE |
| 77227 | HERME |
| 77236 | JAULNES |
| 77279 | MAROLLES-SUR-SEINE |
| 77289 | MELZ-SUR-SEINE |
| 77305 | MONTEREAU-FAULT-YONNE |
| 77325 | MOUY-SUR-SEINE |
| 77341 | NOYEN-SUR-SEINE |
| 77347 | ORMES-SUR-VOULZIE |

| | |
|---|---|
| 77434 | SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY |
| 77467 | TOMBE |
| 77522 | VILLIERS-SUR-SEINE |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (79%)
Continentale (21%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3110<br>*Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)* | | 0,14<br>*(0,01 %)* | | P | D | | | |
| 3130<br>*Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea* | | 0,14<br>*(0,01 %)* | | P | D | | | |
| 3140<br>*Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.* | | 0,14<br>*(0,01 %)* | | M | C | C | B | C |
| 3150<br>*Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition* | | 28,08<br>*(2 %)* | | M | B | C | B | B |
| 3260<br>*Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion* | | 0,51<br>*(0,04 %)* | | P | C | C | C | C |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 2,81<br>*(0,2 %)* | | M | C | C | B | C |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 2,81<br>*(0,2 %)* | | M | C | C | C | C |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 12,64<br>*(0,9 %)* | | M | C | C | C | C |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 1,4<br>*(0,1 %)* | | M | C | C | C | C |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 277,99<br>*(19,8 %)* | | M | A | C | C | B |
| 91F0<br>*Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)* | | 668,3<br>*(47,6 %)* | | M | A | C | B | B |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».

- **Superficie relative :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1016 | *Vertigo moulinsiana* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| I | 1041 | *Oxygastra curtisii* | p | 200 | 327 | i | | G | C | C | C | C |
| I | 1044 | *Coenagrion mercuriale* | p | 1 | 25 | i | R | G | C | B | B | B |
| I | 1060 | *Lycaena dispar* | p | | | i | P | P | D | | | |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| X | 1096 | *Lampetra planeri* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| X | 1149 | *Cobitis taenia* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| A | 1166 | *Triturus cristatus* | p | 4 | 5 | i | R | M | C | B | B | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | p | | | i | P | M | C | C | C | C |
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | p | | | i | P | M | D | | | |
| M | 1321 | *Myotis emarginatus* | p | | | i | P | M | C | B | C | C |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | p | | | i | P | P | C | C | C | C |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | p | | | i | P | P | C | C | C | C |
| X | 5315 | *Cottus perifretum* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| X | 5339 | *Rhodeus amarus* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| A | | *Hyla arborea* | | | i | R | X | | X | | X | |
| B | | *Milvus migrans* | | | i | V | | | X | | X | |
| B | | *Streptopelia turtur* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Lanius collurio* | | | i | V | | | X | | X | |
| B | | *Lanius excubitor* | | | i | V | | | X | | X | |
| B | | *Saxicola rubetra* | | | i | R | | | X | | X | |
| B | | *Turdus pilaris* | | | i | V | | | X | | X | |
| B | | *Acrocephalus palustris* | | | i | R | | | X | | X | |
| B | | *Sylvia curruca* | | | i | R | | | X | | X | |
| I | | *Carcharodus alceae* | | | | | | | | | | X |
| I | | *Melanargia galathea* | | | | | | | | | | X |
| I | | *Apatura ilia* | | | | | | | | | | X |
| I | | *Aporia crataegi* | | | i | V | | | X | | | |
| I | | *Proserpinus proserpina* | | | | P | X | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | *Calopteryx virgo* | | | | | | | | | | X |
| I | | *Onychogomphus forcipatus* | | | | | | | | | | X |
| I | | *Libellula fulva* | | | | | | | | | | X |
| I | | *Leucorrhinia caudalis* | | | | | X | | | | X | |
| I | | *Mantis religiosa* | | | i | R | | | | | | X |
| I | | *Ruspolia nitidula* | | | i | V | | | | | | X |
| I | | *Pieris mannii* | | | i | V | | | X | | | |
| I | | *Chlaeniellus tristis* | | | i | V | | | | | | X |
| I | | *Roeseliana roeselii* | | | | | | | | | | X |
| M | | *Eptesicus serotinus* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Myotis mystacinus* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Myotis nattereri* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Nyctalus leisleri* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Nyctalus noctula* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Pipistrellus pipistrellus* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Pipistrellus nathusii* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Plecotus auritus* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Plecotus austriacus* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Pipistrellus kuhlii* | | | | P | X | | | | X | X |
| M | | *Myotis daubentonii* | | | | P | X | | | | X | X |
| P | | *Allium angulosum* | | | i | V | | | | | | X |
| P | | *Gratiola officinalis* | | | i | V | | | | | | X |
| P | | *Inula britannica* | | | i | V | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Lathyrus palustris* | | | i | V | | | | | | X |
| P | | *Ranunculus lingua* | | | i | V | | | | | | X |
| P | | *Sanguisorba officinalis* | | | i | R | | | | | | X |
| P | | *Sisymbrella aspera* | | | i | V | | | | | | X |
| P | | *Stellaria palustris* | | | i | V | | | | | | X |
| P | | *Viola elatior* | | | i | R | | | | | | X |
| P | | *Vitis sylvestris* | | | i | V | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 5 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 5 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 2 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 3 % |
| N15 : Autres terres arables | 10 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 75 % |

### Autres caractéristiques du site

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques: 90% pour le domaine atlantique et 10% pour le domaine continental.

Vulnérabilité
: La richesse biologique de la Bassée est menacée par diverses opérations d'aménagement des milieux : mise au gabarit de la Seine et régularisation de son débit, régression des prairies, multiplication des exploitations de granulats alluvionnaires... Le périmètre retenu correspond à un noyau de biotopes encore peu artificialisés et dont la protection est une absolue nécessité.

## 4.2 Qualité et importance

La Bassée est une vaste plaine alluviale de la Seine. Elle abrite la plus grande et l'une des dernières forêts alluviales du Bassin parisien ainsi qu'un ensemble relictuel de prairies humides. Elle présente aussi un réseau de noues et de milieux palustres d'un grand intérêt écologique.
Elle se caractérise par une flore originale pour la région parisienne, constituée d'espèces en aire disjointe ou en limite d'aire (médio-européenne notamment).

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A02 | Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes ) | | I |
| H | B02.02 | Coupe forestière (éclaircie, coupe rase ) | | I |
| H | C01.01 | Extraction de sable et graviers | | I |
| H | J02.05 | Modifications du fonctionnement hydrographique | | I |
| H | J02.07 | Captage des eaux souterraines | | I |
| M | B01.02 | Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) | | I |
| M | B02.04 | Elimination des arbres morts ou dépérissants | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M | D03.02 | Voies de navigation | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 85 % |
| Domaine public de l'état | 15 % |

## 4.5 Documentation

Ecosphère, 1995 - Projet de création d'une réserve naturelle dans la Bassée (Seine-et-Marne). DIREN Ile-de-France. 78 p.
Ecosphère, 2005 - Document d'objectifs du site Natura 2000 FR 1100798 dénommé "la Bassée". DIREN Ile-de-France.
Ecosphère, 2005 - Plan de gestion de la réserve naturelle de la Bassée (Seine-et-Marne). DIREN Ile-de-France.

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 15 | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 1 % |
| 36 | Réserve naturelle nationale | 70 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 1 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 36 | Réserve Naturelle Nationale de la Bassée | + | 70% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

## 5.3 Désignation du site

# 6. GESTION DU SITE

## 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Association de Gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée (AGRENABA)

Adresse : 1 rue de l'église 77114 Gouaix

Courriel : labassee@espaces-naturels.fr

Organisation :

Adresse :

Courriel :

## 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Atlas cartographique -DOCUMENT D#OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR1100798 « LA BASSEE »
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/451_DOCOB_SIC_Bassee_Atlas_cle7a4357.pdf
Nom : DOCUMENT D#OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR1100798 « LA BASSEE » Tome 1
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/451_DOCOB_SIC_Bassee_Tome1_cle763d7d.pdf
Nom : DOCUMENT D#OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR1100798 « LA BASSEE » Tome 2
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/451_DOCOB_SIC_Bassee_Tome2_cle7831a5.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

## 6.3 Mesures de conservation