NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2200347 - Marais arrière-littoraux picards

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 18
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 20
6. GESTION DU SITE 21

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR2200347

1.3 Appellation du site

Marais arrière-littoraux picards

1.4 Date de compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

17/10/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Picardie	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.picardie.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 02/02/2024
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/06/2024

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049859047

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,67167°

Latitude : 50,31167°

2.2 Superficie totale

1687 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
22	Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
80	Somme	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
80030	ARRY
80087	BERNAY-EN-PONTHIEU
80303	FAVIERES
80332	FOREST-MONTIERS
80580	NAMPONT
80600	NOYELLES-SUR-MER
80633	PONTHOILE
80649	QUEND
80665	REGNIERE-ECLUSE
80688	RUE
80787	VERCOURT
80806	VILLERS-SUR-AUTHIE
80815	VRON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		1 *(0,06 %)*		M	A	C	A	B
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		1 *(0,06 %)*		M	A	C	A	B
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		8,74 *(0,52 %)*		M	A	C	A	A
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		3,39 *(0,2 %)*		M	A	C	A	B
3160 *Lacs et mares dystrophes naturels*		0,07 *(0 %)*		G	A	C	A	A
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		0,05 *(0 %)*		M	C	C	B	C
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	0,25 *(0,01 %)*		G	A	C	B	B
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		2,37 *(0,14 %)*		M	A	C	A	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		81 *(4,8 %)*		M	B	C	B	C
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		1 *(0,06 %)*		M	B	C	B	C
7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae*	X	4,55 *(0,27 %)*		M	A	C	A	A
7230 *Tourbières basses alcalines*		30,57 *(1,81 %)*		M	A	C	A	A
91E0	X	27,33		P	B	C	B	B

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		*(1,62 %)*						
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		5 *(0,3 %)*		M	A	C	A	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1014	*Vertigo angustior*	p			i	P	DD	C	C	C	C
I	1016	*Vertigo moulinsiana*	p			i	P	DD	C	C	C	C
F	1096	*Lampetra planeri*	p			i	P	DD	C	C	C	C
F	1163	*Cottus gobio*	p			i	P	DD	C	C	C	C
A	1166	*Triturus cristatus*	p			i	P	DD	C	B	C	B
M	1321	*Myotis emarginatus*	r	15	15	i	P	M	C	C	C	C
P	1614	*Helosciadium repens*	p			i	P	M	C	C	C	C
F	5315	*Cottus perifretum*	p			i	P	DD	C	C	C	C
I	6199	*Euplagia quadripunctaria*	p			i	P	DD	C	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».

- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Triturus alpestris*				P						X
A		*Bufo calamita*				P	X					X
A		*Hyla arborea*			i	P	X		X		X	
A		*Rana arvalis*				P	X		X		X	
A		*Lissotriton vulgaris*				P					X	
B		*Podiceps cristatus*				P					X	
B		*Tachybaptus ruficollis*				P					X	
B		*Anas penelope*				P					X	
B		*Anas strepera*				P					X	
B		*Anas crecca*				P			X		X	
B		*Anas platyrhynchos*				C					X	
B		*Anas clypeata*				P					X	
B		*Anas acuta*				P					X	
B		*Anas querquedula*	0	5	p	P			X		X	
B		*Aythya ferina*				P					X	
B		*Aythya fuligula*				P					X	
B		*Phalacrocorax carbo sinensis*	300	400	p	C					X	
B		*Botaurus stellaris*	1	5	i	R			X		X	

B		*Ixobrychus minutus*	0	2	males	V					X	
B		*Nycticorax nycticorax*	0	1	i	V			X		X	
B		*Bubulcus ibis*	0	8	i	P					X	
B		*Egretta garzetta*	1	40	i	C					X	
B		*Egretta alba*	1	40	i	C						X
B		*Ardea cinerea*				C					X	
B		*Ardea purpurea*	0	1	i	V					X	
B		*Ciconia nigra*	0	1	i	V			X		X	
B		*Ciconia ciconia*	0	10	i	R					X	
B		*Platalea leucorodia*	0	3	i	R			X		X	
B		*Philomachus pugnax*	0	1	i	P					X	
B		*Lymnocryptes minimus*				P					X	
B		*Gallinago gallinago*				C			X		X	
B		*Gallinago media*				P						
B		*Scolopax rusticola*				P					X	
B		*Numenius arquata*				P			X		X	
B		*Tringa totanus*				P					X	
B		*Tringa nebularia*				P					X	
B		*Tringa ochropus*				P					X	
B		*Tringa glareola*	1	5	i	P					X	
B		*Actitis hypoleucos*				P					X	
B		*Buteo buteo*				P					X	
B		*Pandion haliaetus*	0	2	i	V			X		X	

B		*Falco tinnunculus*				P					X	
B		*Falco columbarius*	0	1	p	P					X	
B		*Falco subbuteo*				P					X	
B		*Cygnus olor*				C					X	
B		*Anser anser*				P			X		X	
B		*Tadorna tadorna*	0	2	p	P					X	
B		*Bucephala clangula*				P					X	
B		*Pernis apivorus*	1	2	i	P					X	
B		*Milvus migrans*	0	1	i	P					X	
B		*Circus aeruginosus*	6	10	p	P			X		X	
B		*Circus cyaneus*	5	10	i	P					X	
B		*Circus pygargus*	1	8	i	P			X		X	
B		*Accipiter gentilis*				P					X	
B		*Accipiter nisus*				P					X	
B		*Falco peregrinus*	0	1	i	P			X		X	
B		*Rallus aquaticus*				C					X	
B		*Porzana porzana*	5	10	cmales	P					X	
B		*Porzana parva*	0	1	cmales	V			X		X	
B		*Porzana pusilla*	0	1	cmales	V			X		X	
B		*Gallinula chloropus*				C					X	
B		*Fulica atra*				C					X	
B		*Haematopus ostralegus*	0	2	p	P					X	
B		*Himantopus himantopus*	4	10	p	P					X	

B		*Recurvirostra avosetta*	0	50	i	P					X	
B		*Charadrius dubius*				P					X	
B		*Pluvialis apricaria*	15	600	i	P					X	
B		*Vanellus vanellus*				P					X	
B		*Larus melanocephalus*	0	20	i	P						X
B		*Larus fuscus*				P					X	
B		*Larus argentatus*				P					X	
B		*Sterna hirundo*	0	1	i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	15	30	p	P			X		X	
B		*Tyto alba*				P					X	
B		*Athene noctua*				P					X	
B		*Strix aluco*				P					X	
B		*Asio flammeus*	0	5	i	P			X		X	
B		*Alcedo atthis*	0	3	i	P					X	
B		*Picus viridis*				P					X	
B		*Dryocopus martius*	0	2	i	R					X	
B		*Dendrocopos major*				P					X	
B		*Dendrocopos minor*				P					X	
B		*Riparia riparia*				P					X	
B		*Hirundo rustica*				P					X	
B		*Anthus pratensis*				P			X		X	
B		*Motacilla flava*				P					X	
B		*Parus caeruleus*				P					X	

B		*Parus major*				P					X	
B		*Sitta europaea*				P					X	
B		*Certhia brachydactyla*				P					X	
B		*Oriolus oriolus*				P					X	
B		*Lanius excubitor*				P			X		X	
B		*Motacilla alba*				P					X	
B		*Troglodytes troglodytes*				P					X	
B		*Prunella modularis*				P					X	
B		*Erithacus rubecula*				P					X	
B		*Luscinia megarhynchos*				P					X	
B		*Luscinia svecica*	70	90	p	C					X	
B		*Saxicola rubetra*				P			X		X	
B		*Turdus pilaris*				P					X	
B		*Cettia cetti*				P					X	
B		*Locustella naevia*				P					X	
B		*Locustella luscinioides*	15	40	p	P			X		X	
B		*Acrocephalus palustris*				P					X	
B		*Acrocephalus scirpaceus*				P					X	
B		*Hippolais icterina*				P			X		X	
B		*Sylvia curruca*				P					X	
B		*Sylvia communis*				P					X	
B		*Sylvia borin*				P					X	
B		*Sylvia atricapilla*				P					X	

B		*Phylloscopus collybita*				P					X	
B		*Phylloscopus trochilus*				P					X	
B		*Muscicapa striata*				P			X		X	
B		*Panurus biarmicus*				P					X	
B		*Parus palustris*				P					X	
B		*Parus montanus*				P					X	
B		*Parus ater*				P					X	
B		*Carduelis chloris*				P					X	
B		*Carduelis carduelis*				P					X	
B		*Carduelis spinus*				P					X	
B		*Carduelis cannabina*				P			X		X	
B		*Pyrrhula pyrrhula*				P			X		X	
B		*Emberiza citrinella*				P					X	
B		*Emberiza schoeniclus*				P					X	
B		*Delichon urbicum*				P					X	
B		*Saxicola torquatus*				P					X	
F		*Anguilla anguilla*				P			X		X	
F		*Esox lucius*				P			X			
F		*Salmo trutta*				P						X
I		*Ischnura pumilio*				P						X
I		*Coenagrion pulchellum*				P			X			
I		*Ceriagrion tenellum*				P						X
I		*Lestes sponsa*				P						X

I		*Sympetrum danae*				P						X
I		*Somatochlora flavomaculata*				P						X
I		*Stethophyma grossum*				P						X
I		*Conocephalus dorsalis*				P						X
I		*Gryllotalpa gryllotalpa*				P						X
I		*Tetrix ceperoi*				P						X
I		*Chrysochraon dispar*				P						X
I		*Chorthippus albomarginatus*				P						X
I		*Chorthippus montanus*				P						X
I		*Aeshna isoceles*				P						X
M		*Eptesicus serotinus serotinus*			i	P						X
M		*Nyctalus noctula*				P	X					X
M		*Pipistrellus pipistrellus*				P	X					X
M		*Pipistrellus nathusii*				P						X
M		*Myotis daubentonii*				P						X
P		*Scorpidium scorpioides*			i	P						X
P		*Nitella translucens*				P						X
P		*Aira praecox*				P						X
P		*Alisma lanceolatum*				P						X
P		*Alopecurus aequalis*				P						X
P		*Althaea officinalis*				P						X
P		*Anagallis tenella*			i	P						X
P		*Apium inundatum*				P						X

P		*Baldellia ranunculoides*				P						X
P		*Bidens cernua*				P						X
P		*Blysmus compressus*			i	P						X
P		*Bromus racemosus*				P						X
P		*Calamagrostis canescens*			i	P						X
P		*Callitriche hamulata*				P						X
P		*Caltha palustris*				P						X
P		*Carex appropinquata*			i	P						X
P		*Carex diandra*			i	P						X
P		*Carex distans*			i	P						X
P		*Carex hostiana*			i	P						X
P		*Carex lasiocarpa*			i	P						X
P		*Carex lepidocarpa*				P						X
P		*Carex limosa*			i	P						X
P		*Carex nigra*				P						X
P		*Carex panicea*			i	P						X
P		*Carex pseudocyperus*				P						X
P		*Carex pulicaris*			i	P						X
P		*Carex rostrata*			i	P						X
P		*Catabrosa aquatica*			i	P						X
P		*Chenopodium rubrum*				P						X
P		*Cirsium dissectum*			i	P						X
P		*Cladium mariscus*			i	P						X

P		*Cyperus fuscus*			i	P						X
P		*Dactylorhiza fistulosa*			i	P						X
P		*Dactylorhiza incarnata*			i	P			X			
P		*Dactylorhiza praetermissa*			i	P			X			
P		*Danthonia decumbens*				P						X
P		*Daphne laureola*				P						X
P		*Digitalis purpurea*				P						X
P		*Eleocharis acicularis*			i	P						X
P		*Eleocharis quinqueflora*			i	P						X
P		*Eleocharis uniglumis*			i	P						X
P		*Eleogiton fluitans*			i	P						X
P		*Epilobium palustre*			i	P						X
P		*Epipactis palustris*			i	P			X			
P		*Equisetum fluviatile*				P						X
P		*Eriophorum latifolium*			i	P						X
P		*Eriophorum polystachion*			i	P						X
P		*Filago vulgaris*			i	P						X
P		*Galium saxatile*			i	P						X
P		*Galium uliginosum*				P						X
P		*Genista anglica*			i	P						X
P		*Groenlandia densa*			i	P						X
P		*Helosciadium repens*			i	P					X	
P		*Hippuris vulgaris*			i	P						X

P		*Hottonia palustris*				P						X
P		*Hydrocharis morsus-ranae*				P						X
P		*Hydrocotyle vulgaris*				P						X
P		*Hypochaeris glabra*				P						X
P		*Isolepis fluitans*				P						X
P		*Juncus acutiflorus*				P						X
P		*Juncus bulbosus*			i	P						X
P		*Juncus compressus*			i	P						X
P		*Juncus subnodulosus*				P						X
P		*Lathyrus palustris*			i	P						X
P		*Lemna gibba*				P						X
P		*Leontodon saxatilis*				P						X
P		*Littorella uniflora*			i	P						X
P		*Lychnis flos-cuculi*				P						X
P		*Lythrum portula*				P						X
P		*Menyanthes trifoliata*			i	P						X
P		*Montia minor*				P						X
P		*Myriophyllum alterniflorum*			i	P						X
P		*Myriophyllum verticillatum*			i	P						X
P		*Nasturtium microphyllum*				P						X
P		*Oenanthe aquatica*				P						X
P		*Oenanthe fistulosa*				P						X
P		*Oenanthe lachenalii*			i	P						X

P		*Ophioglossum vulgatum*			i	P						X
P		*Ornithopus perpusillus*				P						X
P		*Parnassia palustris*			i	P						X
P		*Pedicularis palustris*			i	P						X
P		*Pedicularis sylvatica*			i	P						X
P		*Plantago coronopus*				P						X
P		*Polygala serpyllifolia*				P						X
P		*Potamogeton berchtoldii*			i	P						X
P		*Potamogeton coloratus*			i	P						X
P		*Potamogeton gramineus*			i	P						X
P		*Potamogeton lucens*			i	P						X
P		*Potamogeton natans*			i	P						X
P		*Potamogeton polygonifolius*				P						X
P		*Potentilla palustris*			i	P						X
P		*Ranunculus aquatilis*				P						X
P		*Ranunculus baudotii*				P						X
P		*Ranunculus hederaceus*			i	P						X
P		*Ranunculus lingua*			i	P						X
P		*Ranunculus trichophyllus*				P						X
P		*Rhinanthus angustifolius*			i	P						X
P		*Rhinanthus minor*				P						X
P		*Ribes nigrum*				P						X
P		*Rorippa palustris*				P						X

P		*Rumex maritimus*				P						X
P		*Rumex palustris*				P						X
P		*Salix aurita*				P						X
P		*Samolus valerandi*			i	P						X
P		*Schoenoplectus tabernaemontani*				P						X
P		*Schoenus nigricans*			i	P						X
P		*Scorzonera humilis*			i	P						X
P		*Selinum carvifolia*				P						X
P		*Silaum silaus*				P						X
P		*Sium latifolium*			i	P						X
P		*Sparganium natans*			i	P						X
P		*Sparganium natans*				P						X
P		*Spergularia rubra*				P						X
P		*Stellaria palustris*			i	P						X
P		*Teucrium scordium*			i	P						X
P		*Thalictrum flavum*				P						X
P		*Thelypteris palustris*			i	P						X
P		*Thysselinum palustre*			i	P						X
P		*Trifolium striatum*				P						X
P		*Triglochin palustris*				P						X
P		*Typha angustifolia*				P						X
P		*Ulmus glabra*				P						X
P		*Utricularia australis*				P						X

P		*Utricularia intermedia*			i	P						X
P		*Utricularia minor*			i	P						X
P		*Utricularia vulgaris*			i	P						X
P		*Valeriana dioica*			i	P						X
P		*Veronica scutellata*			i	P						X
P		*Wolffia arrhiza*				P						X
P		*Dactylorhiza maculata subsp. elodes*			i	P						X
P		*Lotus corniculatus subsp. tenuis*				P						X
P		*Myosotis laxa subsp. cespitosa*				P						X
P		*Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus*				P						X
P		*Nymphaea alba subsp. alba*				P						X
P		*Salix repens subsp. dunensis*				P						X
P		*Zannichellia palustris subsp. palustris*				P						X
P		*Apium nodiflorum var. ocreatum*				P						X
P		*Carex flava var. flava*				P						X
P		*Carex viridula var. elatior*			i	P						X
P		*Carex viridula var. pulchella*				P						X
P		*Carex viridula var. viridula*			i	P						X
P		*Salix repens subsp. angustifolia*			i	P						X
P		*Ranunculus flammula var. major*				P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	10 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	70 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %
N14 : Prairies ameliorées	5 %
N15 : Autres terres arables	2 %
N16 : Forêts caducifoliées	1 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

Ensemble de tourbières basses alcalines constituant un système nord-atlantique arrière-littoral endémique, propre à la Plaine Maritime Picarde et que l'on trouve de part et d'autre de l'Authie. Ses caractéristiques géomorphologiques, hydrologiques, climatiques, biogéographiques et écologiques font qu'il n'a guère d'autre représentation, à l'exception du micro marais arrière-littoral de Tardinghen (entre le Blanc Nez et le Gris Nez).
Le système présente une séquence topographique complète d'habitats tourbeux basiques, depuis l'aquatique jusqu'aux stades de boisements alluviaux, avec de nombreux habitats inscrits à la directive. L'ensemble par son unicité, la taille du complexe et des habitats, l'originalité et l'état actuel des populations et milieux représente l'un des sites européens majeurs de tourbières.
Les habitats les plus remarquables sont :
- les herbiers aquatiques sur tourbes alcalines, les tremblants tourbeux, les roselières tourbeuses, les cariçaies et les mégaphorbiaies formant un groupe d'habitats largement répandus sur le site ;
- les bas-marais alcalins tourbeux à paratourbeux avec les phases pionnières sur tourbe alcaline, entretenus par fauche ou pâturage (tradition extensive ancienne des prés communaux), actuellement en forte régression ;
- plus ponctuellement, des biotopes aquatiques avec herbiers de Characées, peuplements du Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, des plages inondées amphibies.
Dans le Marais de Villers-sur-Authie, des processus ombrogéniques conduisent localement à l'acidification des tourbes et à la différenciation d'un système tourbeux acidiphile superposé. En outre, le marais de Larronville (mais aussi plus partiellement ceux de Flandre et Canteraine) renferme le dernier lambeau de végétation acidiphile des foraines (cordons fossiles) encore préservé avec des pelouses acidiphiles oligotrophes à mésotrophes et des suintements à Ranunculus hederaceus ou encore Montia minor.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité : La régression ou la disparition des pratiques de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. Il en résulte des phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et fourrés hygrophiles. Ces processus ont été gravement accélérés, depuis plus d'un siècle, par les drainages périphériques ou internes et l'eutrophisation des bassins versants. Il s'en est suivi une perte sensible de diversité et une régression progressive des intérêts biologiques des marais. Une opération agri-environnementale est actuellement développée dans la Plaine Maritime Picarde et participe en partie à la limitation de ces facteurs de dégradation des habitats.

4.2 Qualité et importance

La diversité des habitats explique les intérêts spécifiques exceptionnels :

Sur le plan floristique :
-cortège presque exhaustif d'hygrophytes et d'hélophytes des tourbières alcalines nord-atlantiques
-populations relictuelles et menacées des bas-marais et moliniaies alcalins
-cortège acidophile original
- 17 espèces exceptionnelles en Picardie, ainsi que 23 très rares et 48 rares

- 26 espèces protégées en Picardie (chiffre remarquable pour les plaines nord-ouest européennes) et 2 au niveau national
-1 espèces de l'annexe II de la directive Habitats/Faune/Flore (Helosciadium repens)

Sur le plan faunistique :
-avifaune prairiale et paludicole exceptionnelle, notamment nicheuse, mais stationnements de limicoles et anatidés
-site inventorié en ZICO et RAMSAR
-7 espèces de l'annexe II dont au moins une (Triton crêté) en populations importantes
- 3 espèces de l'annexe IV
-intérêt entomologique important, notamment au niveau odonatologique

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	A09	Irrigation		B
H	J02.04	Modifications du régime de mise en eau		B
H	J02.07	Captage des eaux souterraines		B
H	K01.02	Envasement		I
L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
L	C01.01	Extraction de sable et graviers		B
L	D01.02	Routes, autoroutes		O
L	E01.02	Urbanisation discontinue		O
L	E03.03	Dépôts de matériaux inertes		B
M	A02.01	Intensification agricole		B
M	A04.01	Pâturage intensif		I
M	A08	Fertilisation		B
M	H01.05	Pollution diffuse des eaux de surface due aux activités agricoles ou forestières		B
M	H02.06	Pollution diffuse des eaux souterraines due aux activités agricoles ou forestières		B
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	J02.01	Comblement et assèchement		B
M	K02	Evolution biocénotique, succession végétale		B

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.02	Pâturage extensif		I

H	F03.01	Chasse		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	70 %
Domaine communal	30 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	4,7 %
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	2,6 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	0,6 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	MARAIS DE SAILLY BRAY	+	100%
11	MARAIS DE LA MAYE	*	68%
15	Le Marais du Pendé	+	100%
38	Marais de Larronville	*	%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Baie de Somme	-	100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard

Adresse : 1 place de l'amiral Courbet 80142 Abbeville Cedex

Courriel :

Organisation : Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Adresse : 1 place Ginkgo - Village Oasis 80040 Amiens Cedx 1

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB
Lien :
http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Plan de gestion du marais du Pendé 2009-2013 (CENP)
Plan de gestion des marais de la Maye 2011-2015 (SMBDSGLP)
Plan de gestion du marais de Larronville 2013-2017 (SMBDSGLP)
Plan de gestion du site Ramsar de la Baie de Somme 2014-2025 (SMBDSGLP)