NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2510046 - Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 5
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR2510046

1.3 Appellation du site

Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys

1.4 Date de compilation

31/01/1990

1.5 Date d'actualisation

31/10/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Basse-Normandie	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/03/2006

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000264421

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,15°

Latitude : 49,35°

2.2 Superficie totale

33683 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

13%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
25	Basse-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
14	Calvados	13 %
50	Manche	74 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
50004	AIREL
50016	APPEVILLE
50021	AUDOUVILLE-LA-HUBERT
50022	AUMEVILLE-LESTRE
50023	AUVERS
50024	AUXAIS
50036	BAUPTE
14063	BERNESQ
50052	BEUZEVILLE-LA-BASTILLE
50059	BLOSVILLE
50064	BONNEVILLE
50070	BOUTTEVILLE
14107	BRICQUEVILLE
14124	CAMBE
14132	CANCHY
50099	CARENTAN LES MARAIS
50105	CATTEVILLE
50106	CAVIGNY

14168	COLOMBIERES
50150	CRASVILLE
50156	CROSVILLE-SUR-DOUVE
50166	DOVILLE
50169	ECAUSSEVILLE
50177	ETIENVILLE
50181	FEUGERES
50186	FLOTTEMANVILLE
50190	FONTENAY-SUR-MER
14281	FORMIGNY LA BATAILLE
50194	FRESVILLE
14298	GEFOSSE-FONTENAY
50208	GONFREVILLE
50210	GORGES
50216	GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
14312	GRANDCAMP-MAISY
50227	HAM
50241	HEMEVEZ
14342	ISIGNY-SUR-MER
50268	LESTRE
50269	LIESVILLE-SUR-DOUVE
14367	LISON
14378	LONGUEVILLE
50289	MARCHESIEUX
50292	MARIGNY-LE-LOZON
50298	MEAUTIS
50310	MESNIL-EURY
14439	MONFREVILLE
50273	MONTSENELLE
50356	MOON-SUR-ELLE
50368	NAY
50373	NEUVILLE-AU-PLAIN
50387	ORGLANDES
14480	OSMANVILLE
50394	PERIERS

50400	PICAUVILLE
50405	PLESSIS-LASTELLE
50421	QUINEVILLE
50422	RAIDS
50426	RAUVILLE-LA-PLACE
50431	REMILLY LES MARAIS
14547	RUBERCY
50445	SAINT-ANDRE-DE-BOHON
50509	SAINTE-MARIE-DU-MONT
50523	SAINTE-MERE-EGLISE
50468	SAINT-FROMOND
50479	SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE
14586	SAINT-GERMAIN-DU-PERT
50482	SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES
50488	SAINT-JEAN-DE-DAYE
50507	SAINT-MARCOUF
50510	SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY
50517	SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE
50528	SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
50548	SAINT-SAUVEUR-DE-PIERREPONT
50551	SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
50552	SAINT-SEBASTIEN-DE-RAIDS
50571	SEBEVILLE
50564	TERRE-ET-MARAIS
14711	TREVIERES
50606	TRIBEHOU
50609	TURQUEVILLE
50610	URVILLE
50617	VARENGUEBEC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	14	17	p	P		C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	1	10	i	P		B	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	1	5	p	P		B	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P		B	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w	6	21	i	P		B	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	50	50	p	P		B	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	10	i	P		B	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	25	37	p	P		B	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	10	50	i	P		B	B	C	B

B	A043	*Anser anser*	w	54	257	i	P		B	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w			i	P		B	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	70	70	p	P		B	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	r	10	10	p	P		B	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	69	2112	i	P		A	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c	728	2450	i	P		A	B	C	B
B	A063	*Somateria mollissima*	c	620	620	i	P			B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	6	15	p	P		C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	r	1	5	p	P		C	B	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	w	2	5	i	P			B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P			B	C	B
B	A119	*Porzana porzana*	r	1	10	p	P		B	B	C	B
B	A122	*Crex crex*	r	1	2	p	P		C	C	C	C
B	A122	*Crex crex*	c			i	P		C	C	C	C
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	1822	5091	i	P		B	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	121	445	i	P		B	C	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P		B	C	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	8	11	i	P		B	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	52	61	p	P		B	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	20	69	i	P		B	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	590	590	i	P		B	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	311	1675	i	P		B	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	190	220	p	P		C	B	C	B

B	A143	*Calidris canutus*	c	250	478	i	P			B	C	B
B	A144	*Calidris alba*	w	320	500	i	P		A	B	C	B
B	A144	*Calidris alba*	c	1000	2500	i	P		A	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	4000	20140	i	P		B	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	r	0	1	p	P		C	C	C	C
B	A156	*Limosa limosa*	r	6	10	p	P		B	C	B	C
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P		B	C	B	C
B	A157	*Limosa lapponica*	w	30	320	i	P		B	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	w	676	1374	i	P		B	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	r	50	55	p	P		B	B	C	B
B	A161	*Tringa erythropus*	w	12	12	i	P		B	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	w	100	100	i	P		B	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	r			i	P		B	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	w	1035	1035	i	P		B	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	r	0	3	p	P		C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	c			i	P		C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	r	30	100	p	P		C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P		C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	w	200	1100	i	P		C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	c	500	7000	i	P		C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	c	1800	1800	i	P			B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	r	0	1	p	P		C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1000	1000	i	P		C	B	C	B

B	A197	*Chlidonias niger*	c	100	500	i	P		B	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w	10	50	i	P		A	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	r	0	1	p	P		A	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P		A	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P		C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	r	1	10	p	P		C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	P		C	B	C	B
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c	13		i	P		C	B	C	B
B	A734	*Chlidonias hybrida*	r	1	5	p	P		C	B	C	B
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	P		C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	w	5	6	i	P		C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c	11	23	i	P		C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	r	10	30	p	P		B	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	r	10	10	p	P		B	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	w			i	P		A	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	r	0	2	p	P		A	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	c	50	97	i	P		A	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	270	270	i	P		C	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	100		i	P		C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	140	208	i	P		C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Streptopelia turtur*	50	90	p	C			X		X	
B		*Eremophila alpestris*	7	10	i	P						X
B		*Motacilla flava flavissima*	1300	1300	p	P					X	
B		*Acrocephalus schoenobaenus*	1000	1000	p	P						X
B		*Plectrophenax nivalis*	45	45	i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	2 %
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	5 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	1 %
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair	2 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	9 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	70 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	11 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité
: L'abandon des pratiques agricoles extensives conduit a un enfrichement des marais plus ou moins rapide selon les secteurs. Leur maintien est donc primordial.
La gestion des niveaux d'eaux est également un facteur déterminant pour l'attractivité des marais pour les oiseaux d'eau et pour la pérennité de la valeur biologique de ces espaces.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble fonctionnel "Baies des Veys - marais de l'isthme du Cotentin et du Bessin" accueille, tant en période de nidification, d'hivernage et d'escale migratoire, un grand nombre d'espèces d'oiseaux, dont beaucoup appartiennent à l'annexe 1 de la directive.
Au vu des effectifs recensés, cette entité est d'importance internationale ou nationale pour de nombreuses espèces.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine communal	%
Domaine public fluvial	%
Domaine public maritime	%

4.5 Documentation

· G. DEBOUT, 1982, L'avifaune des marais de Carentan : les espèces observées : phénologie, écologie, cartographie ornithologique des marais, propositions de gestion, Hors-série du Cormoran, GONm, 29 p. + cartes
· C. KAPPS, 1984, Impact des aménagements hydrauliques sur la nidification des oiseaux dans les marais de l'Isthme du Cotentin, 1 - Acquisition de données, GONm/CG50/DDAF50, 44 p.
· G. DEBOUT, 1986, Impact des aménagements hydrauliques sur la nidification des oiseaux dans les marais de l'Isthme du Cotentin, 2 - Les oiseaux nicheurs des marais de Carentan : contraintes d'ordre agricole, GONm/CG50/DDAF50, non paginé
· G. DEBOUT, C. LEBAS , 1988, Impact des types de gestion agricole sur quelques espèces indicatrices : les passereaux nicheurs des prairies humides des marais de l'Isthme du Cotentin, les marais de Marchésieux, GONm/CG50/DDAF50, 28 P.
· G. DEBOUT, T.GALLOO, 1988, Inventaire des espèces nicheuses des plans d'eau libre, courantes ou stagnantes des marais de Carentan, Influence des techniques d'entretien des rives, GONm/CG50/DDAF50, 36 p.
· G. DEBOUT, 1989, Avifaune des marais de la Sangsurière et de l'Adriennerie, GONm/CG 50/DDAF50, 31 p.
· G. DEBOUT, 1989, Marais de Carentan, rapport de synthèse des études ornithologiques, GONm/CG50/DDAF50, 13 p.
· F. BERNARD, J.F. ELDER, 1990, Inventaire ornithologique de la réserve naturelle de Beauguillot (Manche), 1990, ONC, 118 p.
· G.DEBOUT, 1991, Suivi des populations nicheuses de Cigogne blanche (Ciconia ciconia), Busards (Circus sp.), Râle des genêts (Crex crex), Bécassine des marais (Gallinago gallinago), Courlis cendré (Numenius arquata), Barge à queue noire (Limosa limosa), passereaux et autres données remarquables dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1991, GONm/PNR, non paginé
· J.F. ELDER, D. RUNGETTE, 1991, Analyse des carnets de huttes, saison 1990/1991, FDCM, non paginé
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1992, , Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1992 : les non-passereaux, Cigogne blanche (Ciconia ciconia), Busards (Circus sp.), Râle des genêts (Crex crex), Bécassine des marais (Gallinago gallinago), Courlis cendré (Numenius arquata), Barge à queue noire (Limosa limosa), GONm/PNR, 24 p.
· G. DEBOUT, P. LENEVEU, 1992, Réserve Naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie - commune de Doville/Manche, Suivi des populations nicheuses en 1992, étude en vue de la gestion de la réserve naturelle, GONm/PNR, 18 p.
· G.DEBOUT, 1992, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1992 : bilan général et propositions, GONm/PNR, 13 p.
· G.DEBOUT, 1992, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1992 : les passereaux, GONm/PNR, 35 p.
· A. CHARTIER, G. DEBOUT,1993, Chronologie de la reproduction, Limicoles et Passereaux, GONm/PNR,
· A. CHARTIER, G. DEBOUT,1993, Valeur ornithologique de certains sites du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Bilan synthétique, GONm/PNR, 12 p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1993, , Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1993, Suivi 1 : populations de cigognes blanche et busards, suivi 2 : populations de vanneau, bécassine et courlis, populations de râle des genêts, GONm/PNR, 18 p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, P.SPIROUX, 1993, Suivi des populations nicheuses dans la Réserve Naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie, Résultats 1993, GONm/PNR,9 p.
· A. CHARTIER,G.DEBOUT, 1993, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1993 : les passereaux, étude par la méthode des points d'écoute, GONm/PNR, 36 p.
· A. CHARTIER, D. RUNGETTE, 1994, Analyse bibliographique des oiseaux inféodés aux marais du Cotentin et du Bessin, FDCM/GONm/CG50, 135 p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1994, , Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1994, Suivi 1 : populations de cigognes blanche et busards, suivi 2 : populations de vanneau, bécassine et courlis, populations de râle des genêts, GONm/PNR, 27 p.
· D. RUNGETTE, 1994, Etude sur la migration pré-nuptiale et la nidification des Anatidés, Foulques et Limicoles dans les marais de la côte Est du Cotentin et autres données écologiques, année 1993, ACM côte Est-Baie des Veys
· G.DEBOUT, 1994, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1994 : les passereaux, étude par la méthode des points d'écoute, GONm/PNR, 39 p.

· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1995, , Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1995, populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts, vanneau huppé, bécassine des marais et courlis cendré,
, GONm/PNR, 27 p.
· G.DEBOUT, 1995, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1995 : les passereaux, étude par la méthode des points d'écoute, GONm/PNR, 55 p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1996, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1996, populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR, 32 p.
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, 1996, Le Canard siffleur (Anas penelope L.) sur la réserve naturelle de Beauguillot (Manche), Habitats utilisés, Gestion de l'espace, Rôle de la réserve naturelle au sein du complexe baie des Veys/marais du Cotentin, Bilan des connaissances acquises, Fondation Beauguillot/DIREN, 25 p.
· G.DEBOUT, 1996, Le patrimoine ornithologique de la côte Est du Cotentin (Manche), GONm/PNR, 13 p.
· G.DEBOUT, 1996, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1996 : étude par la méthode des points d'écoute, passereaux et espèces à répartition non localisée, GONm/PNR, 60p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1997, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1997, populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR, 28p.
· G.DEBOUT, 1997, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1997 : étude par la méthode des points d'écoute, passereaux et espèces à répartition non localisée, GONm/PNR, 60p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1998, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1998, populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR, 24 p.
· G.DEBOUT, 1998, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1998 : étude par la méthode des points d'écoute, passereaux et espèces à répartition non localisée, GONm/PNR, 68p.
· P.SPIROUX, 1998, Etude ornithologique la Réserve Naturelle de la Sangsurière, GONm/PNR,50 p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 1999, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1999, populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR, 32 p.
· G.DEBOUT, 1999, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 1999 : étude par la méthode des points d'écoute, passereaux et espèces à répartition non localisée, GONm/PNR, 66 p.
· J. FORET, 1999, Contribution à l'étude des modalités d'utilisation de la Baie des Veys et des marais arrières littoraux (Manche) par la Sarcelle d'hiver (Anas c.crecca) en période d'hivernage, ONC, 38p. + annexes
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 2000, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2000, populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR/DIREN/AESN, 37 p.
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, 2000, Synthèse annuelle (déc 98 - déc 99), Réseau " Limicoles côtiers " Baie des Veys/Littoral Est Cotentin, RNB/DIREN/AESN/PNR/Crédit Agricole/Fondation TOTAL, 88p.
· G. DEBOUT, 2000, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2000 : Etude par la méthode des points d'écoute, Passereaux et espèces à large répartition, GONm/PNR/DIREN/ AESN, 42p
· O. TIMSIT, 2000, Etude spatio-temporelle des stationnements de limicoles en Baie des Veys, Relation avec les activités humaines, rapport final, UMR Ecobio/CRBN/RNB, 36 p.
· A. CHARTIER, 2001, La Chouette chevêche (Athene noctua) dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin (Manche-Calvados), GONm/PNR/DIREN/AESN, 52 p.
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, 2001, Synthèse annuelle (août 99 - juillet 00), Réseau " Limicoles côtiers " Baie des Veys/Littoral Est Cotentin, RNB/DIREN/AESN/PNR/Crédit Agricole/Fondation TOTAL, 88p.
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, D. GUERIN, V. SCHRICKE, J.B. WETTON, 2001, Approche de l'utilisation de la Baie des Veys et des marais de l'Isthme du Cotentin par les Anatidés en période de migration et d'hivernage, ONCFS/RNB/FDCM/PNR, 33 p. + annexes
· G. DEBOUT, 2001, ERG 2000, Etat des Réserves du GONm, septembre 1999 à août 2000, GONm, 66 p.
· G. DEBOUT, 2001, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2001 : Etude par la méthode des points d'écoute, Passereaux et espèces à large répartition, GONm/PNR/DIREN/ AESN, 42p
· O. TIMSIT, 2001, Evaluation de l'impact des dérangements anthropique sur les limicoles en Baies des veys, 1° rapport d'étude, UMR Ecobio/CNRS/DIREN, 79 p.
· O. TIMSIT, 2001, Evaluation de l'impact des dérangements anthropique sur les limicoles en Baies des veys, 2° rapport d'étude, UMR Ecobio/CNRS/DIREN, 18 p.
· A. CHARTIER, 2002, La Chouette chevêche (Athene noctua) dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin (Manche-Calvados), Evaluation et distribution spatiale des populations du pourtour de la Baie des Veys, GONm/PNR/ DIREN/CRBN, 43 p.

· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 2002, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2001 : Populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR/DIREN/AESN, 42p
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, 2002, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2002 : Populations de cigogne blanche, busards, râle des genêts et limicoles, GONm/PNR/DIREN/AESN, 51 p
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, 2002, Synthèse annuelle (juillet 00 - juin 01), Réseau " Limicoles côtiers " Baie des Veys/Littoral Est Cotentin, RNB/DIREN/AESN/PNR/Fondation TOTAL, 88p.
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, 2002, Synthèse annuelle (juillet01-juin02), Réseau " Limicoles côtiers " Baie des Veys/Littoral Est Cotentin, RNB/DIREN/AESN/PNR, 88p.
· G. DEBOUT, 2002, ERG 2001, Etat des Réserves du GONm, septembre 2000 à août 2001, GONm, 66 p.
· G. DEBOUT, 2002, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2002 : Etude par la méthode des points d'écoute, Passereaux et espèces à large répartition, GONm/PNR/DIREN/ AESN, 61 p
· G.DEBOUT, P.SPIROUX, 2002, Etude ornithologique de la Réserve Naturelle de la Sangsurière, GONm/ PNR,/AESN/ DIREN, 42 p.
· O. TIMSIT, 2002, Evaluation de l'impact des dérangements anthropique sur les limicoles en Baies des veys, 3° rapport d'étude, UMR Ecobio/CNRS/DIREN, 18 p.
· G.DEBOUT, P.SPIROUX, 2003, Les oiseaux non-nicheurs de la Réserve Naturelle de la Sangsurière, GONm/PNR/AESN/ DIREN, 10 p.
· E.CAILLOT, J.F.ELDER, 2003, Synthèse annuelle octobre 2001-avril 2002, Réseau "Remises diurnes" Baie des Veys/Marais de l'isthme du Cotentin, RNB/CRBN/AESN/PNR/DIREN, 51 p.
· G. DEBOUT, 2003, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2003 : Etude par la méthode des points d'écoute, Passereaux et espèces à large répartition, GONm/PNR/DIREN/ AESN, 71 p
· A. DUFOUR, P. SPIROUX, 2003, Des gravelots sur nos plages, Le Gravelot à collier interrompu Biologie et Reproduction, GONm/CRBN/DIREN/PNR,11 p.
· G. DEBOUT, N. FILLOL, J.B. WETTON, 2003, Les oiseaux des prairies humides des marais du Cotentin et du Bessin, PNR/ GONm/CRBN/AESN/DIREN, 48 p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, R. PURENNE, 2003, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2003 : Espèces d'intérêt patrimonial à répartition localisée, GONm/PNR/DIREN/AESN/ CRBN, 70 p
· E. CAILLOT, J.F. ELDER, 2003, Synthèse annuelle (juillet02-juin03), Réseau " Limicoles côtiers " Baie des Veys/Littoral Est Cotentin, RNB/CRBN/PNR, 89p.
· G. DEBOUT, 2004, ERG 2003, Etat des Réserves du GONm, septembre 2002 à août 2003, GONm, 99p.
· A. CHARTIER, G.DEBOUT, R. PURENNE, 2004, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2004 : Espèces d'intérêt patrimonial à répartition localisée, GONm/PNR/DIREN/AESN, 78 p
· G. DEBOUT, 2004, Suivi des populations nicheuses dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Résultats 2004 : Etude par la méthode des points d'écoute, Passereaux et espèces à large répartition, GONm/PNR/DIREN/ AESN, 72 p
· A. CAZIN, R. PURENNE, 2004, Le Cravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) sur la côte orientale du Cotentin : recensement, cartographie, analyse et propositions de mesures conservatoires, GONm/PNR/DIREN, 24 p.
· G. DEBOUT, A. CAZIN, R. PURENNE, 2005, Etude de l'hivernage à la réserve naturelle de la Sangsurière : évaluation des effectifs hivernants de busards et bécassines, GONm/PNR/DIREN, 13p.
· E.CAILLOT, J.F.ELDER, 2004, Synthèse annuelle octobre 2002-avril 2003, Réseau "Remises diurnes" Baie des Veys/Marais de l'isthme du Cotentin, RNB/CRBN/PNR, 52 p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	1 %
36	Réserve naturelle nationale	4 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	2 %

80	Parc naturel régional	98 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	Polders de Brévands, de Ste-Marie-du-Mont et d'Utah-Beach	+	1%
36	Marais de la Sangsurière et de l'Adriennerie		5%
38	Réserve Naturelle du domaine de Beauguillot	+	4%
38	Niveau d'eau du Gorget	+	1%
80	Marais du Cotentin et du Bessin	-	98%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys	-	95%
Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe	BASSES VALLEES DU COTENTIN ET BAIE DES VEYS	*	2%

5.3 Désignation du site

Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD :
Code Designation : FR33 ; Couverture :
Retenu à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.)

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Cantepie BP 282 50500 LES VEYS Tél : 02 33 71 61 90 Fax : 02 33 71 61 91

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☐ Oui Nom : DOCOB VERSION SIN2

Lien :
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/N2000/FR2500088DOCOB.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation

Charte du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.
Document d'objectifs du Site d'Importance Communautaire.
Lors de son élaboration, le document d'objectifs de la Zone de Protection Spéciale prendra en compte l'importance des activités de pêche professionnelle à pied et de la conchyliculture.