NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2600959 - Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR2600959

1.3 Appellation du site

Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus

1.4 Date de compilation

31/05/1998

1.5 Date d'actualisation

17/02/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Bourgogne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/11/2015
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 28/07/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967230&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,75167°

Latitude : 47,78583°

2.2 Superficie totale

3988 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
26	Bourgogne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
21	Côte-d'Or	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
21250	ESSAROIS
21346	LEUGLAY
21519	RECEY-SUR-OURCE
21655	VANVEY
21704	VILLIERS-LE-DUC
21717	VOULAINES-LES-TEMPLIERS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		0,27 *(0,01 %)*		G	B	C	B	B
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		2,07 *(0,05 %)*		G	C	C	B	C
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		2,86 *(0,07 %)*		G	B	C	C	C
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		7,48 *(0,19 %)*		G	B	C	C	C
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		1,15 *(0,03 %)*		G	C	C	C	C
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		0,84 *(0,02 %)*		G	B	C	C	C
7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae*	X	1,21 *(0,03 %)*		G	C	C	B	B
7220 *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)*	X	0,61 *(0,02 %)*		G	B	C	B	B
7230 *Tourbières basses alcalines*		4,18 *(0,1 %)*		G	A	C	B	B
8160 *Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard*	X	0,08 *(0 %)*		G	C	C	C	C
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	16,72 *(0,42 %)*		G	C	C	B	C
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		726,29 *(18,21 %)*		M	A	C	B	B
9150		2800,2		M	A	C	B	B

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion		*(70,22 %)*						
9160 *Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli*		103,53 *(2,6 %)*		M	B	C	B	B
9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*	X	11,71 *(0,29 %)*		G	C	C	B	C

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1014	*Vertigo angustior*	p			i	P	DD	C	B	C	C
I	1016	*Vertigo moulinsiana*	p			i	P	DD	C	B	C	C
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	P	DD	D			
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	P	DD	D			
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	P	DD	D			
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	P	DD	D			
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p	185	185	i		M	B	B	C	B
X	1096	*Lampetra planeri*	p	1419	1419	i		M	C	B	C	C
X	1149	*Cobitis taenia*	p			i	P	DD	D			
X	1163	*Cottus gobio*	p	12201	12201	i		M	C	A	C	C
A	1193	*Bombina variegata*	p			i	R	DD	C	B	C	C

M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	w	29	29	i		G	C	B	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	r	152	152	i		G	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p	26	26	i		M	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p	0	2	i		G	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	DD	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	DD	C	B	C	C
P	1758	*Ligularia sibirica*	p	2400	3500	i	R	G	B	B	A	B
P	1902	*Cypripedium calceolus*	p	700	1350	i	R	G	C	B	B	B
I	6169	*Euphydryas maturna*	p			i	P	DD	B	C	B	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Salamandra salamandra*			i	P			X		X	
A		*Alytes obstetricans*			i	R	X		X		X	
A		*Bufo bufo*			i	C			X		X	
A		*Rana dalmatina*				P	X				X	X

B		*Accipiter gentilis*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos major*			i	C			X		X	
B		*Dendrocopos minor*			i	C			X		X	
I		*Lopinga achine*					X				X	
I		*Leucorrhinia caudalis*					X				X	
M		*Eptesicus serotinus*				C	X				X	
M		*Myotis mystacinus*				P	X				X	
M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Myotis daubentoni*			i	P	X					X
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				C	X				X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*				P	X				X	
M		*Plecotus auritus*				P	X				X	
M		*Felis sylvestris*			i	C						X
M		*Martes martes*			i	C		X	X		X	
M		*Mustela putorius*			i	P		X	X		X	
M		*Myotis alcathoe*				P	X				X	
M		*Myotis brandtii*				P	X				X	
O		Salmo trutta fario			i	P						X
P		*Asperula tinctoria*			i	R						X
P		*Aster amellus*										X
P		*Carduus defloratus*			i	C						X
P		*Carlina acaulis*			i	C						X

P		*Coronilla coronata*			i	P						X
P		*Crepis praemorsa*			i	C						X
P		*Dactylorhiza incarnata*			i	P			X			
P		*Dactylorhiza traunsteineri*			i	P			X			
P		*Daphne cneorum*			i	C						X
P		*Epipactis palustris*			i	C			X			
P		*Gentiana ciliata*			i	C						X
P		*Gentiana pneumonanthe*			i	C						X
P		*Iberis intermedia*			i	P						X
P		*Inula montana*										X
P		*Limodorum abortivum*			i	R			X			
P		*Paeonia mascula*			i	R						X
P		*Pyrola rotundifolia*			i	C						X
P		*Salix repens*			i	R						X
P		*Schoenus ferrugineus*			i	C						X
P		*Senecio helenitis*			i	R						X
P		*Swertia perennis*			i	C						X
P		*Tephroseris helenitis*										X
P		*Thelypteris palustris*			i	P						X
P		*Viola rupestris*			i	C						X
R		*Podarcis muralis*				P	X				X	X
R		*Natrix natrix helvetica*				P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	5 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	1 %
N16 : Forêts caducifoliées	80 %
N17 : Forêts de résineux	8 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	3 %

Autres caractéristiques du site

Suite à la création du Parc national de forêts en décembre 2019, le site est inclus dans le périmètre du c#ur de Parc. Depuis lors, les compétences de gestion et d'animation du site sont transférées à l'Etablissement public du Parc national sous la responsabilité de son Conseil d'administration, l'Office national des forêts restant le gestionnaire. Dans ce cadre, les objectifs du DOCOB doivent faire écho aux objectifs de la charte du Parc national de forêts pour la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière du site et assurer le maintien ou la restauration des habitats naturels et des habitats d'espèces dans un bon état de conservation en associant les activités économiques et socioculturelles du territoire.

Le site est situé dans un vaste plateau de calcaires du Jurassique, plus ou moins sec, légèrement incliné vers le Nord-Ouest.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité :

Les pelouses, éboulis et marais sont des milieux instables qui évoluent rapidement vers un embuissonnement défavorable aux espèces à forte valeur patrimoniale actuellement présentes.

Au niveau des boisements s'observe localement le remplacement des peuplements feuillus par des résineux ; le Pin sylvestre est en effet très dynamique dans le Châtillonnais et colonise certains secteurs de marais où il joue un rôle de drain en provoquant un assèchement accéléré.

Le boisement ou les cultures à gibier dans les pelouses en enclave dans les massifs sont à l'origine de la disparition des milieux sensibles.

L'abandon des pratiques de pâturage des marais favorise l'embuissonnement. L'évolution est cependant actuellement relativement lente dans le Molinion et la situation est stable dans le Caricion davallianae.

Le maintien de vieux arbres voire d'arbres morts, le développement d'îlots de vieillissement ou de sénescence et la présence de lisières riches en arbustes et bien structurées sont essentiels à la conservation des populations de chauves-souris forestières présentes.

4.2 Qualité et importance

Les pluies tombées sur le plateau s'infiltrent dans les calcaires karstiques et s'accumulent sur une couche géologique marneuse, donnant naissance à des résurgences de pentes. À l'affleurement de ces sources naissent les ruisseaux de tête de bassins et les marais dans les zones de suintements. L'eau qui est chargée en carbonate de calcium est à l'origine des dépôts de tuf, dans les cours d'eau et les marais, une roche caractéristique de ce fonctionnement hydrogéologique.

Le climat de la région et du secteur présente un régime de précipitations de type continental, des hivers longs et rigoureux avec une forte fréquence du gel particulièrement précoce et tardif et une forte amplitude des températures. Ce climat explique notamment la présence d'espèces à optimum boréo-montagnard remarquables (Sabot de Vénus et Ligulaire de Sibérie).

La topographie contrastée de ce plateau entaillé (combes et vallées larges) implique la présence de mésoclimats liés à différentes expositions et situations qui génèrent une grande diversité d'habitats froids à thermophiles.

Ces caractéristiques physiques du site sont à l'origine d'un patrimoine naturel riche et diversifié.

Le site présente une grande diversité d'habitats et d'espèces.
Le site présente 17 habitats d'intérêt communautaire, dont 5 prioritaires, répartis en unités de gestion :
- Les milieux forestiers;
- les clairières intraforestières;
- les ruisseaux;
- les étangs;
- les marais tufeux.

La forêt recèle un nombre important de plantes montagnardes peu courantes pour la région, adaptées aux conditions de sols (éboulis, suintements), de climat (versants abrupts ombragés), et d'éclairement procurés par les feuillus qui permettent l'installation du Sabot de Vénus. De nombreuses espèces protégées au niveau national et régional y sont recensées (20 (annexe 2) espèces d'intérêt communautaire, 46 espèces protégées nationalement et 18 espèces protégées régionalement).

La faune est largement représentée par les mammifères (Chat sauvage, Chauve-souris...), mais aussi par des insectes rares et menacés (Damier du frêne, Cordulie à corps fin...).
A noter la présence de petits ruisseaux à Ecrevisse à pieds blancs et d'une flore de marais à tuf très riche.
Une entité (Villiers-le Duc) issue du site Natura 2000 #Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne# a intégré le site. Elle comprend notamment une colonie de mise-bas de Petit Rhinolophe en bâtiment privé.

4 espèces d'intérêt communautaire font l'objet de suivis réguliers et pour lesquels, le site revêt une importance pour la connaissance nationale et pour le maintien de l'espèce au niveau national :

- Les stations à Sabot de Vénus sont vulnérables car parfois sujettes à la cueillette et à l'arrachage des pieds fleuris ou au piétinement par les locaux, mais également soumises à une forte dynamique de la végétation concurrente ayant comme conséquence la fermeture progressive du milieu et une baisse de l'intensité lumineuse, qui serait un facteur discriminant pour cette espèce.

- la Ligulaire de Sibérie : La station présente sur le site est isolée des autres populations françaises et les échanges génétiques ne sont pas possibles. Cette station revêt donc une importance pour l'espèce au niveau national, car les effectifs sont constants et les habitats favorables.

- l'Ecrevisse à pieds blancs : les cours d'eau de bonne qualité et les travaux d'effacement des étangs menés en 2006 ont amélioré l'habitabilité astacicole du milieu permettant la reconnexion des populations du ruisseau principal avec son affluent. Les derniers inventaires (2022) ont par ailleurs mis en évidence une recolonisation des secteurs situés en aval des étangs effacés.

- le Damier du frêne : l'une des 5 espèces de papillon les plus menacées en France, autrefois répandu dans le quart nord-est de la France, mais qui semble avoir disparu de la quasi-totalité de ces départements. Il se maintient encore dans les forêts de la côte dijonnaise, du Plateau de Langres # sur lequel se situe le Parc national de forêts. Les populations présentes au sein du site Natura 2000 sont essentielles à la survie de l'espèce et se maintiennent malgré un habitat en régression (frênes atteints de chalarose). Les actions d'amélioration des connaissances et de sensibilisation pour la prise en compte de l'espèce dans la gestion forestière se poursuivent.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

L	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
L	A08	Fertilisation		I
L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
L	D01.02	Routes, autoroutes		B
L	E06.02	Reconstruction, rénovation de bâtiments		I
L	F03.02.03	Piégeage, empoisonnement, braconnage		I
L	F04.01	Pillage de stations floristiques		I
L	G01.03	Véhicules motorisés		O
L	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
L	H04	Pollution de l'air et polluants atmosphériques		O
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	J02.06	Captages des eaux de surface		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B	Sylviculture et opérations forestières		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	13 %
Propriété d'une association, groupement ou société	1 %
Domaine communal	16 %
Domaine privé de l'état	70 %

4.5 Documentation

CHIFFAUT A., THIERY P., 1996 - Etude des populations de Sabots de Vénus (Cypripedium calceolus) en Bourgogne - Côte d'Or. CSNB, DIREN et Conseil Régional de Bourgogne, rapport + annexes (fiches de stations).

CHIFFAUT A. et al., 1994 - Les plateaux de Bourgogne : Châtillonnais et Tonnerrois (départements de Côte d'Or et de l'Yonne) - Etude diagnostic préalable à l'application du règlement CEE 2078/92 . CNSB, Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or.

BUGNON F., 1949 - Etude sur la végétation hygrophile des hauts plateaux jurassiques bourguignons : les marais de pente du Bajocien supérieur, Bull. Sc. de Bourgogne, tome XII, : 35.

EDOUARD F., BOUARD H., GODREAU V., 2002 - Document d'objectifs de gestion du site Natura 2000 FR2600959, ONF, DIREN de Bourgogne, 100 pp + annexes.

UEF, 1997 - études entomologiques en milieux écologiques remarquables en forêt domaniale et communale de Côte d'Or et Saône-et-Loire et propositions de getsion des milieux.

PARIS, L., 2000 - Suivi de la population d'écrevisses à pieds blancs sur le ruisseau du val des Choues, PNRM, ONF.

PROUDHON C., 2002 - Inventaire et études sur les batraciens et les chiroptères - étude sur le sonneur à ventre jaune. ONF,), Programme LIFE "Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire", projet n°99 NAT/F/006314, 7 p. + annexes

SIRUGUE D., ROUE S., VARANGUIN N., 2001 - Etude chiroptérologique sur le site Natura 2000 FR2600959, GMHB,), Programme LIFE "Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire", projet n°99 NAT/F/006314, 16 p.

HELLER S., 2002 - Inventaires et suivis des populations de sabot de Vénus, ONF, conservatoire des sites naturels de Bourgogne, Programme LIFE "Forêts et habitats associés de la Bourgogne calcaire", projet n°99 NAT/F/006314, 8 pp + annexes.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	1 %
23	Réserve biologique dirigée	1 %
30	Parc national	100 %
33	Parc national, zone coeur	99 %
21	Forêt domaniale	70 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	15 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
15	site CSNB de la Combe Choulère		1%
23	Sèchebouteille		1%
21	forêts domaniales		75%
22	Forêts communales		13%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc national de forêts

Adresse : 20 rue Anatole Gabeur 52210 Arc-en-Barrois

Courriel : julie.lambrey@forets-parcnational.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation