NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR2612003 - Massifs forestiers et vallées du châtillonnais

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 8
6. GESTION DU SITE ..... 9

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

A (ZPS)

### 1.2 Code du site

FR2612003

### 1.3 Appellation du site

Massifs forestiers et vallées du châtillonnais

### 1.4 Date de compilation

31/01/2006

### 1.5 Date d'actualisation

31/05/2010

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Bourgogne | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/03/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036932125&dateTexte=&categorieLien=id

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 4,75°

**Latitude :** 47,66667°

## 2.2 Superficie totale

58949 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 26 | Bourgogne |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 21 | Côte-d'Or | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 21004 | AIGNAY-LE-DUC |
| 21043 | BAIGNEUX-LES-JUIFS |
| 21052 | BEAULIEU |
| 21055 | BEAUNOTTE |
| 21061 | BELLENOD-SUR-SEINE |
| 21063 | BENEUVRE |
| 21075 | BILLY-LES-CHANCEAUX |
| 21115 | BUNCEY |
| 21116 | BURE-LES-TEMPLIERS |
| 21117 | BUSSEAUT |
| 21119 | BUSSIERES |
| 21142 | CHANCEAUX |
| 21235 | DUESME |
| 21237 | ECHALOT |
| 21250 | ESSAROIS |
| 21253 | ETALANTE |
| 21283 | FRAIGNOT-ET-VESVROTTE |
| 21286 | FRENOIS |
| 21304 | GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE |

| | |
|---|---|
| 21338 | LAMARGELLE |
| 21345 | LERY |
| 21346 | LEUGLAY |
| 21372 | MAISEY-LE-DUC |
| 21396 | MAUVILLY |
| 21410 | MEULSON |
| 21415 | MINOT |
| 21418 | MOITRON |
| 21438 | MONTMOYEN |
| 21455 | NOD-SUR-SEINE |
| 21466 | OIGNY |
| 21470 | ORIGNY |
| 21471 | ORRET |
| 21479 | PELLEREY |
| 21489 | POISEUL-LA-GRANGE |
| 21490 | POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE |
| 21514 | QUEMIGNY-SUR-SEINE |
| 21519 | RECEY-SUR-OURCE |
| 21526 | ROCHEFORT-SUR-BREVON |
| 21543 | SAINT-BROING-LES-MOINES |
| 21549 | SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX |
| 21579 | SALIVES |
| 21626 | TERREFONDREE |
| 21655 | VANVEY |
| 21704 | VILLIERS-LE-DUC |
| 21717 | VOULAINES-LES-TEMPLIERS |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A030 | *Ciconia nigra* | r | 3 | 6 | p | P | M | B | B | C | B |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | r | 20 | 40 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A073 | *Milvus migrans* | r | 2 | 3 | p | | M | C | B | C | B |
| B | A074 | *Milvus milvus* | r | 1 | 10 | p | P | M | C | B | C | B |
| B | A081 | *Circus aeruginosus* | r | 1 | 1 | p | | P | C | B | C | B |
| B | A082 | *Circus cyaneus* | p | 5 | 10 | p | P | DD | C | B | B | B |
| B | A084 | *Circus pygargus* | r | 0 | 1 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A092 | *Hieraaetus pennatus* | r | 1 | 10 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A155 | *Scolopax rusticola* | r | | | i | P | DD | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A215 | *Bubo bubo* | r | 2 | 3 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A223 | *Aegolius funereus* | p | 20 | 40 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A224 | *Caprimulgus europaeus* | r | 10 | 15 | p | P | P | C | B | C | B |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | p | 20 | 40 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A234 | *Picus canus* | p | 40 | 70 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A236 | *Dryocopus martius* | p | 40 | 70 | p | P | DD | C | B | C | B |
| B | A246 | *Lullula arborea* | r | 5 | 10 | p | P | P | D | | | |
| B | A338 | *Lanius collurio* | r | 30 | 50 | p | P | DD | D | | | |
| B | A868 | *Leiopicus medius* | p | 400 | 600 | p | P | DD | B | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Accipiter gentilis* | 20 | 40 | p | P | | | | | | X |
| B | | *Streptopelia turtur* | 472 | | cmales | | | | X | | X | |
| B | | *Jynx torquilla* | | | i | P | | | | | | X |
| B | | *Picus viridis* | 40 | 70 | p | P | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | *Dendrocopos major* | 400 | 600 | p | P | | | X | | X | |
| B | | *Cinclus cinclus* | 1 | 10 | p | P | | | X | | X | |
| B | | *Lanius senator* | | | i | P | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 6 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 39 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 54 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 1 % |

### Autres caractéristiques du site

Le site Natura 2000 est localisé au nord de la Côte d'Or, dans la région naturelle du Châtillonnais.
Les forêts, entrecoupées de clairières et de marais, recouvrent les vastes plateaux calcaires entaillés de vallées étroites et encaissées.
L'ensemble, formant un paysage remarquable, offre une diversité d'habitats naturels favorables à de nombreuses espèces d'oiseaux, nicheuses, hivernantes ou migratrices.

Vulnérabilité
: La sauvegarde de la Cigogne noire nécessite la présence de massifs forestiers pour nicher mais aussi de petits cours d'eau de bonne qualité (zone à truites et cincles plongeurs) et de prairies situées en fond de vallée pour sa stratégie d'alimentation. Les mesures de gestion devront donc porter sur la sauvegarde des prairies fréquentées en évitant la culture de maïs ou de peuplier et de limiter les intrants pour assurer une bonne qualité de l'eau.
Les espèces forestières caractéristiques (Pics, Chouette de Tengmalm, Autour des palombes) exigent la présence de stades matures dans les massifs. Il faut globalement éviter tout boisement à base d'essences exotiques.
La présence en bordure de forêts de zones ouvertes peu soumises à une agriculture intensive favorise la présence d'espèces de milieux semi-ouverts à ouverts (Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore, Milan royal, Aigle bottté).

## 4.2 Qualité et importance

Les forêts : De superficie importante ou formant simplement des linéaires sur les rives des étangs et des cours d'eau, les espaces forestiers aux faciès diversifiés offrent des sites de reproduction pour plusieurs espèces d'oiseaux, notamment la Cigogne noire, nichant exclusivement dans les grands massifs forestiers de feuillus où elle mène une vie extrêmement discrète, et l'Aigle botté, un rapace rare en Bourgogne.
La présence de vieux peuplements permet aussi la reproduction d'effectifs importants de Pic noir, de Pic cendré et de Pic mar, trois espèces forestières se nourrissant d'insectes et de larves, ainsi que la présence de la Chouette de Tengmalm, nichant dans des cavités creusées par certains Pics dans le tronc des arbres.
La zone forestière du site a la caractéristique de posséder trois espèces forestières les plus rares de Bourgogne : la Cigogne noire, l'Aigle botté et la Chouette de Tengmalm dont l'effectif principal pour la Bourgogne niche au sein de cette zone.
Les prairies : Implantées en fond de vallées plus ou moins humides et maillées de haies, de lisières forestières et de ripisylves, les prairies bocagères constituent le domaine vital de la Pie grièche-écorcheur et de l'Alouette lulu. Riches en insectes, reptiles et micromammifères, elles contribuent à un apport non négligeable dans l'alimentation de nombreux oiseaux dont l'Aigle botté, la Bondrée apivore et le Milan royal.
Les milieux aquatiques : Les rivières et ruisseaux, les étangs, les mares et les zones humides afférentes, jouent un rôle essentiel pour bon nombre d'espèces d'oiseaux. Certains (hérons, Cigogne noire,
) profitent de la présence d'insectes, de poissons et d'amphibiens pour se nourrir, tandis que d'autres trouvent ici un lieu de reproduction adapté. Citons le Martin pêcheur, creusant un tunnel dans les parois verticales des berges érodées par les cours d'eau pour nicher.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | B02.04 | Elimination des arbres morts ou dépérissants | | I |
| M | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |
| Collectivité territoriale | % |
| Domaine de l'état | % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 15 | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 1 % |
| 23 | Réserve biologique dirigée | 1 % |
| 21 | Forêt domaniale | 30 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 15 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 15 | site de la Combe Choulère (CSNB) | + | 1% |
| 23 | Réserve biologique dirigée de Sèche-Bouteille | + | 1% |
| 21 | Forêt domaniale de Châtillon et de Jugny | + | 30% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Forêts communales | + | 15% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office national des forêts

Adresse : 2, rue de l'aviation 21400 CHÂTILLON sur SEINE

Courriel : bertrand.barre@onf.fr

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

### 6.3 Mesures de conservation

Aménagements forestiers
Plan de gestion pour le site du CSNB