NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR4112002 - Complexe de l'étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR4112002

1.3 Appellation du site

Complexe de l'étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones voisines

1.4 Date de compilation

30/11/2002

1.5 Date d'actualisation

31/10/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Lorraine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 6,80361°

Latitude : 48,79083°

2.2 Superficie totale

5308 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
41	Lorraine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
57	Moselle	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
57035	ASSENONCOURT
57044	AZOUDANGE
57086	BELLES-FORETS
57173	DESSELING
57177	DIEUZE
57241	FRIBOURG
57246	GELUCOURT
57266	GUEBLANGE-LES-DIEUZE
57272	GUERMANGE
57404	LINDRE-BASSE
57418	LOUDREFING
57595	RORBACH-LES-DIEUZE
57664	TARQUIMPOL
57763	ZOMMANGE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	1	3	p	P	G	D			
B	A001	*Gavia stellata*	w	0	1	i		G	D			
B	A002	*Gavia arctica*	w	0	1	i	P	M	D			
B	A002	*Gavia arctica*	c			i	P	DD	D			
B	A003	*Gavia immer*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A003	*Gavia immer*	c			i	P	DD	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	50	70	p	P	G	C	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c	100	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	30	50	p	P	G	C	B	C	B

B	A005	*Podiceps cristatus*	c	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	1	5	i	P	G	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	r			p	V	DD	D			
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	2	3	p	P	G	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	DD	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	r	70	70	p	P	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c	200	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	25	30	p	R	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	5	i	V	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	w	20	20	i	C	G	B	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	40	40	p	C	G	B	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	0	0	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	10	25	i	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	r	20	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	c	200	250	i	P	G	C	B	C	B
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	10	15	i	P	G	C	C	B	B
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c	0	10	i	P	G	D			
B	A038	*Cygnus cygnus*	w	5	10	i	P	G	B	B	B	B

B	A038	*Cygnus cygnus*	c	5	10	i	V	G	D			
B	A039	*Anser fabalis*	c	0	10	i	P	G	B	C	B	C
B	A041	*Anser albifrons*	w	50	70	i	P	G	D			
B	A041	*Anser albifrons*	c	120	120	i	P	G	B	C	B	C
B	A043	*Anser anser*	w	500	800	i	P	G	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	r	20	30	p	P	G	D			
B	A043	*Anser anser*	c	500	1200	i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	1100	1100	i	P	G	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	c	500	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	1200	1500	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	10	50	p	P	M	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	0	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c	10	30	i	P	G	C	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	w	0	0	i		G	D			
B	A058	*Netta rufina*	r	1	5	p	P	G	C	B	B	B
B	A058	*Netta rufina*	c	150	200	i	P	M	C	B	B	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	500	1500	i	P	G	C	B	C	A
B	A059	*Aythya ferina*	r	5	5	p	P	M	C	B	C	A
B	A059	*Aythya ferina*	c	5000	6000	i	P	G	B	B	C	A
B	A060	*Aythya nyroca*	c	2	2	i	V	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	r	2	2	p	P	G	C	B	C	B

B	A061	*Aythya fuligula*	c	400	500	i	P	G	B	B	C	B
B	A062	*Aythya marila*	c	1	5	i	P	G	C	B	B	B
B	A067	*Bucephala clangula*	w	30	50	i	P	G	C	B	B	A
B	A067	*Bucephala clangula*	c	10	20	i	P	G	B	B	B	A
B	A070	*Mergus merganser*	w	50	80	i	P	G	B	B	B	A
B	A070	*Mergus merganser*	c	5	10	i	P	G	B	B	B	A
B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	DD	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	12	15	p	P	G	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c	10	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	r	0	0	p	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c	1	20	i	P	G	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	1	3	i	P	G	C	B	B	C
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c	1	4	i	P	G	C	B	B	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	3	4	p	P	G	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	DD	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	5	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	DD	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	0	2	i	P	G	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	2	i	P	P	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c	0	5	i	P	P	D			

B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	DD	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	16	16	p	P	M	D			
B	A119	*Porzana porzana*	r	0	0	p	P	G	C	C	B	C
B	A119	*Porzana porzana*	c	0	1	i	P	G	C	C	B	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	10	20	p	P	M	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	0	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	300	350	p	P	G	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	c	3000	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	w	500	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c	1000	1500	i	P	G	C	B	C	B
B	A136	*Charadrius dubius*	c	10	10	i	P	G	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	10	50	i	P	G	D			
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	0	0	i	P	G	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	1	1	p	P	G	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	1000	2000	i	P	G	C	B	C	B
B	A145	*Calidris minuta*	c	10	50	i	P	G	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c	10	100	i	P	G	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	10	50	i	P	G	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c	1	5	i	P	G	D			

B	A161	*Tringa erythropus*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c	1000	2000	i	P	G	C	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	50	i	P	G	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	1	i	P	M	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	5	10	p	P	G	C	A	C	C
B	A234	*Picus canus*	p	5	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	p	5	10	p	R	M	D			
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c	0	1	i	V	G	D			
B	A321	*Ficedula albicollis*	r	50	70	p	P	M	C	B	A	A
B	A321	*Ficedula albicollis*	c			i	P	DD	C	B	A	A
B	A338	*Lanius collurio*	r	10	10	p	P	G	D			
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	w	50	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	r	10	10	p	P	G	D			
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c	800	800	i	P	G	C	B	C	B
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w			i	P	DD	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	c	1	10	i	P	G	B	B	B	A
B	A773	*Ardea alba*	w	50	100	i	C	M	B	B	B	B

B	A773	*Ardea alba*	c	700	700	i	P	G	B	B	B	A
B	A855	*Mareca penelope*	w	10	25	i	P	G	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	c	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A856	*Spatula querquedula*	r			p	P	DD	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c	10	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	100	200	i	P	G	B	B	C	A
B	A857	*Spatula clypeata*	r	0	0	p	P	G	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c	1000	1200	i	P	G	B	B	C	A
B	A861	*Calidris pugnax*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	1	50	i	P	G	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	p	25	50	p	C	P	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	20	20	i	P	G	D			
B	A889	*Mareca strepera*	r	1	1	p	P	G	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c	20	170	i	P	G	C	B	C	B
B	A892	*Zapornia parva*	r	1	1	cmales	P	G	C	C	A	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	1	1	i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	
B		*Tyto alba*			p	P			X			
B		*Jynx torquilla*	5	5	cmales	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			p	P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*	11	11	p	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*	129	129	p	P						X
B		*Acrocephalus palustris*	1	1	cmales	P			X		X	
B		*Acrocephalus scirpaceus*	230	380	cmales	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	174	174	p				X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	20 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	6 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	2 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	13 %
N14 : Prairies ameliorées	10 %
N15 : Autres terres arables	20 %
N16 : Forêts caducifoliées	18 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	10 %

Autres caractéristiques du site

Situé sur le plateau lorrain, le site est constitué de collines peu élevées, entourant un grand étang.

Vulnérabilité
: Le site n'est pas considéré comme très vulnérable cependant il convient de veiller à l'évolution du paysage (homogénéisation, diminution des surfaces en herbe), à la fréquentation humaine accrue, aux dérangements (tirs et effarouchement du Grand Cormoran), au défaut d'entretien de certains milieux (comme les roselières) qui peut être la cause du déclin de certaines espèces d'oiseaux et à l'utilisation toujours plus importante de biocides.

4.2 Qualité et importance

L'intérêt ornithologique du site est reconnu depuis de nombreuses années. Avec 120 espèces nicheuses et plus de 250 espèces observables tout au long de l'année, il constitue un site exceptionnel pour les oiseaux dont de nombreuses espèces de l'annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux (indiquées par un astérisque).

En période de reproduction, les roselières du site abritent des espèces sensibles comme le Butor étoilé*, le Blongios nain*, le Héron pourpré*, le Busard des roseaux* et la Marouette ponctuée*. Elles abritent également plusieurs dizaines de couples de Rousserolle turdoïde, espèce en forte régression en France et au sein de l'Union européenne.

A noter également au printemps 2002 la présence sur le site d'un Phragmite aquatique* à des dates tardives.

Les forêts accueillent plusieurs couples de Bondrée apivore*, de Milan noir*, de Pic mar*, de Pic cendré*, de Pic noir* et également une très belle population de Gobemouche à collier*. La Cigogne noire*, très discrète, est observée régulièrement sur le site et il n'est pas impossible qu'elle s'y reproduise déjà.

L'été, des milliers de canards trouvent refugent sur les plans d'eau du site au moment où ils ont le plus besoin de tranquillité pour effectuer leur mue. Le site constitue ainsi un site majeur pour les rassemblements post-nuptiaux de Canard souchet (jusqu'à 10% du total français à cette date) et de Fuligule milouin (l'un des premiers sites français) accompagnés parfois du rare Fuligule nyroca* (à l'unité).

L'automne et le printemps voient passer de nombreux migrateurs comme la Guifette noire*, la Grue cendrée* ou encore le Balbuzard pêcheur*. Pour cette dernière espèce des aménagements de plates-formes ont été réalisés en plusieurs points pour l'aider à se reproduire sur le site.

En fin d'automne, le site accueille la Grande Aigrette* (qui hiverne également sur le site) en nombre très important, de même que l'Oie des moissons et l'Oie rieuse (dont les effectifs sont en nette chute). Le site est également un des rares sites français à accueillir régulièrement le Pygargue à queue blanche* et l'Aigle criard*.

Enfin, de nombreux anatidés passent l'hiver sur le site comme le Cygne de Bewick*, le Cygne sauvage*, le Harle piette*, le Garrot à #il d'or et le Harle bièvre. Pour toutes ces espèces nordiques, il constitue un site majeur en France (dépassement du seuil d'importance nationale).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété d'une association, groupement ou société	%
Collectivité territoriale	%
Domaine départemental	%
Domaine privé de l'état	%

4.5 Documentation

M. HIRTZ & D. COMBRISSON (2002) - Fréquentation des deux plans d'eau lorrains majeurs (Madine et Lindre) par les principales espèces d'oiseaux d'eau. Ciconia, volume 26(1), pages 15-28.

H. MICHEL (2001) - Points chauds : L'étang de Lindre et les étangs mosellans (département de la Moselle). Ornithos, volume 8(3), pages 108-115.

Y. LE SCOUARNEC (2000) - L'avifaune des roselières de l'étang de Lindre. Cas particuliers des cornées de Guermange, Zommange et assenoncourt. Document LPO Lorraine/PNRL. 10 pages + cartes.

L. MALY (1997) - Le Gobemouche à collier (Ficedula albicollis) en France : répartition, habitat, effectifs. Ornithos, volume 4(3), pages 122-131.

P. SORNETTE (1997) - Réintroduction du Balbuzard pêcheur en Lorraine au pays des étangs (Moselle). Mémoire quant aux potentialités des sites. Document LPO Lorraine. 11 pages + annexes + cartes.

Y. MULLER (1996a) - Dénombrement de l'avifaune nicheuse de la forêt du Romersberg , chênaie-hêtraie de 420 ha sur le plateau lorrain. Ciconia, volume 20(3), pages 1-29.

Y. MULLER (1996b) - La Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) en Lorraine : répartition et effectifs. Ciconia, volume 20(3), pages 117-138.

F. LEGER, R. LECAILLE & F. THOMMES (1995) - Le Pygarge à queue blanche (Haliaeetus albicilla) en Lorraine. Ciconia, volume19(3), pages 115-132.

Y. MULLER (1995) - Statut de la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) et des autres "fauvettes aquatiques" dans le secteur de l'étang de Lindre (Moselle). Ciconia, volume 19(1), pages 1-16.

L. MALY (1994a) - Mise en évidence du patrimoine ornithologique du bassin versant du Lindre : propositions pour une meilleure prise en compte. Document LPO Lorraine/DDAF57/CG57. 55 pages + cartes.

L. MALY (1994b) - Contribution ornithologique à la pré-étude d'aménagement foncier de la commune de Lindre-Basse : mises en évidence des secteurs sensibles. Document LPO Lorraine/DDAF57/CG57. 30 pages + annexes + cartes.

J. FRANCOIS, G. LEGRAND & H. MICHEL (1993) - Nidification de la Cigogne noire (Ciconia nigra) en Lorraine. Ciconia, volume 17(3), pages 133-142.

J. FRANCOIS (1992) - Observations sur la présence hivernale de l'Aigle criard (Aquila clanga) en Moselle. Ciconia, volume 16(3), pages 117-125.

Plaquette réalisée par le Domaine de Lindre et intitulée : "Le territoire des oiseaux". Collection "Richesse de Lindre". 17 pages.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	18 %
80	Parc naturel régional	100 %
21	Forêt domaniale	42 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
13	Domaine de Lindre	+	100%
80	Lorraine	-	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs du Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines	=	100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNRL

Adresse : 1 Rue du Quai 54700 Pont-à-Mousson

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1446_16_DocOb_Lindre (6).pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1446_16_Annexe_Carto.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Le document d'objectifs du site, réalisé par le Parc Natural Régional de Lorraine dans sa mission d'opérateur local, a été achevé en septembre 2001.