NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR4112009 - Forêts et étangs d'Argonne et vallée de l'Ornain

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR4112009

1.3 Appellation du site

Forêts et étangs d'Argonne et vallée de l'Ornain

1.4 Date de compilation

31/12/2005

1.5 Date d'actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Lorraine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,00972°

Latitude : 48,91389°

2.2 Superficie totale

15308 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
41	Lorraine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
55	Meuse	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
55017	AUTRECOURT-SUR-AIRE
55038	BEAULIEU-EN-ARGONNE
55069	BRABANT-LE-ROI
55081	BRIZEAUX
55117	CLERMONT-EN-ARGONNE
55125	CONTRISSON
55194	FOUCAUCOURT-SUR-THABAS
55199	FROIDOS
55202	FUTEAU
55271	LAHEYCOURT
55272	LAIMONT
55285	LAVOYE
55295	LISLE-EN-BARROIS
55304	LOUPPY-LE-CHATEAU
55382	NEUVILLE-SUR-ORNAIN
55388	NOYERS-AUZECOURT
55414	RANCOURT-SUR-ORNAIN
55416	RARECOURT
55427	REVIGNY-SUR-ORNAIN

55517	SEUIL-D'ARGONNE
55493	SOMMEILLES
55366	VAL-D'ORNAIN
55532	VAUBECOURT
55560	VILLERS-AUX-VENTS
55569	VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY
55577	WALY

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A002	*Gavia arctica*	c	0	2	i	P	P	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	10	120	i	P	P	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	10	40	p	P	P	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	5	40	i	P	P	D			
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	5	20	p	P	P	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	r			i	V	DD	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	0	5	i	P	P	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	5	100	i	P	P	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	r			i	P	DD	D			

B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	2	i	P	P	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	0	0	males	P	P	D			
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	2	3	p	P	P	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	2	2	i	P	P	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	100	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	20	60	p		P	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	r			i	V	P	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	r	1	2	p	P	P	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	DD	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	DD	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	5	50	i	P	P	D			
B	A036	*Cygnus olor*	r	2	4	p	P	P	D			
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	20	i	P	P	D			
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c			i	P	P	D			
B	A038	*Cygnus cygnus*	w	0	5	i	P	P	D			
B	A038	*Cygnus cygnus*	c			i	P	DD	D			
B	A041	*Anser albifrons*	w	0	5	i	P	P	D			
B	A043	*Anser anser*	w	50	300	i	P	P	B	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	0	5	i	P	P	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	20	200	i	P	P	D			
B	A052	*Anas crecca*	r			i	P	DD	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	50	500	i	P	P	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	C	DD	C	B	C	B

B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	c	0	25	i	P	P	D			
B	A058	*Netta rufina*	c	0	1	i	P	P	D			
B	A059	*Aythya ferina*	w	10	200	i	P	DD	D			
B	A059	*Aythya ferina*	r	0	10	p	P	P	D			
B	A059	*Aythya ferina*	c	5	750	i	P	P	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	5	50	i	P	P	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	r	0	5	p	P	P	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c	5	250	i	P	P	D			
B	A062	*Aythya marila*	c	0	2	i	P	P	D			
B	A063	*Somateria mollissima*	c	0	1	i	P	P	D			
B	A064	*Clangula hyemalis*	c	0	1	i	P	P	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	w	5	50	i	P	P	D			
B	A069	*Mergus serrator*	w	0	10	i	P	P	D			
B	A070	*Mergus merganser*	w	0	10	i	P	P	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	2	5	p	P	M	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	5	10	p	P	M	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	DD	D			
B	A074	*Milvus milvus*	r	0	2	p	P	M	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	0	1	i	P	P	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c			i	R	DD	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	0	5	p	P	P	D			

B	A082	*Circus cyaneus*	w	0	4	i	P	P	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	2	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	r	0	3	p	P	M	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c	0	1	i	P	P	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	10	i	P	P	D			
B	A098	*Falco columbarius*	w	0	2	i	P	P	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w	0	2	i	P	P	D			
B	A104	*Bonasa bonasia*	p	0	5	p	P	P	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	0	5	p	P	P	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	0	50	i	P	P	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	2	5	p		P	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	10	350	i	P	P	D			
B	A125	*Fulica atra*	p			i	C	DD	D			
B	A125	*Fulica atra*	c	50	800	i	P	P	D			
B	A127	*Grus grus*	w	250	500	i	P	P	D			
B	A127	*Grus grus*	c	2500	5000	i	P	P	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	0	20	p	P	P	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	1000	3000	i	P	P	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	0	2	p	P	P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	10	200	i	P	P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	r	0	0	p	P	DD	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	w	0	40	i	P	P	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	r	4	6	p	P	M	D			

B	A162	*Tringa totanus*	c	0	15	i	P	P	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	1	5	i	P	P	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	w	1	5	i	P	P	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r	0	5	p	P	P	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	0	150	i	P	P	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w	5	150	i	P	P	D			
B	A184	*Larus argentatus*	c			i	P	DD	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	0	2	i	P	P	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	5	15	i	P	P	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	2	i	P	P	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r			p	P	DD	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	10	30	p	P	P	D			
B	A234	*Picus canus*	p	2	5	p	P	P	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	5	10	p	P	P	D			
B	A321	*Ficedula albicollis*	r	8	20	p	P	M	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	15	30	p	P	M	D			
B	A767	*Mergellus albellus*	w	10	40	i	P	P	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	10	60	i	P	P	D			
B	A773	*Ardea alba*	r	0	2	p	P	P	D			
B	A855	*Mareca penelope*	w	10	150	i	P	P	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	w	5	40	i	P	P	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	r			i	P	DD	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	w	0	20	i	P	P	D			

B	A857	*Spatula clypeata*	r			i	V	DD	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c	10	150	i	P	P	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c	0	5	i	P	P	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	p	5	10	p	P	P	D			
B	A889	*Mareca strepera*	w	10	150	i	P	P	D			
B	A889	*Mareca strepera*	r	0	10	p	P	P	D			
B	A892	*Zapornia parva*	r	0	0	males	P	DD	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	C						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*	0	10	i	P						X

B		*Perdix perdix*			i	P			X		X	
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Columba oenas*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	10	99	i	P			X		X	X
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*	0	2	p	P						X
B		*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*	200	200	p	P						X
B		*Cinclus cinclus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Cettia cetti*									X	
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus palustris*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	1	15	p	P						X
B		*Lanius senator*	0	2	p	P						X
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	
B		*Emberiza citrinella*			i	P			X		X	
B		*Emberiza cirlus*									X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	16 %
N15 : Autres terres arables	7 %
N16 : Forêts caducifoliées	69 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N19 : Forêts mixtes	5 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS se compose de trois entités : l'Argonne au Nord et la Champagne Humide au centre, constituées essentiellement de forêts et de prairies avec un nombre important d'étangs naturels eutrophes, et la vallée de l'Ornain au sud.
La principale caractéristique de la ZPS est de se trouver à un carrefour biogéographique, en marge des domaines continental et atlantique, réunissant trois régions naturelles : la Champagne Humide, l'Argonne et le Perthois.
Ce contact de régions très différentes augmente la diversité en habitats et donc la potentialité faunistique.

Vulnérabilité
: L'intérêt de la zone réside essentiellement dans la diversité et les vastes superficies de milieux qu'elle propose. Les menaces pèsent principalement sur le maintien de la quiétude des massifs forestiers (vis-à-vis de la Cigogne noire, notamment) ; la préservation des étangs et d'une pisciculture extensive ; le maintien des surfaces en herbe et des éléments fixes du paysages (haies, arbustes...) ; et le maintien de la dynamique du cours d'eau de l'Ornain et de ses habitats rivulaires (boisements, prairies, ripisylves...).

4.2 Qualité et importance

D'un point de vue ornithologique, on peut retenir la présence d'au moins cinq espèces plus ou moins en limite d'aire de répartition : Aigle botté, Bouscarle de Cetti, Bruant zizi, Gobemouche à collier, Pie-grièche à tête rousse, à répartition essentiellement continentale.

Les trois secteurs se distinguent bien concernant l'avifaune nicheuse :
- l'Argonne et ses forêts où l'avifaune forestière présente le plus d'intérêt : Pic noir, Pic cendré, Pigeon colombin et Cigogne noire, voire la Gélinotte si sa nidification était confirmée. La Cigogne noire trouve une réelle quiétude dans les boisements éloignés des routes forestières. De plus, les ruisseaux naturels, bien préservés car peu accessibles dans les fonds de vallon, assurent son alimentation : Truites, Chabots et Loches franches.
- la Champagne Humide, avec ses grands étangs et ses boisements de Chênes, ainsi que ses secteurs prairiaux et de vergers, où pas moins de 12 espèces patrimoniales lorraines ont été recensées : Butor étoilé, Blongios, Busard des roseaux, Canard chipeau, Faucon hobereau, Marouette poussin, Fuligule milouin, Rousserolle turdoïde, Gobemouche à collier, Pics mar et cendré, Pie-grièche écorcheur et Martin pêcheur.
- la vallée de l'Ornain avec la présence de la grande Aigrette, du Chevalier culblanc, du Chevalierguignette, du Cincle, de l'Hirondelle de rivage, du Petit Gravelot et de la Rousserolle verderolle. L'intérêt biologique de la vallée de l'Ornain apparaît remarquablement élevé, du fait notamment de la surface importante d'habitats alluviaux, prioritaires au titre de la directive "Habitats", soumis à une dynamique naturelle, avec érosion active des berges et inondations régulières et de sa biodiversité, la plus élevée de la ZPS : 24 espèces citées :
* 4 espèces de l'annexe I de la directive "Oiseaux",
* 9 espèces de la liste complémentaire du Muséum National d'Histoire Naturelle,
* 9 espèces patrimoniales pour la Lorraine, dont cinq inconnues comme nicheurs dans les deux autres régions naturelles : Grande Aigrette, Hirondelle de rivage, Chevalier guignette, Cincle et Petit Gravelot.

Pour ce qui est de l'avifaune hivernante, en Champagne Humide, les plans d'eau jouent un rôle quantitatif important pour le Canard colvert, la Foulque, les Fuligules milouin et morillon, et qualitatif pour des espèces rares en Lorraine comme le Canard souchet, le Harle piette, le Harle bièvre, le Garrot à oeil d'or et l'Oie cendrée. À noter également, en Champagne Humide et dans la vallée de l'Ornain, un hivernage récent et relativement important de la Grue cendrée, dont les effectifs augmentent d'année en année, et de l'Oie cendrée dont les effectifs semblent également en augmentation. Cette évolution est sans doute à mettre en relation avec l'hivernage de ces deux espèces sur le lac du Der. Pour l'alimentation des passereaux granivores hivernants, les mégaphorbiaies de la vallée de l'Ornain jouent un rôle certain.

La ZPS constitue une halte migratoire importante pour de nombreux migrateurs, notamment la Cigogne noire, l'Oie cendrée et la Grue cendrée, cette dernière présentant des effectifs de plusieurs milliers d'individus.Enfin on peut noter la richesse ornithologique de l'étang du Morinval, dont la population d'oiseaux, présente tout au long de l'année, en fait un plan d'eau d'intérêt régional, voire national.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
H	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
H	F01	Aquaculture (eau douce et marine)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%
Collectivité territoriale	%
Domaine de l'état	%

4.5 Documentation

Inventaires ornithologiques et étude ONF Meuse (2004-2005)
Document d'objectifs finalisé pour le site de la Forêt de Beaulieu (FR4100185)
Document d'objectifs en cours de rédaction pour le site de la Forêt des Argonelles (FR4100183)

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	0 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	0 %
21	Forêt domaniale	35 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
32	Vallon de Saint-Rouin	+	0%
32	Terrasse de Beaulieu	+	0%
32	Rochers du Saut du Boulanger	+	0%
38	Ruisseau de la Biesme et ses affluents	+	0%
21	Forêt domaniale de Beaulieu	+	17%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui

Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1453_Dococ_Argonne_vol2.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1453_Docob_Argonne_vol3.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1453_Docob_Argonne_vol1.pdf

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation