NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR4213813 - Ried de Colmar à Sélestat, Haut-Rhin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR4213813

1.3 Appellation du site

Ried de Colmar à Sélestat, Haut-Rhin

1.4 Date de compilation

31/12/2002

1.5 Date d'actualisation

31/03/2007

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Alsace	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.alsace.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 7,43194°

Latitude : 48,16889°

2.2 Superficie totale

5229 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
42	Alsace

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
68	Haut-Rhin	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
68028	BERGHEIM
68066	COLMAR
68110	GRUSSENHEIM
68113	GUEMAR
68153	ILLHAEUSERN
68157	JEBSHEIM
68252	OSTHEIM
68143	PORTE DU RIED
68296	SAINT-HIPPOLYTE
68366	WICKERSCHWIHR

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	p	1	5	p	C	M	C	A	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	p	1	2	p	R	M	C	A	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	25	150	i	C	M	C	A	C	C
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	0	1	i	V	M	D			
B	A025	*Bubulcus ibis*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	1	2	i	V	M	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	p	1	5	p	C	M	C	A	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	1	i	V	M	D			

B	A031	*Ciconia ciconia*	c	30	50	i	C	M	C	A	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	w	50	50	i	C	M	C	A	C	C
B	A036	*Cygnus olor*	r	1	2	p	R	M	C	A	C	C
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c	1	2	i	V	M	D			
B	A038	*Cygnus cygnus*	w	1	10	i	R	M	C	A	C	C
B	A039	*Anser fabalis*	w	250	500	i	C	M	B	B	C	C
B	A041	*Anser albifrons*	w	1	10	i	R	M	D			
B	A043	*Anser anser*	w	1	10	i	R	M	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	50	100	i	C	M	C	B	C	C
B	A052	*Anas crecca*	c	50	100	i	C	M	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	p	20	50	p	C	M	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c	100	500	i	C	M	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	w	1	10	i	V	M	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	c	5	10	i	R	M	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	w	1	10	i	V	M	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	c	5	15	i	R	M	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	1	p	V	M	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A070	*Mergus merganser*	w	2	5	i	R	M	C	A	C	C
B	A070	*Mergus merganser*	r	1	2	p	R	M	C	A	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	1	5	p	R	M	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	1	5	p	R	M	C	B	C	C

B	A074	*Milvus milvus*	c	10	10	i	P	M	C	B	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	c	10	10	i	P	M	C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w	6	10	i	P	M	C	B	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	1	5	i	R	M	C	A	C	C
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	2	i	R	M	C	A	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	2	i	R	M	C	A	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			p	P	DD	C	C	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	c	1	1	i	R	M	D			
B	A122	*Crex crex*	r	1	2	p	V	M	C	C	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	20	50	p	C	M	C	A	C	C
B	A125	*Fulica atra*	p	20	50	p	C	M	C	A	C	C
B	A127	*Grus grus*	c	50	250	i	C	M	C	A	C	A
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	1	1	p	V	DD	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	5	p	R	M	C	B	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	1	30	i	R	M	C	B	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	10	20	p	C	M	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	50	200	i	C	M	C	B	C	C
B	A149	*Calidris alpina*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	1	10	i	R	M	C	B	C	C
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	30	200	i	C	M	C	A	C	C

B	A156	*Limosa limosa*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	4	5	p	V	M	C	C	C	C
B	A161	*Tringa erythropus*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	3	5	i	R	M	C	B	C	C
B	A165	*Tringa ochropus*	c	10	50	i	C	M	C	B	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	5	10	i	R	M	C	B	C	C
B	A179	*Larus ridibundus*	w	500	3000	i	C	M	C	A	C	C
B	A182	*Larus canus*	w	1	10	i	R	M	C	B	C	C
B	A183	*Larus fuscus*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	1	2	p	V	M	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	6	10	i	C	M	C	A	C	C
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A215	*Bubo bubo*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A222	*Asio flammeus*	w	1	1	i	V	M	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	11	50	p	C	M	C	A	C	C
B	A234	*Picus canus*	p	8	10	p	R	M	C	A	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	p	3	5	p	R	M	C	A	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r	15	20	p	C	M	C	C	C	C
B	A379	*Emberiza hortulana*	c	1	1	i	V	M	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	5	20	i	C	M	C	A	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	c	10	15	i	R	M	C	B	C	C

B	A856	*Spatula querquedula*	c	10	15	i	R	M	C	B	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	c	5	15	i	R	M	C	B	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	20	i	R	M	C	B	C	C
B	A868	*Leiopicus medius*	p	20	50	p	C	M	C	A	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c	10	15	i	R	M	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w	5	15	i	R	M	C	A	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Salamandra salamandra*			i	P			X		X	
A		*Triturus vulgaris*			i	P						X
A		*Bombina variegata*					X		X		X	
A		*Bufo bufo*			i	C			X		X	
A		*Hyla arborea*			i	C	X		X		X	
A		*Rana lessonae*			i	C	X					X
B		*Buteo buteo*	20	30	p	P						X

B		*Buteo lagopus*									X	
B		*Falco tinnunculus*	10	30	p	P						X
B		*Falco subbuteo*		10	p	P						X
B		*Accipiter nisus*		10	p	P						X
B		*Perdix perdix*			i	P			X		X	
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Columba oenas*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia decaocto*			i	P			X		X	
B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	X
B		*Cuculus canorus*			i	P			X		X	
B		*Otus scops*									X	
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Strix aluco*			i	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Merops apiaster*									X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Picus viridis*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos major*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*									X	
B		*Hirundo rustica*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	

B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*									X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*							X		X	
B		*Hippolais icterina*			i	P			X		X	
B		*Muscicapa striata*			i	P			X		X	
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	
B		*Emberiza citrinella*			i	P			X		X	
R		*Anguis fragilis*			i	C			X		X	
R		*Natrix natrix*			i	C			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2,4 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0,5 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	0,5 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	14 %
N15 : Autres terres arables	0,6 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2 %
N26 : Forêts (en général)	30 %
N27 : Agriculture (en général)	49 %

Autres caractéristiques du site

Le ried est l'une des plus grandes zones humides de l'Europe de l'Ouest. En 1996, la Commission européenne a rappelé que le Ried était considéré comme une zone prioritaire au sein du réseau de sites natura 2000 pour les oiseaux.

Vulnérabilité
:

4.2 Qualité et importance

Le ried du Haut-Rhin est utilisé par les oiseaux pour leur nidification mais également lors de leur migration. Il s'agit de la partie haut-rhinoise d'une ZICO au contour régional.

Ainsi le site abrite plusieurs espèces nicheuses de l'annexe I de la directive oiseau (le Martin pêcheur, le Pic noir, le Pic mar, le Pic cendré, la Pie grièche écorcheur, la Bondrée apivore, le Milan noir et le Râle des genêts ...).

Le site accueille la nidification de deux espèces rares : le Courlis cendré et le râle d'eau ainsi que la Pie grièche grise, la Chouette chevêche, et le Cochevis huppé.

Pour ce qui concerne les oiseaux nicheurs, l'un des enjeux majeurs du site est la conservation ou la restauration des populations de Courlis cendré (le tiers environ des Courlis alsaciens trouve refuge dans les rieds) et de celle du Râle des genêts. En outre, l'Alsace et notamment la plaine de l'Ill a une responsabilité particulière dans la conservation du Pic mar, dont elle abrite une proportion notable des effectifs de la Communauté européenne.

Pour les oiseaux migrateurs, le ried du Haut-Rhin avec celui du Bas-Rhin, constitue une entité cohérente au regard de l'accueil de l'avifaune migratrice, complémentaire en terme de fonctionnalité, aux zones de protection spéciales rhénanes. En effet, les rieds sont inondés d'une lame d'eau relativement peu profonde en saison hivernale et printanière ; ils offrent de ce fait des ressources alimentaires aux espèces migratrices, entre autres, aux oies, canards, laridés et limicoles.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		B
H	A06.01	Cultures annuelles pour la production alimentaire		B
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		B
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
H	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		B
M	A08	Fertilisation		B
M	A09	Irrigation		B
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		B
M	D01	Routes, sentiers et voies ferrées		B
M	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	F03.01	Chasse		B
M	G01.08	Autres activités de plein air et de loisirs		B
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	53 %
Propriété d'une association, groupement ou société	2 %
Etablissement public	1 %
Domaine communal	37 %
Domaine de l'état	2 %

4.5 Documentation

Cabinet DENNY CONSULTANT, (1994). - Contribution à l'inventaire et à la localisation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire en Alsace en application de la Directive Habitat CEE du 21 mai 1992. - DIREN Alsace

KLEIN J.P., STEIMER F. et al., (1992). - Espaces naturels rhénans. Bull. Soc. Ind. Mulh., N°824, vol. 1.

ROCAMORA G., (1994). - Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux en France. - L.P.O., Ministère de l'Environnement.

Muséum National d'Histoire Naturelle, (1993). - La faune de France ; inventaire des vertébrés et principaux invertébrés. - Ed. Eclectis.

PUISSANCE 4, (1991). - Pamina 5 : protection et mise en valeur de l'espace rhénan.

BILLARD R., (1997). - Les poissons d'eau douce des rivières de France ; identification, inventaire et répartitions des 83 espèces. - Les Encyclopédies du Naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé.

TOUILLET N., (1994). - Les espaces "naturels" sur la frange rhénane. Partie 2 : les espaces protégés. - DIREN Alsace.

Office National des Forêts, Direction Régionale Alsace, (1994). - Orientations et directives locales d'Aménagement pour la région forestière Plaine de l'Ill. - 75 p + annexes.

OBERTI D. (1993).- Catalogue des types de stations forestières de la Plaine de l'Ill. Volume 2 : Plaine de l'Ill au nord de la Thur.- Région Alasce, C.R.P.F. Lorraine-Alsace, O.N.F., Dir. régionale, 239 p.

CARBIENER R., BERNARD A., KEMPF C., WAECHTER A., WALTER J-M., (1980). - Zones humides : le Ried Centre-Alsace. - Ministère de la qualité de la Vie - Affaires scientifiques. Convention de recherche 70-26, 313p.

BURCKEL C., (1984). - Inventaire et cartographie des sites d'intérêts écologiques du Grand Ried Centre-Alsace. Propositions pour sa conservation. - Mémoire de maîtrise Aménagement du Territoire" D.R.A.E. Alsace.

Ouvrage collectif, (1989). - Nos rieds demain. - Bulletin de la société industrielle de Mulhouse n° 813, 257 p.

SIGWALT P., (1989).- La faune des Rieds : originalité, évolution, menaces. - Bull. Sté Ind. Mulhouse N.813 p125-144.

DRONNEAU C., (1992). - Zonage des prairies du Ried de l'Ill en vue de leur gestion écologique. - Association régionale d'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace, Conseil Régional d'Alsace, 31p.

LPO ALSACE, (1995). - Evaluation des effets de l'article 19 sur l'avifaune du périmètre de la zone inondable de l'Ill domaniale. Etat intermédiaire/1995. - Conseil Régional d'Alsace, 30p + annexes.

AERU, (1996). - Inventaire des zones humides remarquables du département du Haut-Rhin - Conseil Général du Haut-Rhin, Agence de l'Eau Rhin-Meuse. - Direction Régionale de l'Environnement Alsace

LPO ALSACE, (1998). - Evaluation des effets de l'article 19 sur l'avifaune du périmètre de la zone inondable de l'Ill domaniale. Etat final de l'opération 1993-1998. - Conseil Régional d'Alsace, 37p + annexes.

LPO ALSACE, (2000). - Evaluation des mesures agri-environnementales dans la zone inondable de l'Ill domaniale - Période 1998-2003 - Effets sur l'avifaune - Bilan 2000. - Conseil Régional d'Alsace, 33p + annexes.

Mission interservice de l'eau, (2001). - Atlas des zones inondables du Haut-Rhin. - Préfecture du Haut-Rhin, DDAF 68.

DRONNEAU C., SIGWALT P., (1994). - Désignation de zones prioritaires au sein des ZICO -ALSACE. - Centre d'études ornithologiques d'Alsace DIREN - Alsace.

Cabinet A. WAECHTER, (1999). - Expertise de la Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux du Ried de l'Ill dans le Haut-Rhin. - DIREN Alsace.

DEHLINGER M., (1985). - Recensement des limicoles nicheurs d'Alsace. Contribution à l'enquête nationale "limicoles nicheurs" in colloque interrégional ornithologique et mammalogique de Saint Dié 1984. - Ciconia 9 p 46-5.

DUBOIS P.J., MAHEO R., (1986). - Limicoles nicheurs de France. - Ministère de l'Environnement. Service de la recherche des études et du traitement de l'information sur l'environnement. LFPO. Bureau international de recherche sur les oiseaux d'eau, 291 p.

GRADOZ P., (1987). - Les oiseaux du ried d'Ostheim. - Soc. Hist. Nat. Colmar N°59, p106-107.

C.E.O.A. (réd. : DRONNEAU C., ANDRES C., MULLER Y., SIGWALT P., WASSMER B.), (1989). - Livre rouge des Oiseaux nicheurs d'Alsace. - Ciconia 13, n° spécial, 312p.

C.E.O.A. (réd. : ANDRES C., DRONNEAU C., MULLER Y., SIGWALT P.), (1994). - L'hivernage des oiseaux d'eau en Alsace. - Ciconia 18, p1-155.

DRONNEAU C., (1998). - Statut hivernal de l'Oie des moissons en Alsace. - Alauda 66, p25-38.

MULLER Y. et les observateurs de la LPO Alsace, (1998). - La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), oiseau de l'année 1998 en Alsace. Bilan de l'enquête. - Ciconia 22, p81-98.

LPO - Bases de données ornithologiques

LPO, Eric Buchel, Octobre 2006 - Expertise pour la définition de la zone de protection spéciale. "Le ried centre Alsace de Sélestat à Colmar, partie haut-rhinoise", 16p et une carte.

DECEUMINCK B., MAILLET N., KERAUTRET L., RIOLS C., MAHEO R., 1999 - Dénombrement d'anatidés et de Foulques hivernant en France à la mi-janvier 1998. Ministère de l'environnement, DNP, 45p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
23	Réserve biologique dirigée	10 %
80	Parc naturel régional	9 %
21	Forêt domaniale	2 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	19 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
80	Ballons des Vosges	*	9%
21	Forêt domniale de l'Orch	+	2%
22	Foret communale d'Ohnenheim	+	1%
22	Forêt communale de Colmar	*	11%
22	Forêt communale de Bergheim	*	1%
22	Forêt communale d'Holtzwihr	+	1%
22	Forêt communale d'Elsenheim	*	1%
22	Forêt communale de Guémar	+	2%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand Est

Adresse : 14 rue du bataillon de marche n°24, BP 81005/F 67070 Strasbourg

Courriel :

Organisation : Région Grand Est

Adresse : Site de Strasbourg 1, place Adrien Zeller 67070 STRASBOURG CEDEX

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☐ Oui Nom : DOCOB VERSION SIN2
Lien : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ried-de-colmar-a-selestat-haut-rhin-zps-a2557.html

☒ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

forêts de l'Ill

L'ORLAM Plaine de l'Ill prône clairement un objectif de production de bois d'oeuvre feuillu de qualité mais dans le respect de la straucture et de la composition de la forêt alluviale ellane.

Les fonctions d'accueil du public importantes pour certains massifs péri-urbains (forêt de Colmar) ne feront pas l'objet de création de série à proprement parler. Ces fonctions pourront être néanmoins prises en compte en tant qu'objectif secondaire sur tout ou partie de la forêt.