NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR5300004 - Rivière le Douron

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 9
6. GESTION DU SITE ..... 10

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site
FR5300004

### 1.3 Appellation du site
Rivière le Douron

### 1.4 Date de compilation
30/11/1995

### 1.5 Date d'actualisation
20/09/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Bretagne | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000465705

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** -3,64472°

**Latitude :** 48,58056°

## 2.2 Superficie totale

2904 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

1,08%

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 53 | Bretagne |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 29 | Finistère | 83,5 % |
| 22 | Côtes-d'Armor | 15,42 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 29014 | BOTSORHEL |
| 29067 | GUERLESQUIN |
| 29073 | GUIMAEC |
| 29114 | LANNEANOU |
| 29133 | LOCQUIREC |
| 22194 | PLESTIN-LES-GREVES |
| 29182 | PLOUEGAT-GUERAND |
| 29183 | PLOUEGAT-MOYSAN |
| 29199 | PLOUIGNEAU |
| 22366 | TREMEL |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 1130<br>*Estuaires* | | 19,98<br>*(0,69 %)* | | G | C | C | B | B |
| 1140<br>*Replats boueux ou sableux exondés à marée basse* | | 29,08<br>*(1 %)* | | G | B | C | B | B |
| 1310<br>*Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses* | | 0,34<br>*(0,01 %)* | | G | C | C | B | B |
| 1330<br>*Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)* | | 13,59<br>*(0,47 %)* | | G | C | C | B | B |
| 3110<br>*Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)* | | 0,09<br>*(0 %)* | | G | D | | | |
| 3260<br>*Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion* | | 12,4<br>*(0,43 %)* | | G | A | C | A | A |
| 4020<br>*Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix* | X | 21,62<br>*(0,74 %)* | | G | C | C | B | B |
| 4030<br>*Landes sèches européennes* | | 5,54<br>*(0,19 %)* | | G | C | C | A | A |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 11,83<br>*(0,41 %)* | | G | C | C | B | B |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 12,27<br>*(0,42 %)* | | G | D | | | |
| 7110<br>*Tourbières hautes actives* | X | 0,01<br>*(0 %)* | | G | D | | | |
| 7120<br>*Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle* | | 0,53<br>*(0,02 %)* | | G | C | C | B | B |
| 7150 | | 0,01 | | G | D | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion* | | *(0 %)* | | | | | | |
| 8220<br>*Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique* | | 0,16<br>*(0,01 %)* | | G | B | C | A | B |
| 8230<br>*Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii* | | 0,03<br>*(0 %)* | | G | D | | | |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 5,82<br>*(0,2 %)* | | G | D | | | |
| 9120<br>*Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)* | | 683,84<br>*(23,54 %)* | | G | C | C | B | B |
| 9130<br>*Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum* | | 14,48<br>*(0,5 %)* | | G | D | | | |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1007 | *Elona quimperiana* | p | | | i | P | DD | B | B | C | B |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | 12 | 246 | colonies | P | G | C | C | C | B |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | P | DD | D | | | |
| F | 1095 | *Petromyzon marinus* | r | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| F | 1096 | *Lampetra planeri* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |
| F | 1106 | *Salmo salar* | r | 11,99 | 66 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | p | 129 | 129 | i | C | DD | C | B | C | B |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | p | 1 | 3 | i | P | G | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | p | | | i | P | DD | D | | | |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | p | | | i | P | DD | D | | | |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | | | i | C | DD | C | B | C | B |
| F | 5315 | *Cottus perifretum* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| F | | *Anguilla anguilla* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Myotis mystacinus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Myotis nattereri* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Myotis daubentoni* | | | i | P | | | | | | X |
| M | | *Pipistrellus pipistrellus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Plecotus auritus auritus* | | | | | | | | | X | |
| M | | *Martes martes* | | | i | P | | X | X | | X | |
| M | | *Mustela putorius* | | | i | P | | X | X | | X | |
| P | | *Dactylorhiza incarnata* | | | i | P | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Drosera intermedia* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Drosera rotundifolia* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Dryopteris aemula* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Narthecium ossifragum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Pinguicula lusitanica* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Platanthera bifolia* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Rhynchospora alba* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Scirpus cespitosus subsp. germanicus* | | | i | P | | | | | | X |
| R | | *Lacerta vivipara* | | | i | P | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N01 : Mer, Bras de Mer | 1 % |
| N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) | 2 % |
| N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées | 1 % |
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 3 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 5 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 40 % |
| N14 : Prairies ameliorées | 2 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 40 % |
| N19 : Forêts mixtes | 4 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 1 % |

### Autres caractéristiques du site

Cours du Douron de l'estuaire aux sources, aux côteaux boisés, et landes formant un continuum d'espaces peu ou pas anthropisés exceptionnel.

Vulnérabilité
: Site à forte valeur patrimoniale du fait de l'état de conservation des habitats et de l'absence relative d'intervention anthropique directe. Il s'agit par conséquent d'assurer une veille permanente visant à prévenir d'éventuelles perturbations ou dégradations, même si celles-ci paraissent marginales, concernant en particulier la qualité de l'eau provenant du bassin-versant, le maintien du régime hydraulique, la préservation des gîtes à Chiroptères, et d'une manière générale la tranquillité des lieux, l'ensemble du site pouvant être considéré comme habitat de la Loutre (annexe II).

## 4.2 Qualité et importance

Site remarquable par l'excellent état de conservation, de la source à l'exutoire côtier, de l'habitat "Rivières à renoncules" et des habitats riverains (côteaux boisés relevant localement de la hêtraie-chênaie atlantique à houx; landes sèches). Le Douron abrite en particulier six espèces de Chiroptères d'intérêt communautaire (seule colonie de reproduction du petit rhinolophe en Bretagne), un peuplement salmonicole d'une exceptionnelle densité (Saumon atlantique: annexe II; truites fario). L'importance qualitative et quantitative de l'ichtyofaune ainsi que le niveau de conservation des habitats permettent une exploitation optimale du milieu par la Loutre (et autres Mustélidés), sur la totalité du linéaire de rivière.
Ce site intègre par ailleurs deux complexes de landes humides (Kernebet, Keravel) comportant des secteurs de tourbière active à Narthécie (habitat prioritaire).

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | O |
| H | B | Sylviculture et opérations forestières | | O |
| L | A04 | Pâturage | | I |
| L | A05.01 | Elevage | | I |
| L | E01.03 | Habitations dispersées | | I |
| L | F01 | Aquaculture (eau douce et marine) | | I |
| L | F02.03 | Pêche de loisirs | | I |
| L | F03.01 | Chasse | | I |
| L | J02.06 | Captages des eaux de surface | | I |
| M | B01.02 | Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) | | I |
| M | H01 | Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |
| Propriété d'une association, groupement ou société | % |

## 4.5 Documentation

- Conseil supérieur de la pêche (1992), Comptage des frayères de saumons dans les cours d'eau de Bretagne. Délégation CSP Bretagne/Basse Normandie.
- LAFONTAINE (1996), Espaces naturels régionaux prioritaires pour les mammifères d'intérêt européen.
- Centre régional de la propriété forestière (1997), Evaluation des habitats forestiers d'intérêt européen en forêt privée

- " Suivi d'abondance de juvéniles de saumons en 2000 - Bassin du Douron - Actions en faveur des poissons migrateurs - Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 ", Région Bretagne, Europe, Agence Eau, CSP, DIREN, Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des Côtes d'Armor, décembre 2000, 15 pages + annexes.

- " Suivi d'abondance de juvéniles de saumons en 1999 - Bassin de l'Elorn - Actions en faveur des poissons migrateurs - Contrat de plan Etat-Région 1994-1999 " Région Bretagne, Europe, Agence Eau, CSP, DIREN Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des Côtes d'Armor, janvier 2000, 14 pages + annexes.

- " Suivi d'abondance de juvéniles de saumon atlantique sur six bassins versants du Finistère en 2002 - Odet, Aulne, Elorn, Douron, Ellé-Isole, Goyen - Milieux aquatiques et poissons migrateurs - Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 (2 exemplaires) " Agence de l'Eau Loire Bretagne, Europe, DIREN, Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Finistère, Région Bretagne, Préf. Région, décembre 2002, 49 pages + annexes.

- " Résultats de la campagne 2001 de suivi d'abondance de juvéniles de saumon sur cinq bassins versants du Finistère - Odet, Aulne, Elorn, Douron, Ellé-Isole - Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 (2 exemplaires) ", Agence de l'Eau Loire

Bretagne, Europe, DIREN , Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Finistère, novembre 2001, 44 pages + annexes.

- " Gestion des espaces naturels sensibles - proposition de solutions juridiques opérationnelles ", Région Bretagne, Europe, Agence Eau, CSP, DIREN, Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des Côtes d'Armor, décembre 2000, 90 pages.

- " Description des habitats piscicoles et estimation du potentiel de production en juvéniles de saumon atlantique (salmo salar L.) sur le bassin du Douron et annexe : cartographie ", DIREN Bretagne, CG 29, Agence Eau Loire-Bretagne, CSP, Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Finistère, Région Bretagne, Ouest Grands Migrateurs, octobre 2004, 26 pages + annexes.

- " Suivi d'abondance de juvéniles de saumon atlantique sur sept bassins versants du Finistère en 2003 - Odet - Aulne - Elorn - Douron - Ellé-Isole - Goyen - Aven - Milieux aquatiques et poissons migrateurs - Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 " Région Bretagne, Europe, Agence Eau, CSP, DIREN, Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Finistère, décembre 2003, 38 pages + annexes.

- " Suivi d'abondance de juvéniles de saumon atlantique sur sept bassins versants du Finistère en 2004 - Odet - Aulne - Elorn - Douron - Ellé - Goyen - Aven - Milieux aquatiques et poissons migrateurs - Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 ", Région Bretagne, Europe, Agence Eau, CSP, DIREN, Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Finistère, novembre 2004, 49 pages + annexes.

- Anne-Marie JEGOU, " Fichier technique des estuaires bretons (fichier type et méthode de travail)", SEPNB, CNEXO, Ministère qualité de la vie, février 1975, 6 pages + annexes.

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 80 | Parc naturel régional | 4 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 80 | Armorique | * | 4% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

## 5.3 Désignation du site

# 6. GESTION DU SITE

## 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Morlaix Communauté

Adresse : 2b voie d'accès au port BP 97121  29671  Morlaix

Courriel : gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

## 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : Docob - Charte
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/9_FR5300004_docob_charte.pdf
Nom : Docob - Tome1 Etat des lieux
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/9_FR5300004_docob_tome1.pdf
Nom : Docob - Tome2 Actions, objectifs
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/9_FR5300004_docob_tome2.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

## 6.3 Mesures de conservation