NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR5310093 - Baie de Quiberon

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5310093

1.3 Appellation du site

Baie de Quiberon

1.4 Date de compilation

31/12/1993

1.5 Date d'actualisation

22/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Bretagne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/12/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/10/TREL1921653A/jo/texte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -3,15°

Latitude : 47,53333°

2.2 Superficie totale

912 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

98%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
53	Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
56	Morbihan	2 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
56034	CARNAC
56168	PLOUHARNEL
56234	SAINT-PIERRE-QUIBERON

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A001	*Gavia stellata*	w	38	38	i	P	M	C	B	C	B
B	A002	*Gavia arctica*	w	1	22	i	P	M	C	B	C	B
B	A003	*Gavia immer*	w	9	9	i	P	M	B	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	73	73	i	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	29	29	i	P	G	C	B	C	B
B	A007	*Podiceps auritus*	w	5	5	i	P	G	B	B	C	B
B	A007	*Podiceps auritus*	c	12	12	i	P	M	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	271	271	i	P	G	B	A	C	A
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c	380	380	i	P	M	C	B	C	B

B	A013	*Puffinus puffinus*	c	1230	1230	i	P	M	B	B	C	B
B	A016	*Morus bassanus*	c	26	26	i	P	M	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	92	92	i	P	G	B	B	C	B
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	w	15	15	i	P	G	C	B	C	B
B	A018	*Phalacrocorax aristotelis*	r	33	33	p	P	M	C	A	C	A
B	A026	*Egretta garzetta*	w	110	110	i	P	G	C	A	C	A
B	A028	*Ardea cinerea*	w	31	31	i	P	G	C	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	11	11	i	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	w	16	16	i	P	G	C	B	C	B
B	A043	*Anser anser*	w	0	1	i	R	G	D			
B	A045	*Branta leucopsis*	w	1	1	i	R	G	C	B	C	B
B	A046	*Branta bernicla*	w	4203	4203	i	P	G	C	A	C	A
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	429	429	i	P	G	C	A	C	A
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	10	20	p	P	P	C	A	C	A
B	A052	*Anas crecca*	w	219	219	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	123	123	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	11	100	p	P	M	C	A	C	A
B	A054	*Anas acuta*	w	1	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	1	i	R	G	D			
B	A063	*Somateria mollissima*	w	5	5	i	P	G	C	B	C	B
B	A064	*Clangula hyemalis*	w	8	8	i	P	G	C	B	C	B
B	A065	*Melanitta nigra*	w	155	155	i	P	M	C	B	C	B
B	A066	*Melanitta fusca*	w	0	30	i	V	DD	C	A	C	A

B	A067	*Bucephala clangula*	w	0	0	i	R	G	D			
B	A069	*Mergus serrator*	w	31	31	i	P	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	1	i	R	P	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	61	61	i	P	G	C	B	C	B
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	894	894	i	P	G	C	A	C	A
B	A130	*Haematopus ostralegus*	r	5	5	p	P	M	C	A	C	A
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	739	739	i	P	G	B	A	C	A
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	400	800	i	P	DD	C	A	C	A
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w	1	5	i	P	G	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	10	40	i	P	DD	B	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	240	240	i	P	G	C	A	C	A
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	477	477	i	P	G	C	A	C	A
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	445	445	i	P	G	C	A	C	A
B	A143	*Calidris canutus*	w	575	575	i	P	G	C	A	C	A
B	A144	*Calidris alba*	w	1473	1473	i	P	G	B	A	C	A
B	A144	*Calidris alba*	c	300	700	i	P	DD	B	A	C	A
B	A145	*Calidris minuta*	w	1	11	i		G	D			
B	A148	*Calidris maritima*	w	27	27	i	P	G	C	A	C	A
B	A149	*Calidris alpina*	w	5664	5664	i	P	G	C	A	C	A
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	9	9	i	P	M	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	w	55	55	i	P	G	C	A	C	A
B	A157	*Limosa lapponica*	c	80	300	i	P	DD	C	B	C	B
B	A160	*Numenius arquata*	w	206	206	i	P	G	C	A	C	A

B	A162	*Tringa totanus*	w	173	173	i	P	G	C	A	C	A
B	A164	*Tringa nebularia*	w	27	27	i	P	G	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	1	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	w	933	933	i	P	G	B	A	C	A
B	A169	*Arenaria interpres*	c	700	700	i	P	DD	C	B	C	B
B	A171	*Phalaropus fulicarius*	w	1	1	i	R	G	D			
B	A172	*Stercorarius pomarinus*	c	2	2	i	P	M	D			
B	A173	*Stercorarius parasiticus*	c	2	2	i	P	M	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	432	432	i	P	G	B	A	C	A
B	A182	*Larus canus*	w	12	12	i	P	G	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	r	40	60	p	P	M	C	A	C	A
B	A184	*Larus argentatus*	r	1200	1583	p	P	M	B	B	C	B
B	A187	*Larus marinus*	r	37	37	p	P	M	C	A	C	A
B	A200	*Alca torda*	w	16	16	i	P	G	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w	4	4	i	P	M	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	9	9	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	*Spatula clypeata*	w	35	35	i	P	G	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	w	3	3	i	R	P	D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	6	6	i	P	G	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	2	2	i	P	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	50 %
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	40 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	5 %
N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots	5 %

Autres caractéristiques du site

Le site Natura 2000 "Baie de Quiberon est scindé en deux entités constituées de la Baie de Plouharnel au Nord-Est de l'isthme de Pentièvre et d'un archipel d'îlots rocheux à l'ouest.
La baie de Plouharnel présente sur un espace restreint une importante diversité d'habitats (16 déclinés en 27 faciès) :les formations de schorre et de slikke sont en bon état, les habitat sédimentaires sont variés, les herbiers à Zostera noltii occupent plus de 50 ha des fonds meubles. Cette variété gage d'une grande diversité biologique et d'une importante capacité trophique de la Baie de Quiberon : production primaire pélagique et microphytobenthique, production secondaire pélagique (zooplancton) et benthique (macrozoobenthos), et les consommateurs secondaires (oiseaux et poissons).

Vulnérabilité
:

4.2 Qualité et importance

La Baie de Quiberon s'inscrit à une échelle plus large dans un réseau de sites (Rade de Lorient, Golfe du Morbihan, Rivière de Pénerf...)au sein duquel les oiseaux (limicoles et anatidés) peuvent évoluer, notamment en période inter-nuptiale. Cette configuration fait de la baie de Plouharnel un site d'importance nationale pour l'hivernage de huit oiseaux d'eau : la bernache cravant, l'huitrier-pie, le grand gravelot, le pluvier argenté, le bécasseau sanderling, le bécasseau variable, le chevalier gambette et le tournepierre à collier.
L'archipel rocheux (ile de Tréviec, ile de Guernic et îlots proches) présente surtout un intérêt pour la nidification des oiseaux marins. Il accueil ainsi une colonie comptant le cormoran huppé, le goéland brun, le goéland argenté et le goéland marin.
La nidification au sin de la ZPS de quelques couples d'huitrier-pie et de gravelot à collier interrompu est également mentionné.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	F03.01	Chasse		I
M	F06	Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte		I
M	G01.01	Sports nautiques		I
M	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

Old site code 206520

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	0 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	99 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	BAIE DE QUIBERON	/	0%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Reserve de chasse maritime 99%.Arrete de protection de biotope 1%.Domaine Public Maritime 99% .

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ] Oui

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[X] Non

6.3 Mesures de conservation