NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR5312005 - Rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5312005

1.3 Appellation du site

Rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet

1.4 Date de compilation

30/09/2005

1.5 Date d'actualisation

06/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Bretagne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/12/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/10/TREL1921653A/jo/texte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -4,19694°

Latitude : 47,86111°

2.2 Superficie totale

709 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

78%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
53	Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
29	Finistère	22 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
29037	COMBRIT
29085	ILE-TUDY
29135	LOCTUDY
29170	PLOMELIN
29220	PONT-L'ABBE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A003	*Gavia immer*	w	0	3	i	R	M	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	13	52	i	P	G	C	B	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	5	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A006	*Podiceps grisegena*	w	1	1	i	R	G	D			
B	A007	*Podiceps auritus*	w	0	4	i	P	G	C	B	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	9	54	i	P	G	C	B	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	132	171	i	P	P	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	3	i	P	P	C	B	C	B
B	A025	*Bubulcus ibis*	w	0	85	i	P	M	C	B	C	B

B	A026	*Egretta garzetta*	w	10	120	i	P	M	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	r	20	30	p	P	M	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	w	3	170	i	P	M	C	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	26	53	i	P	M	B	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	16	220	i	P	G	A	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	w	2	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A045	*Branta leucopsis*	w	1	1	i	R	G	D			
B	A046	*Branta bernicla*	w	321	885	i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	141	458	i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	1	2	p	P	P	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	211	1250	i	P	G	C	A	C	A
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	0	125	i	P	G	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	102	350	i	P	G	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	0	6	i	P	G	D			
B	A062	*Aythya marila*	w	0	2	i	R	G	D			
B	A063	*Somateria mollissima*	w	0	2	i	R	P	D			
B	A064	*Clangula hyemalis*	w	0	1	i	R	G	D			
B	A065	*Melanitta nigra*	w	0	6	i	P	P	D			
B	A067	*Bucephala clangula*	w	0	3	i	P	G	D			
B	A069	*Mergus serrator*	w	10	42	i	P	G	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	r	8	8	p	P	G	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	1	2	i	P	P	C	B	C	B

B	A092	*Hieraaetus pennatus*	p	1	1	p	P	G	C	B	A	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	5	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	1	i	P	P	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	2	i	P	P	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	w	0	10	i	P	P	C	B	C	B
B	A119	*Porzana porzana*	w	0	3	i	R	P	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	w	0	16	i	P	P	C	B	C	B
B	A125	*Fulica atra*	w	0	23	i	P	G	C	B	C	B
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	8	240	i	P	G	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	106	210	i	P	G	C	B	C	B
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	53	590	i	P	G	B	A	C	A
B	A140	*Pluvialis apricaria*	w	0	3700	i	P	M	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	150	1000	i	P	G	C	A	C	A
B	A142	*Vanellus vanellus*	w	0	2000	i	P	P	C	A	C	A
B	A143	*Calidris canutus*	w	17	97	i	P	G	C	B	C	B
B	A144	*Calidris alba*	w	0	315	i	P	G	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	1461	11000	i	C	G	B	A	C	A
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	w	0	1	i	P	P	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	0	300	i	P	M	C	B	C	B
B	A155	*Scolopax rusticola*	w	0	3	i	P	P	C	B	C	B
B	A156	*Limosa limosa*	w	0	64	i	P	G	C	B	C	B
B	A157	*Limosa lapponica*	w	5	170	i	P	G	C	B	C	B
B	A158	*Numenius phaeopus*	w	0	6	i	P	G	B	B	C	B

B	A160	*Numenius arquata*	w	39	540	i	P	G	C	A	C	A
B	A161	*Tringa erythropus*	w	0	4	i	P	G	C	B	C	B
B	A162	*Tringa totanus*	w	49	354	i	P	G	B	B	C	B
B	A164	*Tringa nebularia*	w	4	23	i	P	G	B	A	C	A
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	0	21	i	P	M	C	B	C	B
B	A169	*Arenaria interpres*	w	12	247	i	P	G	C	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	0	100	i	P	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	0	3000	i	P	P	C	B	C	B
B	A182	*Larus canus*	w	0	10	i	P	P	C	B	C	B
B	A183	*Larus fuscus*	w	0	61	i	P	P	C	B	C	B
B	A184	*Larus argentatus*	w	0	150	i	P	P	C	B	C	B
B	A187	*Larus marinus*	w	0	15	i	P	P	C	B	C	B
B	A199	*Uria aalge*	w	0	1	i	R	P	D			
B	A200	*Alca torda*	w	0	6	i	P	P	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	5	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w	1	6	i	P	P	C	B	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	p	1	1	p	P	G	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	591	1515	i	P	G	C	A	C	A
B	A857	*Spatula clypeata*	w	0	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A861	*Calidris pugnax*	w	53	53	i	P	P	B	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	w	6	6	i	P	P	B	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	0	27	i	P	P	B	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	0	6	i	P	G	C	B	C	B

B	A604	*Larus michahellis*	w	1	1	i	R	P	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	3	4	p	P						X
B		*Accipiter gentilis*	1	1	p	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	75 %
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	8 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	2 %
N19 : Forêts mixtes	15 %

Autres caractéristiques du site

Dans le sud-ouest du Finistère, les rivières de Pont l'Abbé et l'Odet sont distantes de 5 kilomètres. Ces zones humides constituent un ensemble fonctionnel cohérent et les échanges au niveau de l'avifaune sont réguliers tout au long de l'année et concernent plusieurs espèces de l'annexe I de la Directive " Oiseaux ". Ces deux grands sites naturels figurent parmi les ensembles paysagers remarquables du département.

Vulnérabilité
: Il reviendra au comité de pilotage local réunissant tous les acteurs concernés de décliner les objectifs en fonction des caractéristiques propres à chaque espace, des exigences écologiques des espèces présentes et de valider leur faisabilité locale dans le cadre du document d'objectifs qui sera élaboré pour la gestion du site. Sans anticiper sur cette phase de concertation, des orientations générales peuvent d'ores et déjà être indiquées, dont certaines confortent des pratiques déjà mises en oeuvre.

Sur la rivière de Pont l'Abbé, la vasière située à l'ouest de l'île Chevalier ainsi que l'anse du Pouldon sont des secteurs classés en réserve de chasse du domaine public maritime, sur une surface de 208 ha. Le bois de Bodilio et la partie ouest de l'estuaire sont en ZNIEFF de type I. Le classement en ZPS n'entraînera pas de modifications pour la pratique de la chasse.
Dans l'estuaire de la rivière de Pont l'Abbé, différentes études font état d'une fréquentation anarchique par de petites embarcations (canots, kayak,
) provoquant des dérangements répétés à l'avifaune durant l'hivernage, ce qui limite le rôle d'accueil de ces sites pour les oiseaux, avec un possible impact sur leur survie. Pour réduire les effets négatifs des activités nautiques sur l'avifaune, des couloirs de navigation seront à délimiter en concertation avec les différents usagers.
Ces mesures de gestion prévisibles ne concernent qu'un nombre très limité d'usagers et ne remettent pas en cause les différentes activités dans la ZPS. En revanche, elles sont de nature à diminuer la distance de fuite des oiseaux et à terme, à en augmenter les effectifs. Il en résultera donc un bénéfice significatif pour le nombre croissant de personnes sensibles à la découverte de la nature et cela contribuera au développement du tourisme dans la région.

4.2 Qualité et importance

Dans un cadre grandiose bien desservi par des chemins de randonnée et des postes d'observation, plusieurs espèces spectaculaires sont facilement visibles par un large public. C'est le cas pour la spatule blanche, les hérons et aigrettes, canards et limicoles nombreux du début de l'automne à la fin de l'hiver. Aussi depuis quelques années, se développe dans ces deux secteurs une fréquentation touristique basée sur la découverte de la nature encouragée et encadrée par les communes riveraines.

Les effectifs hivernants de spatule blanche confèrent à la ZPS un niveau d'importance internationale pour cette espèce.

La ZPS abrite également :
- 7% de l'effectif de chevalier gambette hivernant en France et figure dans les trois plus importants site nationaux pour l'hivernage de cette espèce,
- 1,9% de l'effectif de barge rousse hivernant en France,
- 1 % de l'effectif d'avocette élégante hivernant en France.

Au total, la ZPS a une valeur d'importance nationale pour une douzaine d'espèces de limicoles et de canards

La rivière de Pont l'Abbé figure parmi les plus importants sites d'hivernage au plan national pour la spatule blanche et le chevalier gambette. Il est possible qu'a court terme la spatule blanche se reproduise dans la colonie de héron cendré et d'aigrette garzette du bois de Bodilio.

Dans l'estuaire de l'Odet les rapaces atteignent une diversité et des densités remarquables en Bretagne. C'est le seul point de reproduction de l'aigle botté dans l'ouest de la France. Plusieurs individus de balbuzard pêcheur stationnent en août et septembre.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	B03	Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle		I
L	D01.01	Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)		I
L	F01	Aquaculture (eau douce et marine)		I
L	F02.02	Pêche professionnelle active (arts trainants)		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
L	F03.01	Chasse		I
L	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
L	G01.01	Sports nautiques		I
L	G01.08	Autres activités de plein air et de loisirs		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%
Domaine public maritime	%

4.5 Documentation

GUERMEUR Y. et J.Y. MONNAT 1980. Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. SEPNB/Ar Vran/DPN. 240 pages.

MAHEO R. 2003. Synthèse des comptages Wetlands International. Station biologique de Bailleron, Séné.

MOREL R. & BARGAIN B. 2003. L'avifaune de l'estuaire de l'Odet (Finistère Sud). État des connaissances sur l'avifaune nicheuse, migratrice et hivernante de l'estuaire de l'Odet de 1967 à 2003. Rapport Bretagne Vivante/ SAGE Odet. 37 pages.

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherches de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d'Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. Paris, 560 pages.

TREBAOL R. 2003. Suivi naturaliste dans l'estuaire de Pont l'Abbé. Rosquerno Estuaire.14 pages

Autres acteurs fournisseurs de données : l'association Rosquerno Estuaire et le Groupe Ornithologique breton.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	15 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	6 %
32	Site classé selon la loi de 1930	2 %
54	Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime	30 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Les périmètres proposés à désignation en ZPS sont quasiment intégralement constitués par des habitats d'intérêt communautaire et en particulier de vasières, prés salés et lagunes.
Le périmètre prend en compte les principales zones d'alimentation (vasières) et de repos (herbus) pour les espèces d'oiseaux d'intérêt majeur.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : communauté de communes Pays Bigouden Sud

Adresse : 17, rue Raymonde Folgoas Guillou - BP 82 035 29122 Pont L'Abbé

Courriel : b.buisson@ccpbs.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Docob - Rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1512_DOCOB_N2000_PA_allege.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Pour partie : Conservatoire du littoral