NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR5412011 - Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5412011

1.3 Appellation du site

Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord

1.4 Date de compilation

30/06/2000

1.5 Date d'actualisation

15/05/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Poitou-Charentes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 29/03/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038370678

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,76583°

Latitude : 45,31194°

2.2 Superficie totale

12508 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
54	Poitou-Charentes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
17	Charente-Maritime	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
17015	ARCES
17034	BARZAN
17060	BOUTENAC-TOUVENT
17098	CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET
17152	EPARGNES
17160	FLOIRAC
17210	LORIGNAC
17228	MEDIS
17230	MESCHERS-SUR-GIRONDE
17248	MORTAGNE-SUR-GIRONDE
17306	ROYAN
17312	SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE
17325	SAINT-DIZANT-DU-GUA
17328	SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
17333	SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
17335	SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS
17405	SAINT-SORLIN-DE-CONAC
17410	SAINT-THOMAS-DE-CONAC
17425	SEMUSSAC

17437	TALMONT-SUR-GIRONDE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	r	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A480	*Cyanecula svecica*	c	200	400	i	P	G	B	B	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	5	10	p	P	G	C	C	C	C
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	P	DD	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P	DD	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	3	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A024	*Ardeola ralloides*	r			p	P	DD	C	C	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	r	1	1	p		G	C	C	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	w	10	100	i	P	G	C	B	C	C

B	A026	*Egretta garzetta*	r	18	18	p		G	C	B	C	C
B	A026	*Egretta garzetta*	c	10	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	r	137	137	p		G	C	C	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	r	6	11	p	P	G	C	C	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	12	17	p	P	G	C	B	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	10	100	i	P	G	C	C	C	C
B	A043	*Anser anser*	w	10	100	i	P	G	C	C	C	C
B	A043	*Anser anser*	c	1000	1500	i	P	G	C	C	C	C
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	100	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	r	2	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	10	50	i	P	M	C	C	C	C
B	A054	*Anas acuta*	w	10	50	i	P	M	C	C	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	0	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	c	500	1000	i	P	G	C	C	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	5	12	p	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c	100	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	r			p	V	P	C	C	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	w	10	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	15	25	p	P	G	C	B	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	w	2	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A082	*Circus cyaneus*	r	2	10	p	P	M	C	C	C	C

B	A084	*Circus pygargus*	r	5	10	p	P	M	C	C	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	w	1	3	i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c	10	50	i	P	G	C	C	C	B
B	A122	*Crex crex*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A127	*Grus grus*	c	100	500	i	P	G	C	C	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	7	8	p	P	G	C	B	C	C
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	700	800	i	P	G	B	C	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	r	6	6	p		G	C	C	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	r	4	8	p	P	G	C	C	C	C
B	A137	*Charadrius hiaticula*	w	100	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	1000	1500	i	P	G	B	C	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	w	100	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	19	23	p		G	C	C	C	C
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	1000	2000	i	P	G	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	w	1000	3000	i	P	G	C	B	C	B
B	A149	*Calidris alpina*	c	200	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	10	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A153	*Gallinago gallinago*	c	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	100	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	w	30	100	i	P	G	C	C	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	c	100	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	w	10	50	i	P	G	C	C	C	C
B	A162	*Tringa totanus*	r	1	2	p		G	C	C	C	C

B	A162	*Tringa totanus*	c	100	200	i	P	G	C	C	C	C
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	10	50	i	P	G	C	C	C	C
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	10	i	P	M	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	0	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	r	5	10	p	P	G	C	B	C	C
B	A255	*Anthus campestris*	r			p	P	DD	C	C	C	C
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c	500	1500	i	P	G	B	C	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r	15	30	p	P	M	C	B	C	C
B	A773	*Ardea alba*	w	1	2	i	P	G	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	w	10	10	i	P	M	C	C	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	r			p	P	DD	C	C	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	w	10	50	i	P	M	C	C	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	1	10	i	P	G	D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	1	10	i	P	M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		Falco subbuteo			i	P						X
B		Streptopelia turtur	100	160	p				X		X	
B		Riparia riparia	10000		i	P						X
B		Hirundo rustica	0	2000	i	P			X		X	
B		Anthus trivialis	2000	4000	i	P			X		X	
B		Motacilla flava	1000	6000	i	P			X		X	
B		Remiz pendulinus	500	2000	i	P						X
B		Saxicola rubetra	50	200	i	P			X		X	
B		Cettia cetti	1000	2000	i	P			X		X	
B		Cisticola juncidis	200	400	i	P			X		X	
B		Locustella naevia	200	400	i	P			X		X	
B		Locustella luscinioides	100	250	i	P						X
B		Acrocephalus schoenobaenus	100	250	i	P						X
B		Acrocephalus scirpaceus	15000	30000	i	P			X		X	
B		Acrocephalus arundinaceus	20	80	i	P						X
B		Hippolais polyglotta	100	500	i	P			X		X	
B		Sylvia communis	1500	3000	i	P			X		X	
B		Sylvia borin	2000	4000	i	P			X		X	
B		Sylvia atricapilla	2000	4000	i	P			X		X	

B		*Phylloscopus trochilus*	3000	6000	i	P			X		X	
B		*Panurus biarmicus*	5	10	p	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N01 : Mer, Bras de Mer	2 %
N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	50 %
N15 : Autres terres arables	25 %
N16 : Forêts caducifoliées	1 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

L'essentiel du site est constitué par les prairies naturelles humides. Des prés salés et des roselières étendues sont situées en avant des digues, entrecoupées par un réseau de fossés à dense végétation aquatique. Les vasières intertidales faisant partie de l'estuaire proprement dit sont également comprises dans le périmètre.
Une ligne de falaises mortes ou vives de calcaire crayeux s'étendant de Mortagne à Talmont forme à certains endroits la limite nord-est de la ZPS.
Quelques secteurs de marais bocagers subsistent en bordure du site.

Vulnérabilité
: Le facteur majeur de perte et d'altération des habitats est dû aux mutations agricoles récentes, se traduisant par le drainage et la mise en culture.
D'importantes surfaces de prairies naturelles autrefois consacrées au pâturage extensif sont maintenant occupées par des cultures. En outre, cette intensification entraîne également une nette dégradation de la qualité de l'eau qui circule dans les fossés (eutrophisation, pullulation de pestes végétales - Jussie des marais Ludwigia sp.pl. - et animales - ragondin-) qui se traduit par un appauvrissement des biocénoses aquatiques.

4.2 Qualité et importance

23 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont inventoriées dans cette ZPS.
Etant situé sur une voie de migration, ce site présente une importance toute particulière comme lieu de passage et de halte migratoire de plusieurs espèces patrimoniales, dont le Butor étoilé, la Cigogne noire, la Spatule blanche, la Bondrée apivore, le Milan noir, la Marouette ponctuée, la Grue cendrée,... Les prairies humides offrent des milieux propices à la reproduction de limicoles nicheurs et des Busards. Les roselières sont importantes pour la reproduction d'espèces paludicoles et de site de halte migratoire pour de nombreux passereaux.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	E01	Zones urbanisées, habitations		I
H	G05	Autres intrusions et perturbations humaines		I

L	F03.01	Chasse		B
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		B
M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		O
M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		B
M	A08	Fertilisation		B
M	D03.01	Zones portuaires		I
M	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	F03.02.03	Piégeage, empoisonnement, braconnage		I
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	J02.06	Captages des eaux de surface		B

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

CAUPENNE, M. 1999. Recensement des colonies de hérons arboricoles nicheurs de la Charente-Maritime en 1997 et suivi du Héron pourpré en 1997 et 1998. Rapport LPO.
CAUPENNE, M. 2000. Bilan de la nidification 1999 de 4 espèces patrimoniales des marais charentais : Cigogne blanche, Héron pourpré, Spatule blanche, Guifette noire. Rapport LPO.
CAUPENNE, M. & MATARD, M. en préparation. Résultats de la première année d'enquête Rapaces Nicheurs en Charente-Maritime, 2000. LPO/Conseil Régional de Poitou-Charentes.
LPO-BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000. Base de données ZICO. Inventaire avifaunistique et description des 285 ZICO de France.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté d#Agglomération Royan Atlantique

Adresse : 107 avenue de Rochefort 17200 ROYAN

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB des sites Natura 2000 "Marais et falaises des coteaux de Gironde" (FR5400438) et "Estuaire de la Gironde: marais de la rive nord" (FR5412011)
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1524_Volume_de_synthese.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation