NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR7200683 - Marais du Haut Médoc

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 9
6. GESTION DU SITE ..... 10

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR7200683

### 1.3 Appellation du site

Marais du Haut Médoc

### 1.4 Date de compilation

30/11/1995

### 1.5 Date d'actualisation

15/04/2013

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Aquitaine | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/11/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738176

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** -,81398°

**Latitude :** 45,31768°

## 2.2 Superficie totale

5055 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 72 | Aquitaine |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 33 | Gironde | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 33010 | ARCINS |
| 33012 | ARSAC |
| 33022 | AVENSAN |
| 33038 | BEGADAN |
| 33125 | CISSAC-MEDOC |
| 33128 | CIVRAC-EN-MEDOC |
| 33134 | COUQUEQUES |
| 33146 | CUSSAC-FORT-MEDOC |
| 33211 | LABARDE |
| 33268 | MARGAUX-CANTENAC |
| 33297 | MOULIS-EN-MEDOC |
| 33309 | ORDONNAC |
| 33314 | PAUILLAC |
| 33383 | SAINT-CHRISTOLY-MEDOC |
| 33395 | SAINT-ESTEPHE |
| 33412 | SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL |

| | |
|---|---|
| 33423 | SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE |
| 33424 | SAINT-LAURENT-MEDOC |
| 33471 | SAINT-SAUVEUR |
| 33476 | SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE |
| 33493 | SAINT-YZANS-DE-MEDOC |
| 33517 | SOUSSANS |
| 33538 | VALEYRAC |
| 33545 | VERTHEUIL |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 1410<br>*Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)* | | 5,05<br>*(0,1 %)* | | M | B | C | B | B |
| 3140<br>*Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.* | | 3,03<br>*(0,06 %)* | | M | C | C | B | C |
| 3150<br>*Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition* | | 1,01<br>*(0,02 %)* | | M | A | C | B | B |
| 6110<br>*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* | X | 0,51<br>*(0,01 %)* | | P | B | C | C | C |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 2,53<br>*(0,05 %)* | | M | B | C | C | C |
| 6220<br>*Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* | X | 0,51<br>*(0,01 %)* | | M | B | C | C | C |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 40,44<br>*(0,8 %)* | | M | A | C | B | B |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 35,38<br>*(0,7 %)* | | M | B | C | B | B |
| 7210<br>*Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae* | X | 12,1<br>*(0,24 %)* | | P | A | C | B | B |
| 8210<br>*Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique* | | 0,51<br>*(0,01 %)* | | M | A | C | B | C |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 202,2<br>*(4,8 %)* | | M | A | C | B | B |
| 91F0<br>*Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)* | | 576,26<br>*(11,4 %)* | | M | A | C | B | B |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9190<br>*Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur* | | 2,02<br>*(0,04 %)* | | M | A | C | B | B |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1044 | *Coenagrion mercuriale* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |
| I | 1060 | *Lycaena dispar* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | | | i | R | M | C | B | C | B |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | P | M | C | C | C | C |
| I | 1088 | *Cerambyx cerdo* | p | | | i | P | M | C | C | C | C |
| F | 1095 | *Petromyzon marinus* | r | | | i | P | M | C | B | C | B |
| F | 1096 | *Lampetra planeri* | p | | | i | R | G | C | B | C | B |
| F | 1099 | *Lampetra fluviatilis* | r | | | i | R | M | C | B | C | B |
| R | 1220 | *Emys orbicularis* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | p | | | i | R | P | C | B | C | C |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |
| M | 1356 | *Mustela lutreola* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| P | 1607 | *Angelica heterocarpa* | p | | | i | P | G | B | C | C | B |
| F | 5315 | *Cottus perifretum* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | P | M | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| A | | *Hyla meridionalis* | | | | C | X | | | | X | |
| A | | *Rana dalmatina* | | | | C | X | | | | X | |
| B | | *Nycticorax nycticorax* | | | | R | | | X | | X | |
| B | | *Ardea purpurea* | | | | R | | | | | X | |
| B | | *Milvus migrans* | | | | C | | | | | X | |
| B | | *Circus cyaneus* | | | | R | | | | | X | |
| B | | *Streptopelia turtur* | | 68 | cmales | | | | X | | X | |
| B | | *Lanius collurio collurio* | | | | C | | | | | | X |
| F | | *Esox lucius lucius* | | | | R | | | | | | X |
| F | | *Anguilla anguillia* | | | i | R | | | | | | X |
| P | | *Baccharis halimifolia* | | | | P | | | | | | X |
| R | | *Trachemys scripta elegans* | | | | C | | | | | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | | *Lacerta bilineata* | | | | C | | | | | X | |
| R | | *Hierophis viridiflavus* | | | | C | | | | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) | 0,04 % |
| N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées | 0,4 % |
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 2,8 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 3,2 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 0,1 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 37 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 11,5 % |
| N14 : Prairies ameliorées | 0,2 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 29 % |
| N17 : Forêts de résineux | 0,5 % |
| N19 : Forêts mixtes | 1,9 % |
| N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) | 7 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 0,2 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 0,01 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 5,15 % |

### Autres caractéristiques du site

Système de petites vallées drainant le plateau sableux médocain et se jetant dans l'estuaire de la Gironde dans la zone des palus

Vulnérabilité
: Présence d'espèces invasives dont la Tortue de Floride, le Baccharis et la Jussie.
Changement de spéculation agricole et intensification des pratiques (culture intensive de maïs dans le marais de Reysson), boisements artificiels notamment peupliers et robiniers.
Forte sensibilité des habitats et des espèces à la gestion des niveaux d'eau et à la qualité des eaux.

## 4.2 Qualité et importance

Importante diversité d'habitats, d'espèces animales et végétales inféodés aux zones humides dont la Loutre d'Europe, le Vison d'europe et l'Angélique des estuaires.
Site important pour les espèces piscicoles (présence de l'Anguille)

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A02.01 | Intensification agricole | | I |
| H | H01 | Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) | | I |
| H | I01 | Espèces exotiques envahissantes | | I |
| H | J02.04 | Modifications du régime de mise en eau | | I |
| L | B02.04 | Elimination des arbres morts ou dépérissants | | I |
| M | B01.02 | Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) | | I |
| M | B03 | Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle | | I |
| N | F01.01 | Aquaculture intensive, intensification | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04 | Pâturage | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 52 | Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA | 1 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Pays Médoc

Adresse : 21 rue du Général de Gaulle 33112 Saint Laurent Médoc

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectifs du site Natura 2000 FR7200683 - Marais du Haut Médoc
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/ficheinfo/?Code=FR7200683&Rubrique=DH

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation