NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200685 - Vallée et palus du Moron

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 9
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200685

1.3 Appellation du site

Vallée et palus du Moron

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

18/12/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/11/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738162

Explication(s) :

màj après validation en copil et reconsultation des collectivités locales + maj avec nouvelle espèce (1016 - Vertigo moulinsiana)

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,48081°

Latitude : 45,04817°

2.2 Superficie totale

945 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
33	Gironde	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
33067	BOURG
33123	CEZAC
33126	CIVRAC-DE-BLAYE
33142	CUBNEZAIS
33339	PRIGNAC-ET-MARCAMPS
33341	PUGNAC
33382	SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
33425	SAINT-LAURENT-D'ARCE
33439	SAINT-MARIENS
33473	SAINT-SAVIN
33489	SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE
33525	TAURIAC
33530	TEUILLAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		0,03 *(0 %)*		M	B	C	C	C
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0,15 *(0,02 %)*		M	B	C	C	C
3270 *Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.*		2,22 *(0,23 %)*		M	B	C	C	C
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	0,36 *(0,04 %)*		M	C	C	C	C
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		0,29 *(0,03 %)*		M	C	C	C	C
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		84,01 *(8,89 %)*		M	A	C	B	B
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	258 *(27,3 %)*		M	A	C	B	B
91F0 *Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)*		11 *(1,16 %)*		M	A	C	B	B
9160 *Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli*		9,3 *(0,98 %)*		M	C	C	B	C

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1016	*Vertigo moulinsiana*	p	5	5	localities	P	P	C	B	C	B
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	C	P	C	B	C	C
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	R	DD	C	B	C	C
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	C	DD	C	B	C	C
I	1071	*Coenonympha oedippus*	p			i	V	DD	C	C	B	C
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	C	DD	C	A	C	B
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	C	DD	C	A	C	B
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	V	DD	C	C	C	C
R	1220	*Emys orbicularis*	p			i	R	DD	C	C	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1356	*Mustela lutreola*	p			i	P	DD	C	B	B	B
P	1607	*Angelica heterocarpa*	p			i	V	DD	B	B	C	B

F	6150	*Parachondrostoma toxostoma*	p			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Hyla meridionalis*				C	X				X	
A		*Rana dalmatina*				C	X				X	
A		*Lissotriton helveticus*				C					X	
A		*Pelophylax kl. esculentus*				C		X			X	
B		*Egretta garzetta*				C					X	
B		*Ardea alba*				P			X		X	
B		*Ardea purpurea*				P					X	
B		*Ciconia ciconia*				C					X	
B		*Pernis apivorus*				C					X	
B		*Milvus migrans*				C					X	
B		*Milvus milvus*				P			X		X	
B		*Alcedo atthis*				C					X	

F		*Anguilla anguilla*				P			X		X	
F		*Esox lucius*				P			X	X		
I		*Aeshna isoceles*				R						X
P		*Butomus umbellatus*				R						X
P		*Leucojum aestivum*				C						X
P		*Littorella uniflora*				R						X
P		*Ranunculus ophioglossifolius*				R						X
P		*Utricularia australis*				R						X
P		*Fritillaria meleagris subsp. meleagris*				C						X
P		*Thalictrum flavum subsp. flavum*				P						X
R		*Lacerta bilineata*				C	X				X	
R		*Podarcis muralis*				C	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*				C	X				X	
R		*Natrix natrix*				C	X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	8,3 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	39 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2,4 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	3,3 %
N26 : Forêts (en général)	47 %

Autres caractéristiques du site

Le site Natura 2000 « Vallée et Palus du Moron » est situé en région Aquitaine, dans la partie Nord du département de la Gironde. Il et situé à une trentaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise et à 20 km de la sous-préfecture de Blaye.
Il correspond au cours principal du Moron et de ses affluents. Les milieux les plus humides adjacents au cours d'eau ont également été intégrés au site. Ils sont essentiellement constitués des zones de palus, de prairies, et de boisements alluviaux.

Vulnérabilité
: Changement de spéculations agricoles
Présence d'espèces envahissantes :
- LE RAGONDIIN ((MYOCASTOR COYPUS)
- LA GRENOUIILLE TAUREAU ((LIITHOBATES CATESBEIIANUS))
- L''ECREVIISSE DE LOUIISIIANE ((PROCAMBARUS CLARKIIII)
- LA TORTUE DE FLORIIDE ((TRACHEMYS SCRIIPTA--ELEGANS))
- LA JUSSIIE : la Jussie à grande fleur (Ludwigia grandiflora) et la Jussie à petite fleurs (Ludwigia peploides)
- RENOUEES ASIIATIIQUES : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), la Renouée Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) et la Renouée de bohême ou Renouée hybride (Reynoutria X bohemica) issue d'un croisement entre les deux premières.

4.2 Qualité et importance

Le site présente, sur une surface importante, une mosaïque de milieux humides favorables notamment à la présence du Vison d'Europe et de la Loutre d'Europe.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A03.03	Abandon / Absence de fauche		B
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
H	K01.03	Assèchement		B

L	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		B
M	A02.03	Retournement de prairies		I
M	A08	Fertilisation		I
M	B01	Plantation forestière en milieu ouvert		I
M	D01.02	Routes, autoroutes		I
M	E01.02	Urbanisation discontinue		B
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A03.02	Fauche non intensive		I
H	A04	Pâturage		I
H	A05.01	Elevage		B
H	L08	Inondation (processus naturels)		B
L	B02.01	Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après éclaircie)		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
L	F03.01	Chasse		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	100 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
00	Aucune protection	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Syndicat de Gestion du Bassin Versant du Moron et du Blayais

Adresse : 103 le bourg 33920 Saint Vivien de Blaye

Courriel : natura2000.moron@outlook.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200685
Lien :
https://www.sigena.fr/upload/gedit/1/_Patrimoine_NA/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/ZONAGES_NATURE/N2000/ZSC/FR7200685_DOCOB.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation