NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200754 - Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 8
6. GESTION DU SITE 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200754

1.3 Appellation du site

Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

29/10/2019

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/07/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029331467

Explication(s) :

Mise à jour suite à achèvement du processus de consultation de 2020 et ajustements/modifications des sites limitrophes du Saison et de Haute-Soule Baretous. : Superficie et centroïde mis à jour + Ajout de 2 habitats 8220 et 9180 ("présence à confirmer")suite à audit du CBNPMP de 2020-présence attestée mais pas de précision sur surface et état de conservation + Cartes SIG + Cartes pdf pour arrêté

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,19477°

Latitude : 43,07591°

2.2 Superficie totale

12749 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
64	Pyrénées-Atlantiques	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
64008	AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN
64011	AINCILLE
64047	ARNEGUY
64218	ESTERENCUBY
64327	LECUMBERRY
64379	MENDIVE
64492	SAINT-MICHEL
64538	UHART-CIZE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (28,06%)
Atlantique (71,94%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		1,01 *(0,01 %)*		G	B	C	A	B
4030 *Landes sèches européennes*		525 *(4,12 %)*		G	A	C	C	C
5110 *Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)*		8,7 *(0,07 %)*		G	B	C	A	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		1595 *(12,51 %)*		G	A	C	B	A
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	3661 *(28,72 %)*		G	A	B	B	A
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		5,32 *(0,05 %)*		M	C	C	B	C
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		0,1 *(0 %)*		P	D			
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		99 *(0,78 %)*		G	B	C	A	B
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		2,37 *(0,02 %)*		P	B	C	A	B
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		2,01 *(0,02 %)*		P	B	C	C	C
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		52,78 *(0,45 %)*		M	A	C	A	B
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		265,81 *(2,26 %)*		G	B	C	A	B

8310 *Grottes non exploitées par le tourisme*		0 *(%)*		G	A	C	A	B
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		1002 *(7,86 %)*		G	A	C	C	B
9230 *Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica*		0,01 *(0 %)*		M	D			

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1083	*Lucanus cervus*	p	27	27	i	C	G	C	B	C	B
I	1084	*Osmoderma eremita*	p			i	P	DD	D			
I	1087	*Rosalia alpina*	p	107	107	i	C	G	C	B	C	B
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p	47	47	i	P	G	C	B	C	B
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	r			i	C	M	C	A	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	V	M	C	A	C	C
M	1305	*Rhinolophus euryale*	r			i	R	M	C	B	C	B
M	1307	*Myotis blythii*	c			i	P	M	C	C	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	r			i	R	M	C	A	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	c			i	R	M	C	C	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	r	10	10	i	R	M	C	C	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	c			i	V	M	C	C	C	C

I	4026	*Rhysodes sulcatus*	p	1	2	i		M	C	C	C	C
P	6985	*Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel, 1966*	p			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*				C	X				X	
A		*Rana pyrenaica*				R			X		X	
A		*Calotriton asper*				R	X		X		X	
B		*Streptopelia turtur*	47	69	i				X		X	
I		*Maculinea alcon*				R						
I		*Maculinea arion*				R	X				X	
M		*Eptesicus serotinus*				C	X				X	
M		*Myotis mystacinus*				R	X				X	
M		*Myotis nattereri*				R	X				X	
M		*Nyctalus lasiopterus*				R	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				R	X				X	

M		*Nyctalus noctula*				R	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				C	X				X	
M		*Hypsugo savii*				R	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				R	X				X	
M		*Tadarida teniotis*				R	X				X	
M		*Myotis alcathoe*				R	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				R	X				X	
M		*Myotis daubentonii*				R	X				X	
P		*Narcissus bulbocodium*				C		X				
R		*Lacerta bilineata*				C	X				X	
R		*Podarcis muralis*				C	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*				C	X				X	
R		*Coronella austriaca*				C	X				X	
R		*Vipera seoanei*				R						
R		*Zamenis longissimus*				R	X				X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0,22 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	15,43 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	42,74 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	8,75 %
N15 : Autres terres arables	0,01 %
N16 : Forêts caducifoliées	30,03 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	0,02 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	0,09 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	2,67 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	0,04 %

Autres caractéristiques du site

Massif montagneux sur substrat calcaire.
Le site est composé de 3 trois grandes unités paysagères. Les estives, espaces pastoraux d'altitude (au-dessus de 800/900 m) ouverts sur de vastes étendues. Elles présentent des formations végétales variées principalement herbacées ainsi que plusieurs massifs forestiers. La zone intermédiaire, originalité de la montagne basque. En-dessous de 400 m, les prairies et les petites parcelles de culture dominent avec un fort maillage de petites exploitations. Entre 400 et 800 m, les pentes fortes sont recouvertes majoritairement de
fougères et parfois de bois feuillus, notamment sur les versants Nord. Les fonds de vallées : ce sont les zones les plus fortement peuplées (sous forme à la fois d'habitats dispersés et de villages ou de bourgs). Elles sont principalement occupées par des surfaces en herbe et des cultures (notamment le maïs) avec des structures parcellaires assez régulières.

Vulnérabilité
: - déséquilibre du pastoralisme, avec dans certains cas, une pression pastorale trop faible qui induit une fermeture des milieux, et dans d'autres cas, une pression trop forte, qui dégrade directement l'habitat (limitation de l'expression de la richesse floristique, mise à nu du sol
). Ce déséquilibre peut aussi entraîner une homogénéisation des milieux, défavorable aux chiroptères.
- dynamisme fort des espèces pyrophytes colonisatrices (ajonc, fougère aigle), dont la
présence, favorisée par des écobuages répétés, altère un certain nombre d'habitats.
- fonctionnalité de la hêtraie altérée du fait de peuplement très jeunes où l'absence de gros
bois ou de bois sénéscents est marquée ce qui dessert également les insectes saproxyliques.
- une pression, agro-pastorale comme forestière, trop marquée sur le site a pour conséquence une disparition des milieux de transition (ourlets, lisières), favorables aux déplacements des chiroptères notamment.

4.2 Qualité et importance

Montagne à estives

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.01	Pâturage intensif		I
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
L	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
M	A02.03	Retournement de prairies		I
M	A03.03	Abandon / Absence de fauche		I
M	A08	Fertilisation		I
M	K01.03	Assèchement		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A03.02	Fauche non intensive		I
H	A04.02	Pâturage extensif		I
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	48 %
Collectivité territoriale	52 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	35 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Commission syndicale du pays de Cize

Adresse : Place Charles de Gaulle 64220 Saint Jean Pied de Port

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200754
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200754.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation