NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7200809 - Réseau hydrographique de la Haute Dronne

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 10
6. GESTION DU SITE 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR7200809

1.3 Appellation du site

Réseau hydrographique de la Haute Dronne

1.4 Date de compilation

31/12/2004

1.5 Date d'actualisation

15/05/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 28/02/2006
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 13/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 27/10/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031425009

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : ,87333°

Latitude : 45,57083°

2.2 Superficie totale

2114 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
74	Limousin
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
24	Dordogne	70 %
87	Haute-Vienne	30 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
87027	BUSSIERE-GALANT
24101	CHAMPS-ROMAIN
87060	DOURNAZAC
24180	FIRBEIX
24269	MIALET
24271	MILHAC-DE-NONTRON
24479	SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE
24486	SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
24498	SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (,23%)
Continentale (99,77%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3110 *Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)*		1,44 *(0,07 %)*		M	D			
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,01 *(0 %)*		M	D			
3140 *Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*		0,02 *(0 %)*		M	D			
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0,04 *(0 %)*		M	D			
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		1,14 *(0,05 %)*		M	D			
4020 *Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix*	X	1,62 *(0,08 %)*		M	C	C	C	C
4030 *Landes sèches européennes*		2,21 *(0,1 %)*		M	D			
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	3,71 *(0,18 %)*		M	C	C	B	C
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		15,67 *(0,74 %)*		M	C	C	B	C
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		7,57 *(0,36 %)*		M	C	C	A	C
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		5,8 *(0,27 %)*		M	C	C	B	C
7110 *Tourbières hautes actives*	X	0,01 *(0 %)*		M	D			
7140		0,13		M	D			

Tourbières de transition et tremblantes		*(0,01 %)*						
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		0,01 *(0 %)*		M	C	C	A	C
91D0 *Tourbières boisées*	X	1,16 *(0,05 %)*		M	D			
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	2,5 *(0,12 %)*		M	C	C	A	C
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		31,25 *(1,48 %)*		M	B	C	A	B
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		1,47 *(0,07 %)*		M	D			

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1029	*Margaritifera margaritifera*	p	15000	15000	i	C	G	B	C	B	B
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p	3	3	localities	R	P	C	B	C	C
I	1060	*Lycaena dispar*	p	20	20	i	V	P	C	C	C	C
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p	20	20	i	C	P	C	A	C	B
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	C	DD	C	A	C	C
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	P	DD	D			
F	1096	*Lampetra planeri*	p	1000	1000	i	R	M	C	B	C	C
A	1193	*Bombina variegata*	p	10	10	i	R	P	C	B	B	B

M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p	20	20	i	R	P	C	B	C	C
M	1307	*Myotis blythii*	p	20	20	i	P	P	C	C	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p	24	24	i	R	P	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p	20	20	i	V	P	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p	20	20	i	R	P	C	B	C	C
M	1355	*Lutra lutra*	p	10	10	i	R	M	C	A	C	C
P	1831	*Luronium natans*	p	1	1	localities	V	G	C	C	C	C
F	5315	*Cottus perifretum*	p	5000	5000	i		M	C	B	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Triturus marmoratus*				R	X				X	
A		*Alytes obstetricans*				C	X				X	
A		*Hyla arborea*				R	X				X	
A		*Rana dalmatina*				C	X				X	
A		*Rana temporaria*				C		X			X	

B		*Streptopelia turtur*	30	36	cmales				X		X	
F		*Barbus barbus*				R		X				X
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Nyctalus noctula*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				C	X				X	
M		*Plecotus auritus*				P	X				X	
M		*Martes martes*				P		X			X	
M		*Mustela putorius*				P		X			X	
M		*Genetta genetta*				R		X			X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*				P	X				X	
P		*Agrimonia procera*				R						X
P		*Drosera intermedia*				V						X
P		*Drosera rotundifolia*				R						X
P		*Eriophorum polystachion*				R						X
P		*Hyacinthoides non-scripta*				C						X
P		*Littorella uniflora*				V						X
P		*Phyllitis scolopendrium*				R						X
P		*Potentilla palustris*				V						X
P		*Ranunculus omiophyllus*				V						X
P		*Scirpus sylvaticus*				C						X
P		*Utricularia australis*				V						X

P		*Bromus secalinus subsp. secalinus*				R						X
R		*Podarcis muralis*				C	X				X	
R		*Hierophis viridiflavus*				C	X				X	
R		*Natrix natrix*				R					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	6,14 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0,18 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	4,18 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	0,22 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	21,64 %
N14 : Prairies ameliorées	2,39 %
N15 : Autres terres arables	0,04 %
N16 : Forêts caducifoliées	51,29 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	10,29 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	2,23 %
N27 : Agriculture (en général)	1,4 %

Autres caractéristiques du site

Le site Natura 2000 repose essentiellement sur le socle cristallin des plateaux du Limousin. Les roches granitiques dures et métamorphiques plus tendres alternent sur le site. Ce contexte géologique est lien direct avec les exigences de la Moule perlière qui recherche impérativement des eaux cristallines.
L'importance exceptionnelle de la Moule perlière, espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat de 1992, a principalement justifié la proposition de désignation du site au réseau Natura 2000. De plus les vallées de la Dronne et de ses affluents contiennent une grande diversité d'habitats naturels (landes, pelouses vivaces, forêts de pentes, bas-marais
) dont plusieurs sont d'intérêt communautaire, parmi lesquels 5 sont prioritaires (mais occupent une très faible surface : 0,4 % de la superficie totale du site). Au total 15 espèces animales inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat (Loutre d'Europe, Chabot, Petit Rhinolophe
) et 1 espèce végétale (Flûteau nageant) sont également identifiées sur le site.

Vulnérabilité
: La Moule perlière, est particulièrement menacée par l'augmentation progressive des teneurs en nitrates, en phosphates et par des variations de pH. La qualité des eaux semble s'être dégradée avec le colmatage des fonds et l'apparition par endroits d'algues filamenteuses. La teneur actuelle des eaux de la Dronne est de 6mg/l alors que la reproduction des moules perlières est perturbée au delà de 1 mg/l.

Dans l'ensemble de la vallée, les habitats ouverts sont souvent touchés par la déprise agricole et les habitats forestiers sont la plupart du temps en mauvais état de conservation suite aux tempêtes des dernières années.

Une seule espèce végétale d'intérêt communautaire a été identifiée sur le site Natura 2000. Il s'agit du Flûteau nageant - Luronium natans (L.). Elle est très menacée dans sa station actuelle par le comblement de la pièce d'eau qu'elle occupe (accumulation de matière organique due à la ripisylve dense qui surplombe la station).

La problématique des espèces exotiques envahissantes est devenue une préoccupation de plus en plus forte depuis le début des années 2000 ; il s'agit d'espèces animales (Grenouille taureau, Ragondins, Rats musqués, Ecrevisses américaines...) et végétales (Impatiens glandulifera, Lagarosiphon major, Myriophyllum aquaticum Parthenocissus inserta, Phytolacca americana, Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Sporobolus indicus)

4.2 Qualité et importance

Une étude de la population de Margaritifera margaritifera de la partie périgourdine amont de la Dronne, réalisée en 2003 par le PNRPL, a révélé la présence de près de 15000 individus répartis sur 25km de cours, la présence de pavage et de juvéniles prouvant la reproduction de la population. La Dronne serait l'une des plus belle rivières à Moule perlière de France.

La population d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est codifiée D (non significative) en l'absence de données. La dernière donnée de l'espèce date en effet d'une pêche de sauvetage de la FDAAPPMA 87 réalisée en 1983 sur le ruisseau du Lac sur la commune de Châlus. L'espèce n'a plus été retrouvée sur cet affluent recalibré après cette date. Les peuplements d'écrevisse à pieds blancs ont dangereusement régressé, subissant l'action conjuguée de la détérioration des habitats liés à l'activité anthropique et des menaces liées à l'expansion de l'aire de répartition des écrevisses américaines.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	H01.08	Pollution diffuse des eaux de surface due aux eaux ménagères et eaux usées		B
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
H	K01.02	Envasement		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
M	E03	Décharges		B
M	G01	Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives		I
M	H01.01	Pollution des eaux de surface par des installations industrielles		I
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		B
M	K02.03	Eutrophisation (naturelle)		B
M	K03.05	Antagonisme avec des espèces introduites		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B02.06	Eclaircie		B
M	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

Propriété privée (personne physique)	90 %
Collectivité territoriale	10 %

4.5 Documentation

Cholet P. (2003) Etude de la population de Moules perlières sur la FDronne cristalline en Dordogne. PNRPL.
COCHET G. Inventaire des cours d'eau à Margaritifera margaritifera dans le Bassin Adour Garonne.
Fiches ZNIEFF
"Landes de la Haute Renaudie" Haute Vienne n° 94 SPN 7401201307
Projet de ZNIEFF " Bois du tendeix" Dordogne n° 00002705

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Périgord Limousin

Adresse : Maison du Parc - La Barde 24450 La Coquille

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : FR7200809
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPREB/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE/NATURA_2000/DOCOB_DIAGNOSTIC/FR7200809.zip

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation