NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR7401105 - Landes et zones humides de la Haute Vézère

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 10
6. GESTION DU SITE ..... 10

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR7401105

### 1.3 Appellation du site

Landes et zones humides de la Haute Vézère

### 1.4 Date de compilation

31/12/1995

### 1.5 Date d'actualisation

24/01/2020

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Limousin | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.limousin.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 27/05/2009

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020776750

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 2,00528°

**Latitude :** 45,60972°

## 2.2 Superficie totale

7707 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 74 | Limousin |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 19 | Corrèze | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 19027 | BONNEFOND |
| 19052 | CHAVANAC |
| 19136 | MEYMAC |
| 19139 | MILLEVACHES |
| 19160 | PEROLS-SUR-VEZERE |
| 19226 | SAINT-MERD-LES-OUSSINES |
| 19244 | SAINT-SULPICE-LES-BOIS |
| 19265 | TARNAC |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3110<br>*Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)* | | 5,79<br>*(0,08 %)* | | G | B | C | B | B |
| 3130<br>*Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea* | | 6,14<br>*(0,08 %)* | | G | B | C | B | B |
| 3260<br>*Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion* | | 9,39<br>*(0,12 %)* | | M | C | C | B | B |
| 4010<br>*Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix* | | 0,53<br>*(0,01 %)* | | G | B | C | B | B |
| 4030<br>*Landes sèches européennes* | | 443,68<br>*(5,76 %)* | | G | B | C | C | C |
| 5130<br>*Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires* | | 0,55<br>*(0,01 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6230<br>*Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | X | 320,06<br>*(4,15 %)* | | G | B | C | B | B |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 400,22<br>*(5,19 %)* | | G | B | C | B | B |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 1,92<br>*(0,02 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 413,77<br>*(5,37 %)* | | G | C | C | C | C |
| 7110<br>*Tourbières hautes actives* | X | 456,63<br>*(5,92 %)* | | G | B | B | B | B |
| 7120<br>*Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle* | | 552,91<br>*(7,17 %)* | | G | B | B | B | B |
| 7140 | | 37,77 | | G | B | C | A | B |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tourbières de transition et tremblantes* | | *(0,49 %)* | | | | | | |
| 7150<br>*Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion* | | 1,82<br>*(0,02 %)* | | G | B | C | B | B |
| 8230<br>*Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii* | | 3,27<br>*(0,04 %)* | | G | C | C | C | C |
| 91D0<br>*Tourbières boisées* | X | 3,52<br>*(0,05 %)* | | G | C | C | C | C |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 3,35<br>*(0,04 %)* | | G | C | C | C | C |
| 9120<br>*Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)* | | 333,17<br>*(4,32 %)* | | G | B | C | B | B |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1029 | *Margaritifera margaritifera* | p | | | i | P | DD | D | | | |
| I | 1044 | *Coenagrion mercuriale* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | 6 | 10 | i | P | P | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1385 | *Bruchia vogesiaca* | p | | | i | V | DD | C | C | C | C |
| P | 1831 | *Luronium natans* | p | | | i | P | DD | C | B | C | C |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Pernis apivorus* | 2 | 2 | p | P | | | X | | X | |
| B | | *Milvus migrans* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Circaetus gallicus* | 3 | 3 | p | P | | | X | | X | |
| B | | *Circus cyaneus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Circus pygargus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Streptopelia turtur* | 37 | 48 | cmales | P | | | X | | X | |
| B | | *Aegolius funereus* | | | i | P | | | X | | | |
| B | | *Caprimulgus europaeus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Dryocopus martius* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Lullula arborea* | | | i | P | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | *Lanius collurio* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Lanius excubitor* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Saxicola rubetra* | | | i | P | | | X | | X | |
| F | | *Salmo trutta fario* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Carabus arvensis* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Maculinea alcon* | | | i | P | | | X | | | |
| I | | *Somatochlora arctica* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Chorthippus binotatus* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Araeoncus crassiceps* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Pardosa sphagnicola* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Agrostemma githago* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Cystopteris fragilis* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Drosera intermedia* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Drosera rotundifolia* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Gentiana pneumonanthe* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Hammarbya paludosa* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Isoetes echinospora* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Isoetes lacustris* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Littorella uniflora* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Lycopodiella inundata* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Lycopodium clavatum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Polygonatum verticillatum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Vaccinium oxycoccos subsp. microcarpum* | | | i | P | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | | *Lacerta agilis* | | | i | P | X | | X | | X | |
| R | | *Vipera berus* | | | i | P | | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 3 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 14 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 19 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 5 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 1 % |
| N14 : Prairies ameliorées | 20 % |
| N15 : Autres terres arables | 2 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 5 % |
| N17 : Forêts de résineux | 27 % |
| N19 : Forêts mixtes | 4 % |

### Autres caractéristiques du site

Cette zone est incluse dans la ZPS du plateau de Millevaches. Elle se situe également au sein du PNR de Millevaches.

Vulnérabilité
: Menaces dues :

- à des boisements artificiels sur des habitats de la directive ;
- à des drainages de landes humides;
- à l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles.

## 4.2 Qualité et importance

C'est également une zone humide d'importance nationale.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| H | B01.02 | Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) | | I |
| H | B02.02 | Coupe forestière (éclaircie, coupe rase ) | | I |
| H | B04 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques (sylviculture) | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | H01.05 | Pollution diffuse des eaux de surface due aux activités agricoles ou forestières | | I |
| M | A02.01 | Intensification agricole | | I |
| M | A03.03 | Abandon / Absence de fauche | | I |
| M | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| M | A07 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques | | I |
| M | A08 | Fertilisation | | I |
| M | B02.04 | Elimination des arbres morts ou dépérissants | | I |
| M | B05 | Utilisation de fertilisants (sylviculture) | | I |
| M | D01.01 | Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière) | | I |
| M | D04.02 | Aérodromes, héliports | | I |
| M | G01.03 | Véhicules motorisés | | I |
| M | J02 | Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|
| H | A03.02 | Fauche non intensive | | I |
| H | A04.02 | Pâturage extensif | | I |
| L | B02.05 | Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied) | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 95 % |
| Domaine public communal | 2 % |
| Domaine privé de l'état | 3 % |

## 4.5 Documentation

Document d'objectifs Haute-Vézère, 1998 (CREN)
Document d'objectifs Longeyroux, 2002 (CREN)
Document d'objectifs étang des Oussines, 2003 (CREN)
Document d'objectifs Haute-Vézère, 2006 (CREN)
Inventaire ZNIEFF 2000

Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 15 | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | 6 % |
| 31 | Site inscrit selon la loi de 1930 | 7 % |
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 4 % |
| 93 | Réserve naturelle régionale | 3 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 4 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 31 | SITE INSCRIT | * | 7% |
| 38 | Tourbière du Longeyroux | + | 3% |
| 38 | Etang des Oussines | + | 1% |
| 93 | Réserve naturelle régionale | + | 3% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : CEN Nouvelle-Aquitaine

Adresse : Le Theil 87510 Saint-Gence

Courriel : mcmahe@conservatoirelimousin.com

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Docob - Landes et zones humides de la Haute Vézère
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1041_19-FR7401105-Docob-LandesZonesHumidesHauteVézère.pdf

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

## 6.3 Mesures de conservation

Contrats Natura :
40 contrats dont 11 forestiers
600 ha d'habitats d'intérêt communautaire contractualisés : restaurés et gérés conformément au Docob
7 contrats portés par le CEN
Mesures les plus contractualisées: Bûcheronnage débroussaillage, Pose de clôture, Pâturage extensif, Maintien d'arbres sénescents, Décapage, Lutte contre fougère

MAET
Le Programme agro?environnemental des Landes et Zones Humides de la Haute Vézère, en vigueur depuis mai 2007, comportait 16 MAEt différentes
35 exploitations se sont engagées dans le dispositif
73 diagnostics ont été réalisés
Surface totale contractualisée de 2270 ha cumulés
72 % de la contractualisation concerne des habitats d'intérêt communautaire

Charte Natura 2000
Validée lors du copil du 31 mai 2011 et approuvée par l'arrêté préfectoral du 9 mars 2012.
2 chartes signées
433 ha gérés conformément au Docob