NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR8201658 - Vallée de l'Eyrieux et ses affluents

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 15
6. GESTION DU SITE ..... 15

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR8201658

### 1.3 Appellation du site

Vallée de l'Eyrieux et ses affluents

### 1.4 Date de compilation

31/12/1995

### 1.5 Date d'actualisation

01/07/2016

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Rhône-Alpes | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 10/11/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688025

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 4,47922°

**Latitude :** 44,833°

## 2.2 Superficie totale

20305 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 82 | Rhône-Alpes |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 07 | Ardèche | 99 % |
| 26 | Drôme | 1 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 07001 | ACCONS |
| 07004 | AJOUX |
| 07006 | ALBON-D'ARDECHE |
| 07027 | BEAUCHASTEL |
| 07030 | BEAUVENE |
| 07165 | BELSENTES |
| 07048 | CHALENCON |
| 07074 | CREYSSEILLES |
| 07083 | DUNIERE-SUR-EYRIEUX |
| 26124 | ETOILE-SUR-RHONE |
| 07094 | GILHAC-ET-BRUZAC |
| 07096 | GLUIRAS |
| 07104 | ISSAMOULENC |
| 07167 | OLLIERES-SUR-EYRIEUX |
| 07184 | PRANLES |

| | |
|---|---|
| 07215 | SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL |
| 07220 | SAINT-CHRISTOL |
| 07233 | SAINT-ETIENNE-DE-SERRE |
| 07237 | SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX |
| 07239 | SAINT-GENEST-LACHAMP |
| 07253 | SAINT-JULIEN-DU-GUA |
| 07257 | SAINT-JULIEN-LE-ROUX |
| 07261 | SAINT-LAURENT-DU-PAPE |
| 07274 | SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON |
| 07276 | SAINT-MICHEL-D'AURANCE |
| 07278 | SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX |
| 07286 | SAINT-PIERREVILLE |
| 07295 | SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT |
| 07303 | SAINT-VINCENT-DE-DURFORT |
| 07314 | SILHAC |
| 07338 | VERNOUX-EN-VIVARAIS |
| 07349 | VOULTE-SUR-RHONE |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (80,7%)
Continentale (19,3%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3150<br>*Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition* | | 3,17<br>*(0,02 %)* | | G | D | | | |
| 3260<br>*Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion* | | 1,94<br>*(0,01 %)* | | G | C | C | C | C |
| 3280<br>*Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba* | | 78,5<br>*(0,39 %)* | | G | B | C | C | C |
| 4030<br>*Landes sèches européennes* | | 76,09<br>*(0,37 %)* | | G | B | C | B | B |
| 5110<br>*Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)* | | 157,16<br>*(0,77 %)* | | G | B | C | B | B |
| 5120<br>*Formations montagnardes à Cytisus purgans* | | 1282,3<br>*(6,32 %)* | | G | B | C | B | B |
| 6120<br>*Pelouses calcaires de sables xériques* | X | 0,54<br>*(0 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | X | 1207,4<br>*(5,95 %)* | | G | A | C | B | B |
| 6230<br>*Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | X | 9,98<br>*(0,05 %)* | | G | D | | | |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 17,14<br>*(0,08 %)* | | G | B | C | C | C |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 21,79<br>*(0,11 %)* | | G | C | C | C | C |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 760,89<br>*(3,75 %)* | | G | B | C | B | B |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6520<br>*Prairies de fauche de montagne* | | 9<br>*(0,04 %)* | | G | C | C | B | C |
| 8220<br>*Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique* | | 81,32<br>*(0,4 %)* | | G | A | C | A | B |
| 8230<br>*Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii* | | 75,28<br>*(0,37 %)* | | G | B | C | B | B |
| 8310<br>*Grottes non exploitées par le tourisme* | | 0<br>*(0 %)* | 2 | P | D | | | |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 142,05<br>*(0,7 %)* | | G | C | C | C | C |
| 9120<br>*Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)* | | 1389,4<br>*(6,84 %)* | | G | C | C | B | C |
| 9160<br>*Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli* | | 494,57<br>*(2,44 %)* | | G | C | C | B | C |
| 92A0<br>*Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba* | | 41,34<br>*(0,2 %)* | | G | C | C | C | C |
| 9260<br>*Forêts de Castanea sativa* | | 4841,6<br>*(23,84 %)* | | G | A | B | B | B |
| 9340<br>*Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia* | | 1,36<br>*(0,01 %)* | | G | D | | | |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1036 | *Macromia splendens* | p | | | i | V | DD | C | C | A | C |
| I | 1041 | *Oxygastra curtisii* | p | | | i | C | DD | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1044 | *Coenagrion mercuriale* | p | | | i | V | DD | D | | | |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | r | | | i | P | DD | D | | | |
| I | 1074 | *Eriogaster catax* | p | | | i | P | DD | C | C | B | C |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | C | DD | C | B | C | B |
| I | 1088 | *Cerambyx cerdo* | p | | | i | C | DD | C | C | C | C |
| F | 1138 | *Barbus meridionalis* | r | 0 | 2 | i | R | G | C | C | C | B |
| A | 1193 | *Bombina variegata* | p | | | i | P | DD | C | B | C | C |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | p | | | i | C | DD | C | B | C | C |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | p | | | i | R | DD | C | C | C | C |
| M | 1307 | *Myotis blythii* | p | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | p | | | i | C | DD | C | B | C | C |
| M | 1310 | *Miniopterus schreibersii* | p | | | i | V | DD | C | C | C | C |
| M | 1321 | *Myotis emarginatus* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | p | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | p | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| M | 1337 | *Castor fiber* | p | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| F | 5339 | *Rhodeus amarus* | r | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| F | 6147 | *Telestes souffia* | r | 0 | 35 | i | C | G | C | B | C | B |
| F | 6150 | *Parachondrostoma toxostoma* | r | | | i | P | DD | C | C | C | C |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | P | DD | D | | | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| A | | *Alytes obstetricans* | | | | P | X | | | | X | |
| A | | *Pelodytes punctatus* | | | | P | | | | | X | |
| A | | *Hyla meridionalis* | | | | P | X | | | | X | |
| A | | *Rana dalmatina* | | | | P | X | | | | X | |
| A | | *Rana temporaria* | | | | P | | X | | | X | |
| A | | *Ichthyosaura alpestris* | | | | P | | | | | X | |
| A | | *Pelophylax ridibundus* | | | | P | | X | | | X | |
| F | | *Anguilla anguilla* | | | | P | | | X | | X | |
| I | | *Zerynthia polyxena* | | | | V | X | | | | X | |
| I | | *Chazara briseis* | | | | V | | | X | | | |
| I | | *Scolitantides orion* | | | | C | | | | | | X |
| I | | *Maculinea arion* | | | | R | X | | | | X | |
| M | | *Eptesicus serotinus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Myotis mystacinus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Myotis nattereri* | | | | P | X | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | | *Nyctalus lasiopterus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Nyctalus leisleri* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Nyctalus noctula* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Pipistrellus pipistrellus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Pipistrellus pygmaeus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Pipistrellus nathusii* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Hypsugo savii* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Plecotus auritus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Plecotus austriacus* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Tadarida teniotis* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Genetta genetta* | | | | P | | X | | | X | |
| M | | *Myotis alcathoe* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Pipistrellus kuhlii* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Myotis daubentonii* | | | | P | X | | | | X | |
| P | | *Fontinalis antipyretica* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Achillea tomentosa* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Aegilops cylindrica* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Anacamptis coriophora* | | | | | | | X | | | |
| P | | *Anacamptis laxiflora* | | | | | | | X | | | |
| P | | *Anemone rubra* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Anogramma leptophylla* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Arnica montana* | | | | | | X | | | | X |
| P | | *Carex depauperata* | | | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Carex diandra* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Carex limosa* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Chaerophyllum nodosum* | | | | | | | X | | | |
| P | | *Cistus laurifolius* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Cistus pouzolzii* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Conringia orientalis* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Crassula tillaea* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Cyperus longus* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Cytisus elongatus* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Drosera rotundifolia* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Epipactis fibri* | | | | | | | | X | | |
| P | | *Epipactis microphylla* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Gagea bohemica* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Gagea lutea* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Gagea villosa* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Gentiana lutea* | | | | | | X | | | | X |
| P | | *Gentiana pneumonanthe* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Hypericum androsaemum* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Illecebrum verticillatum* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Juncus capitatus* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Juncus tenageia* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Lathyrus angulatus* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Legousia hybrida* | | | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Linaria arvensis* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Muscari botryoides* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Myosotis balbisiana* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Myrrhoides nodosa* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Najas major* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Najas marina* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Narcissus assoanus* | | | | | | X | | | | X |
| P | | *Oenanthe peucedanifolia* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Oenanthe pimpinelloides* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Ophioglossum vulgatum* | | | | | | | X | | | |
| P | | *Osmunda regalis* | | | | | | | X | | | |
| P | | *Pedicularis palustris* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Pisum sativum* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Poa palustris* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Psilurus incurvus* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Reseda jacquinii* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Ruscus aculeatus* | | | | | | X | | | | X |
| P | | *Saxifraga prostii* | | | | | | | | X | | |
| P | | *Sedum villosum* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Serapias lingua* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Spergula segetalis* | | | | V | | | | | | X |
| P | | *Spiranthes aestivalis* | | | | | X | | X | | X | |
| P | | *Trifolium strictum* | | | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Trifolium sylvaticum* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Ventenata dubia* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Veronica cymbalaria* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Vicia disperma* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Ophrys occidentalis* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Anacamptis fragrans* | | | | | | | | | | X |
| P | | *Dichoropetalum carvifolia* | | | | | | | | | | X |
| R | | *Lacerta bilineata* | | | | P | X | | | | X | |
| R | | *Podarcis muralis* | | | | P | X | | | | X | |
| R | | *Hierophis viridiflavus* | | | | P | X | | | | X | |
| R | | *Coronella austriaca* | | | | P | X | | | | X | |
| R | | *Coronella girondica* | | | | P | | | | | X | |
| R | | *Timon lepidus* | | | | P | | | X | | X | |
| R | | *Zamenis longissimus* | | | | P | X | | | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 3 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 0,3 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 22 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 8 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 7 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 1 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 51 % |
| N17 : Forêts de résineux | 0,4 % |
| N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) | 3 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 1 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 0,3 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 3 % |

### Autres caractéristiques du site

Le site FR8201658 « Vallée de l'Eyrieux et ses affluents » est inclus dans deux domaines biogéographiques : 81 % méditerranéen et 19 % continental. Le bassin versant de l'Eyrieux est entouré par le sillon rhodanien à l'est, les bordures du Massif central au sud-est et les monts du Vivarais à l'ouest. Cette fraction du département de l'Ardèche est caractérisée en premier lieu par sa teinte méditerranéenne atténuée, notamment à l'approche des limites nord, par les influences septentrionales. Le second facteur structurant n'est autre que la géologie. Le bassin est riche en roches métamorphiques et cristallines formées lors des remontées de magmas au début de l'ère secondaire. A l'Ere tertiaire, sous l'influence d'une très forte activité volcanique, des coulées de basaltes vont se répandre sur la partie occidentale de la zone et notamment au niveau des bassins de la Rimande, de l'Eysse et de la Saliouse (hors du site). Ces formations volcaniques restent très minoritaires à l'échelle d'un bassin largement dominé par les terrains cristallins et métamorphiques.
Le site est un secteur de transition climatique, qui fait l'originalité et la diversité des habitats naturels du bassin versant. Au regard de la forte hétérogénéité du site d'étude, sont distinguées au sein de cette entité 3 unités paysagères distinctes : les Boutières, la moyenne vallée de l'Eyrieux avec ses plateaux et ses pentes et la basse vallée de l'Eyrieux ou plaine alluvionnaire.
A l'interface de ces paysages, sur les pieds des versants se retrouvent de nombreux vallons humides s'échappant petit à petit vers la plaine. Si l'influence de l'homme se fait nettement ressentir, elle façonne aussi ce paysage et ne semble pas (pour l'heure) perturber outre mesure les équilibres spontanés.
Afin d'assurer le maintien voire la restauration des habitats et espèces de ce site, il convient de concilier davantage utilisation du territoire et milieu naturel. Ainsi, la réouverture et l'entretien de milieux prairiaux par une activité pastorale adaptée apparaît très pertinente d'un point de vue social, économique et écologique. De même, une meilleure connaissance et gestion de l'eau permettraient d'améliorer la qualité d'habitats pour de nombreuses espèces (poissons, invertébrés et mammifères semi-aquatiques).
Les populations d'écrevisses à pieds blanc nécessitent une attention particulière par rapport aux risques liés aux espèces invasives.
La mise en place d'îlots de vieillissement contribuerait à diversifier les milieux forestiers, assez homogènes à ce jour du fait de l'exploitation récente sur la quasi-totalité des montagnes.
Ces différents points ont le même objectif : préserver la richesse biologique locale en prenant en compte les enjeux écologiques et en développant une économie locale adaptée et respectueuse de ces enjeux écologiques.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité :

Le corridor constitué par la ripisylve doit être maintenu ou par endroit recréé.
Les cours d'eau nécessitent une amélioration de la qualité de l'eau.
Les poissons migrateurs doivent pouvoir circuler librement car l'Eyrieux est le siège de nombreuses frayères potentielles pour les aloses et les lamproies.
Les landes, les prairies et pelouses doivent être maintenues en gardant le milieu ouvert par des pratiques adaptées.

## 4.2 Qualité et importance

Les nombreux corridors (axes de déplacement) terrestres et aquatiques font du site FR8201658 « Vallées de l'Eyrieux et de ses affluents » un véritable relai en Ardèche : l'Eyrieux et ses affluents possèdent de nombreuses zones de remous et de tourbillons (affouillements) favorisant certaines espèces aquatiques ; le long de la rivière, le dépôt de sable a rendu possible le boisement en forêt de bois blanc et les gorges exposent leurs falaises riches en espèces de reptiles.
L'Eyrieux dans sa vallée alluviale est un cours d'eau à connotation naturelle, qui ne comprend pas de digue, de canalisation ou d'épis récents. Son espace de bon fonctionnement ou de divagation pendant les évènements de crue n'est pas contraint par les ouvrages (seuils notamment), qui sont quasi-transparents lors de la montée des eaux. A noter que le maintien de cet espace de bon fonctionnement génère une diversité de milieux et d'espèces.
La vallée de l'Eyrieux et ses contreforts affichent une dominance des végétations liées aux sols siliceux mais également de manière plus ponctuelle aux substrats basaltiques (massif de Chirouse par exemple). Bien que relativement homogène sur le plan géologique, l'étagement des végétations est particulièrement marqué, allant des basses plaines de la vallée du Rhône (méso- et supra-méditerranéen) jusqu'aux plateaux ardéchois (montagnard inférieur). De même on constatera une forte variation des agencements écologiques : peuplements aquatiques, rivulaires, rocheux
Il en découle une forte diversité de formations végétales.
Les Boutières, représentées par des sommets doux qui s'amenuisent vers l'est en crêtes rocheuses déchiquetées, offrent un paysage très minéral. C'est le pays des pentes, résultant de l'action des cours d'eau sur le socle cristallin. Des serres (crêtes) plus ou moins larges compartimentent les vallées, les espaces alluviaux de fond de vallée sont étroits. Le territoire est occupé majoritairement par des milieux forestiers. Cela s'explique notamment du fait de l'abandon de l'agropastoralisme et de l'entretien des terrasses, qui ont induit la recolonisation de ces espaces par la végétation arbustive (landes à genêts, landes sèches européennes). Sur certains secteurs des Boutières, l'activité pastorale subsiste cependant, permettant le maintien de milieux ouverts, les sommets des serres sont encore bien pâturés et des pelouses remarquables y sont représentées. Les Boutières, par cette mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts, accueille une faune patrimoniale telle que le Bruant ortolan, le Lézard ocellé, le Lézard catalan, la Laineuse du prunellier, des papillons en forte régression sur le territoire national comme le Mercure ou l'Hermite qui semblent encore se maintenir localement.
L'Azuré du Serpolet est connu de plusieurs stations où l'Origan, sa plante hôte, et Myrmica sabuletti, sa fourmi hôte, ont des populations suffisantes pour son développement. L'un des lépidoptères les plus emblématiques du site pourrait être l'Azuré des Orpins.
La moitié des habitats naturels présents sur le site sont inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats, soit 20 habitats représentant 47 % de la superficie du site.
Le site est remarquable par sa diversité faunistique. Tous les groupes sont représentés : de nombreux gîtes favorables aux chauves-souris (vieux arbres et bâtis) accueillent des colonies de Petit Rhinolophe, Murins de grande taille et de Pipistrelles.
L'ensemble des cours d'eau permanents du site sont favorables à la Loutre d'Europe, au Castor mais également à de nombreux invertébrés (Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Ecrevisse à pattes blanches), poissons (Barbeau méridional, Blageon, Toxostome, Bouvière), amphibiens (Sonneur à ventre jaune, Grenouille rousse, Grenouille agile, Alyte accoucheur) et reptiles (Couleuvre vipérine).
Le territoire est un lieu de transition bioclimatique par l'ouverture et l'orientation est/ouest de la vallée de l'Eyrieux sur le couloir rhodanien qui permet d'adjoindre au climat dominant continental des irradiations méridionales, notamment dans le secteur de la basse vallée de l'Eyrieux. La basse vallée de l'Eyrieux est en ce sens représentatif d'un secteur de transition climatique entre le climat méditerranéen et un climat plus tempéré. Ces discontinuités climatiques se retrouvent au sein des assemblages d'écosystèmes qui forment des mélanges originaux d'espèces rattachées à des secteurs biogéographiques différents. De nombreuses espèces méditerranéennes trouvent là leur limite nord d'aire de répartition. C'est le cas par exemple de la Cordulie splendide et du Ciste de pouzolz.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

### Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| H | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| H | H01 | Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) | | I |
| L | A02 | Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes<br>) | | I |
| L | A10.01 | Elimination des haies et bosquets ou des broussailles | | I |
| L | G01.02 | Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés | | I |
| L | G01.03 | Véhicules motorisés | | I |
| L | G01.04 | Alpinisme, escalade, spéléologie | | I |
| L | G05 | Autres intrusions et perturbations humaines | | I |
| M | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| M | J02.01 | Comblement et assèchement | | I |
| M | J02.06 | Captages des eaux de surface | | I |

Incidences positives

| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
|---|---|---|---|---|
| L | A04 | Pâturage | | I |
| L | B02.05 | Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied) | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 99 % |
| Collectivité territoriale | 1 % |

## 4.5 Documentation

- DOCUGE valant DOCOB Natura 2000 « vallée de l'Eyrieux et ses affluents » et DOCPROG de l'ENS « Serres Boutiérots et vallée de l'Auzène, de la Gluyère et de l'Orsanne »
RIGAUX J., MARANGONI E., CHEVALIER G, GRIVAUD M., NATURALIA Environnement-SMEC-DDT07, 898p. + annexes. MEDDE # 2015.
Lien URL : http://vallee-eyrieux-et-affluents.n2000.fr/

- Document de programmation et de gestion de l'ENS « Serres Boutiérots et vallées de l'Auzène, de la Gluèyre et de l'Orsanne » - ONF - 2008

- Plan de gestion de la zone à enjeux : « Gorge de la Glueyre » - ONF - 2011
Lien URL : https://sites.google.com/site/gorgesdelaglueyre/plan-de-gestion--partie-1
https://sites.google.com/site/gorgesdelaglueyre/plan-de-gestion--partie-2

- Notice de gestion de la zone humide des Plots - commune de Saint-Chritol - Biodiv - 2012

Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 31 | Site inscrit selon la loi de 1930 | 0,67 % |
| 80 | Parc naturel régional | 84,6 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 31 | Site inscrit "Village de Beauchastel et ses abords" | + | 0% |
| 31 | Site inscrit "Ruines du château de la Tourette" | + | 0% |
| 31 | Site inscrit "Roc de Gourdon" | + | 0% |
| 80 | Monts d'Ardèche | * | 85% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Syndicat Mixte Eyrieux Clair

Adresse : 1, rue de la Pize 07240 LE CHEYLARD

Courriel : natura2000@inforoutes-ardeche.fr

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8201658
Lien :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0549104/2015-document-d-objectifs-natura-2000-vallee-de-l-eyrieux-et-ses-affluents-fr8201658

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

## 6.3 Mesures de conservation

Le document d'objectifs du site FR8201658 « Vallées de l'Eyrieux et de ses affluents » a été validé le 22 septembre 2015.

L'Espace Naturel Sensible appelé « Serres Boutiérots, vallées de la Gluèyre de l'Orsanne et de l'Auzène » est situé dans le même secteur que ce site Natura 2000. Chacune de ces politiques s'appuie sur un document de gestion propre. Afin de mettre en synergie ces programmes de préservation du patrimoine naturel et de les rendre plus cohérents, un document commun a été élaboré, intitulé Document Unique de Gestion (DOCUGE).
Sont listés ci-après les objectifs de conservation identifiés dans le DOCUGE 2015-2020 du site. Les mesures concernant les suivis scientifiques et amélioration des connaissances ne sont pas indiquées ici (cf. DOCUGE).

Objectifs de conservation :
. Conserver et restaurer la dynamique naturelle, l'espace de bon fonctionnement ainsi que la bonne qualité et quantité des eaux des cours d'eau, des habitats naturels et des habitats d'espèces associés ;
. Maintenir en bon état de conservation et/ou restaurer les pelouses, les prairies, les landes et les mosaïques d'habitats par des pratiques agricoles appropriées aux habitats naturels et habitats d'espèces associés ;
. Maintenir en bon état de conservation les habitats forestiers, les habitats naturels et les habitats d'espèces associés ;
. Maintenir en bon état et/ou restaurer les milieux et zones humides : tourbières, prairies humides, mégaphorbiaies, etc. ainsi que les habitats naturels et les habitats d'espèces associés ;
. Réduire les effets des espèces exotiques envahissantes sur les habitats naturels et les espèces patrimoniales ;
. Mettre en #uvre des mesures de protection et de gestion des espèces de la Directive Habitats et des espèces remarquables ;
. Améliorer la connaissance locale des espèces et des habitats relevant de la Directive Habitats et des espèces remarquables ;
. Améliorer les connaissances sur les activités socio-économiques ;
. Suivre les espèces et les habitats de la Directive Habitats et les espèces remarquables présentes ainsi que leur état de conservation.
. Sensibiliser et informer ;
. Gérer la fréquentation ;
. Communiquer et porter à connaissance ;
. Coordonner, animer et suivre les actions du DOCUGE en concertation avec les acteurs du territoire.

Les mesures de gestion établies dans ce document proposent donc de :
. Conserver et restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes alluviaux ;
. Conserver des activités agricoles et agropastorales garantes du bon état des habitats naturels et des espèces persistant au sein de cette trame ;

. Développer une hétérogénéité dans les peuplements forestiers (essences autochtones, âges) et permettre un développement amenant des boisements à sénescence, dans le cadre d'une gestion durable agrosylvicole ;
. Conserver dans un bon état et restaurer les zones humides ;
. Limiter et contraindre le développement des espèces exotiques envahissantes ;
. Gérer la fréquentation et les activités de loisirs ;
. Améliorer les connaissances sur le site d'un point de vue écologique et socio-économique ;
. Assurer un suivi de l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire ;
. Sensibiliser la population locale aux richesses naturelles du site.

Sur les 33 communes concernées par le site B6, le caractère privé de la majorité des parcelles associé à leur très fort morcellement entraîne une difficulté de gestion du territoire. Avec l'évolution des pratiques agricoles, pastorales et forestières, de nombreuses terres ont été délaissées au profit de parcelles plus accessibles. Un travail de diagnostic et d'animation foncière est de ce fait prévu dans la phase d'animation 2016 # 2021.