NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8201664 - Secteurs des Sucs - Gerbier-Mézenc

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8201664

1.3 Appellation du site

Secteurs des Sucs - Gerbier-Mézenc

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d'actualisation

17/07/2020

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Rhône-Alpes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/11/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033369583&dateTexte=

Explication(s) :

Site "Secteur des sucs" renommé "Secteurs des Sucs - Gerbier-Mézenc" à l'issue des consultations de 2020 validant l'extension du périmètre.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,23736°

Latitude : 44,81199°

2.2 Superficie totale

6106 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
82	Rhône-Alpes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
07	Ardèche	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
07026	BEAGE
07037	BOREE
07045	BURZET
07049	CHAMBON
07075	CROS-DE-GEORAND
07112	LABASTIDE-SUR-BESORGUES
07120	LACHAMP-RAPHAEL
07158	MEZILHAC
07173	PEREYRES
07195	ROCHETTE
07203	SAGNES-ET-GOUDOULET
07209	SAINT-ANDEOL-DE-FOURCHADES
07235	SAINTE-EULALIE

07267	SAINT-MARTIAL
07282	SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (88%)
Méditerranéenne (12%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,4 *(0,01 %)*		G	C	C	B	B
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		2,6 *(0,04 %)*		G	C	C	A	A
4030 *Landes sèches européennes*		285,2 *(4,67 %)*		G	A	C	A	A
4060 *Landes alpines et boréales*		48,9 *(0,8 %)*		G	A	C	B	B
5120 *Formations montagnardes à Cytisus purgans*		494,2 *(8,09 %)*		G	A	C	A	A
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		0,3 *(0 %)*		G	C	C	B	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		1,4 *(0,02 %)*		G	C	C	A	B
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	27,93 *(3 %)*		G	A	C	A	A
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		0,5 *(0,01 %)*		G	C	C	A	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		21,6 *(0,35 %)*		G	A	C	A	A
6520 *Prairies de fauche de montagne*		84,6 *(1,39 %)*		G	A	C	A	A
7110 *Tourbières hautes actives*	X	5,8 *(0,09 %)*		G	A	C	A	A

7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		0,7 *(0,01 %)*		G	A	C	A	A
7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		0,4 *(0,01 %)*		G	A	C	A	A
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		15,3 *(0,25 %)*		G	A	C	B	B
8150 *Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes*		33,6 *(0,55 %)*		G	A	B	A	A
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		12,9 *(0,21 %)*		G	A	C	A	A
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		4,6 *(0,08 %)*		G	A	C	A	A
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		171,2 *(2,8 %)*		G	A	C	A	A
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		16,5 *(0,27 %)*		G	A	C	A	A
9140 *Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius*		1,5 *(0,02 %)*		G	A	C	A	A
9410 *Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)*		1,4 *(0,02 %)*		G	A	C	A	A

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p			i	P	DD	D			
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	V	M	C	C	C	C

I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	DD	D			
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	DD	D			
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	P	DD	D			
X	1163	*Cottus gobio*	p			i	V	P	C	C	C	C
A	1193	*Bombina variegata*	p	200	400	i	C	G	C	A	C	A
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	C	G	C	A	C	A
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	C	G	C	A	C	A
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	P	DD	D			
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	P	DD	D			
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	DD	D			
M	1337	*Castor fiber*	p			i	P	DD	D			
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	C	G	C	A	C	A
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	P	M	C	C	B	B
P	1387	*Orthotrichum rogeri*	p			i	P	M	B	C	C	C
P	6216	*Hamatocaulis vernicosus*	p			i	P	M	B	C	C	C

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Rana temporaria*	50		localities	C		X			X	
A		*Ichthyosaura alpestris*	5		localities	R					X	
B		*Milvus milvus*			i	P			X		X	
B		*Circus pygargus*		1	p	V			X		X	
B		*Falco peregrinus*		1	p	V			X		X	
B		*Aegolius funereus*		2	p	V					X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Monticola saxatilis*		5	p	V					X	
B		*Turdus torquatus*		10	p	R					X	
I		*Maculinea alcon*		1	localities	R						
I		*Maculinea arion*		1	localities	R						
I		*Parnassius apollo*		2	localities	V	X				X	
I		*Parnassius mnemosyne*	20		localities	C	X				X	
P		*Androsace halleri*				P						X
P		*Arnica montana*				P		X				X
P		*Biscutella arvernensis*				P				X		
P		*Drosera rotundifolia*	20		localities	P			X			
P		*Galanthus nivalis*				P		X				X
P		*Gentiana lutea*				P		X				X

P		*Huperzia selago*	15	20	localities	P		X	X			
P		*Lycopodium alpinum*		1	localities	P		X				X
P		*Lycopodium clavatum*	15	20	localities	P		X				
P		*Lycopodium issleri*		5	localities	P		X				X
P		*Pinguicula grandiflora*				P						X
P		*Saxifraga prostii*				P				X		X
P		*Sedum villosum*				P						X
P		*Jacobaea leucophylla*		5	localities	P						X
P		*Arabidopsis cebennensis*				P				X		
R		*Lacerta agilis*	20		localities	C	X				X	
R		*Lacerta bilineata*	20		localities	C	X				X	
R		*Podarcis muralis*	20		localities	C	X				X	
R		*Coronella austriaca*		1	localities	V	X				X	
R		*Vipera berus*	5		localities	R			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	59 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	6 %
N11 : Pelouses alpine et sub-alpine	13 %
N16 : Forêts caducifoliées	13 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	5 %

Autres caractéristiques du site

Le secteur des Sucs est une dalle basaltique parsemée de volcans phonolithiques appelés "sucs". Les forêts, d'origines monastiques, sont bien préservées. En forêt domaniale de Bonnefoy, des galeries ont été creusées dans des mines à lignite. Ses paysages et sa géologie sont uniques comme en témoigne la présence de trois sites classés (Mézenc, Gerbier et cascade du Ray-Pic) et de plusieurs géosites du Géoparc mondial UNESCO des Monts d'Ardèche.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité :

Les menacent principales sont :

La déprise agricole qui engendre un sous-pâturage des landes et pelouses et qui favorise la fermeture de ces milieux puis leur disparition avec les cortèges d'espèces animales et végétales associées ;

La colonisation des landes et des pelouses par la forêt, en majorité issue de plantation d'espèces allochtones ;

La fréquentation touristique qui engendre un piétinement des habitats sur certaines parties sommitales des sucs notamment sur le Mont Gerbier de Jonc et le Mézenc ;

Les anciens drains ou les plantations qui altèrent le fonctionnement de certaines zones humides.

4.2 Qualité et importance

Le site du « Secteur des Sucs - Gerbier-Mézenc » fait partie des sites remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel ardéchois. La flore est riche en espèces rares et protégées ce qui reflète la diversité des conditions écologiques et notamment climatiques (influences méditerranéennes et montagnardes). Parmi les habitats remarquables, sont à noter les landes subalpines, les éboulis siliceux de l'étage montagnard, les prairies de fauche de montagne ou encore les tourbières. Ses paysages et sa géologie sont également uniques avec la présence de trois sites classés (Mézenc, Gerbier et cascade du Ray-Pic) et de plusieurs géosites du Géoparc mondial UNESCO des Monts d'Ardèche.

Le plus haut des sucs est le Mont Mézenc qui culmine à 1754 m, c'est l'un des secteurs les plus arrosés d'Ardèche. Son adret est caractérisé par un climat méditerranéen l'été et alpin l'hiver.
Les formations végétales caractéristiques des sucs sont dans l'ensemble plutôt sèches. Le paysage est une mosaïque de pelouses, landes, hêtraies et éboulis siliceux, avec parfois des sources (source de la Loire) et des tourbières. Le site est riche en espèces pyrénéennes, alpines et en espèces que l'on ne trouve que dans cette région restreinte ou presque (endémiques et sub-endémiques). Cette richesse est d'autant plus remarquable que le secteur des Sucs est l'une des rares stations d'espèces alpines située à l'ouest du Rhône.

Se trouve aussi, sur ce site, l'une des rares stations du Massif central pour le Merle à plastron ou encore le papillon Apollon. Est également observée, la nidification de nombreux rapaces notamment rupestres (Faucon pèlerin, Busard cendré, etc.).

Au total, plus de vingt habitats naturels d'intérêt communautaire (dont 2 prioritaires *) ont été identifiés sur le site Natura 2000. Ils sont globalement en bon état de conservation mais peuvent être menacés localement.
Le site est également remarquable du fait de la présence de 3 espèces végétales inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats Natura 2000 : la Buxbaumie verte, l'Hypne brillante et l'Orthotric de Roger.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		B
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		B
M	G01.03	Véhicules motorisés		B
M	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A03.02	Fauche non intensive		B
M	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	4,3 %
Propriété privée (personne physique)	58 %
Propriété d'une association, groupement ou société	6,5 %
Etablissement public	0 %
Domaine communal	15,4 %
Domaine privé communal	1,1 %
Domaine départemental	0,1 %
Domaine de l'état	5,4 %
Domaine privé de l'état	9,2 %

Zone d'intérêt économique	0 %

4.5 Documentation

Plan gestion 5sucs_décembre 2013
ECOTER_PRO20140015_inv_chiros_ENS_Gerbier-Mezenc_20150114
La Loutre dans les massifs Gerbier-Mézenc en 2014 VF
RP_07_PNR MA_Lepido_Gerbier_Mezenc_INSECTA_2014_v3
Rapport Apollon - PNR final
Rapport Evaluation des enjeux biodiversité gésosites
PG_Tourbieres_CHANAL_La_Rochette_VF
Rapport de stage marmottes 2017
Rapport de stage-merleàplastron 2017
Rapport stage Apollon 2017
Rapport stage Lycopodes 2017
bianchin_antonetti_2019_flore_Mezenc_Dept43_Dept07_
PG_ZH_FLOTTE_Gerbier 2018
Plan de gestion ENS Mont Gerbier

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
13	Terrain acquis par un département	1 %
29	Réserve biologique	1 %
32	Site classé selon la loi de 1930	20 %
80	Parc naturel régional	100 %
21	Forêt domaniale	16 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	18 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
29	RB MEZENC (DU)	*	1%
32	Massif du Mézenc	*	19%
32	Mont Gerbier de Jonc	*	1%
32	Cascade du Ray-Pic	*	0%
80	Monts d'Ardèche	-	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) :
- Maintenir la mosaïque de milieux qui a une forte valeur paysagère.
- Favoriser le pastoralisme local pour le maintien des pelouses sommitales.
- Les landes à raisins d'ours sont très rares en Ardèche et méritent d'être protégées.

INSTRUMENTS CONTRACTUELS, REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS :
Existant :
- Site classé du Mézenc.

En cours :
- La Réserve Biologique Domaniale Mézenc (43) - Borée (07) est en cours de création.

A envisager :
- Contrôle, maîtrise des circulations par sentier canalisé.
- Arrêt du boisement artificiel en zone escarpée.
- Utilisation du Fonds de Gestion de l'Espace Rural.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional des Monts d#Ardèche

Adresse : Maison du Parc - Domaine de Rochemure 07380 JAUJAC

Courriel : accueil@parc-monts-ardeche.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : document d'objectifs du site FR8201664
Lien :
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8201664-secteur-des-sucs-a20968.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Objectifs stratégiques :

- Préserver les zones humides par une gestion adaptée

- Maintenir les habitats forestiers en bon état de conservation

- Maintenir en bon état de conservation les pelouses, prairies et landes remarquables par une agriculture respectueuse de son environnement

- Maintenir en bon état de conservation les habitats rocheux

- Maintenir en bon état de conservation les espèces et habitats d'espèces remarquables notamment ceux relevant de la Directive Habitats

- Améliorer la connaissance des espèces et des habitats d'espèces remarquables notamment ceux relevant de la Directive Habitats, et de leur état de conservation sur le site

- Suivi des espèces et des habitats d'espèces remarquables notamment ceux relevant de la Directive Habitats, et de leur état de conservation sur le site

- Organiser et maitriser la fréquentation touristique sur le site

- Informer et sensibiliser le public et les usagers

- Coordonner et animer la mise en #uvre du document unique de gestion