NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8201665 - Allier et ses affluents

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 15
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8201665

1.3 Appellation du site

Allier et ses affluents

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d'actualisation

22/03/2023

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Rhône-Alpes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/11/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385560&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,96409°

Latitude : 44,70306°

2.2 Superficie totale

3187,36 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
82	Rhône-Alpes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
07	Ardèche	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
07018	ASTET
07047	CELLIER-DU-LUC
07130	LANARCE
07136	LAVEYRUNE
07137	LAVILLATTE
07142	LESPERON
07175	PLAGNAL
07206	SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE
07232	SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,14 *(0 %)*		G	B	C	B	B
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		0,14 *(0 %)*		G	B	C	B	B
3270 *Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.*		3,49 *(%)*		G	C	C	C	B
4030 *Landes sèches européennes*		66,45 *(2,08 %)*		G	C	C	B	B
5120 *Formations montagnardes à Cytisus purgans*		442,98 *(13,9 %)*		G	C	C	C	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		3,03 *(0,1 %)*		G	C	C	C	B
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	114,86 *(3,6 %)*		G	B	C	C	B
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		41,54 *(1,3 %)*		G	B	C	C	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		49,95 *(1,57 %)*		G	B	C	B	B
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		86,69 *(2,72 %)*		G	B	C	C	B
6520 *Prairies de fauche de montagne*		187,79 *(5,89 %)*		G	B	C	C	B
7110 *Tourbières hautes actives*	X	1,13 *(0,04 %)*		G	B	C	C	B

7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		14,53 *(0,46 %)*		G	B	C	C	B
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		0,66 *(0,02 %)*		G	B	C	C	B
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		0,69 *(0,02 %)*		G	B	C	C	C
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		0,08 *(0 %)*		G	D			
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		0,46 *(0,01 %)*		G	C	C	A	B
91D0 *Tourbières boisées*	X	4,59 *(0,14 %)*		G	B	C	B	B
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	122,92 *(3,86 %)*		G	B	C	B	B
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		867,28 *(27,21 %)*		G	B	C	A	B
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		4,61 *(0,14 %)*		G	B	C	A	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1029	*Margaritifera margaritifera*	p			i	R	DD	D			
I	1042	*Leucorrhinia pectoralis*	p			i	R	M	C	B	C	B
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	R	M	C	B	C	B

I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	R	M	C	B	C	B
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	M	C	C	C	B
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	R	M	C	B	C	B
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	P	M	C	C	C	B
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	V	M	C	C	C	B
X	1106	*Salmo salar*	p			i	V	G	C	C	C	B
X	1163	*Cottus gobio*	p			i	P	M	C	B	C	B
A	1193	*Bombina variegata*	p			i	R	G	C	B	A	B
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1305	*Rhinolophus euryale*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1307	*Myotis blythii*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1337	*Castor fiber*	p			i	P	G	C	B	C	B
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	G	C	A	C	B
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	1387	*Orthotrichum rogeri*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	1758	*Ligularia sibirica*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	6216	*Hamatocaulis vernicosus*	p			i	P	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*				P	X				X	
A		*Bufo bufo*				P					X	
A		*Rana dalmatina*				P	X				X	
A		*Rana temporaria*				P		X			X	
A		*Lissotriton vulgaris*				P					X	
A		*Epidalea calamita*				P	X				X	
A		*Ichthyosaura alpestris alpestris*				P					X	
A		*Bufo spinosus*				P					X	
B		*Scolopax rusticola*				P					X	
B		*Buteo buteo*				P					X	
B		*Falco tinnunculus*				P					X	
B		*Pernis apivorus*				P					X	
B		*Milvus migrans*				P					X	

B		*Milvus milvus*				P			X		X	
B		*Circaetus gallicus*				P					X	
B		*Circus cyaneus*				P					X	
B		*Bubo bubo*				P					X	
B		*Aegolius funereus*				P					X	
B		*Caprimulgus europaeus*				P					X	
B		*Alcedo atthis*				P			X		X	
B		*Dryocopus martius*				P					X	
B		*Lullula arborea*				P					X	
B		*Alauda arvensis*				P					X	
B		*Anthus pratensis*				P			X		X	
B		*Lanius collurio*				P					X	
B		*Lanius excubitor*				P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*				P					X	
B		*Saxicola rubetra*				P			X		X	
B		*Phylloscopus trochilus*				P					X	
B		*Regulus regulus*				P					X	
B		*Ficedula hypoleuca*				P			X		X	
B		*Lanius senator*				P			X		X	
B		*Carduelis citrinella*				P					X	
B		*Carduelis cannabina*				P			X			
B		*Emberiza citrinella*				P			X		X	
B		*Saxicola rubicola*				P					X	

I		*Chazara briseis*				P			X			
I		*Erebia ottomana*			i	P			X			
I		*Coenonympha tullia*				P			X			
I		*Limenitis populi*				P						
I		*Fabriciana niobe*				P						
I		*Maculinea alcon*			i	P			X			
I		*Parnassius mnemosyne*				P	X				X	
I		*Ischnura pumilio*				P						
I		*Coenagrion pulchellum*				P			X			
I		*Coenagrion lunulatum*				P			X			
I		*Lestes sponsa*				P						
I		*Sympetrum danae*				P			X			
I		*Sympetrum flaveolum*				P						
I		*Sympetrum vulgatum*				P						
I		*Leucorrhinia dubia*				P						
I		*Cordulia aenea*				P						
I		*Somatochlora arctica*				P						
I		*Polysarcus denticauda*				P						
I		*Metrioptera brachyptera*				P						
I		*Gampsocleis glabra*				P						
I		*Boloria selene*				P						
I		*Parnassius apollo lozerae*				P			X			
I		*Phengaris arion*				P	X				X	

M		*Erinaceus europaeus*				P					X	
M		*Neomys anomalus*				P						
M		*Neomys fodiens*				P					X	
M		*Eptesicus nilssoni nilssoni*				P						
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Myotis mystacinus*				P	X				X	
M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Nyctalus lasiopterus*				P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Nyctalus noctula*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus nathusii*				P	X				X	
M		*Hypsugo savii*				P	X				X	
M		*Plecotus auritus*				P	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				P	X				X	
M		*Tadarida teniotis*				P	X				X	
M		*Genetta genetta*				P		X			X	
M		*Sciurus vulgaris*				P					X	
M		*Arvicola sapidus*				P						
M		*Myotis brandtii*				P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*				P	X				X	

O		Thymallus thymallus			i	P		X	X		X	
O		Salmo trutta				P						
P		*Antennaria dioica*				P						
P		*Arnica montana*				P		X				
P		*Carex appropinquata*				P						
P		*Carex depauperata*				P						
P		*Carex diandra*				P						
P		*Carex limosa*			i	P						X
P		*Cerastium ramosissimum*				P						
P		*Chrysosplenium alternifolium*				P						
P		*Cirsium erisithales*				P						
P		*Corallorhiza trifida*				P						
P		*Doronicum pardalianches*				P						
P		*Draba muralis*				P						
P		*Drosera rotundifolia*			i	P						X
P		*Festuca airoides*				P						
P		*Gagea lutea*				P						
P		*Galanthus nivalis*				P		X				
P		*Gentiana pneumonanthe*			i	P						X
P		*Lilium martagon*				P						
P		*Moenchia erecta*				P						
P		*Myosotis balbisiana*				P						
P		*Neottia cordata*				P						

P		*Oenanthe peucedanifolia*				P						
P		*Ophioglossum vulgatum*				P			X			
P		*Pedicularis palustris*				P						
P		*Ranunculus hederaceus*				P						
P		*Reseda jacquinii*				P						
P		*Sedum villosum*			i	P						X
P		*Spiranthes aestivalis*				P	X		X		X	
P		*Tephroseris helenitis*				P						
P		*Vicia orobus*				P						
P		*Gasparrinia peucedanoides*				P						
P		*Dichoropetalum carvifolia*				P						
R		*Lacerta agilis*				P	X				X	
R		*Podarcis muralis*				P	X				X	
R		*Coronella austriaca*				P	X				X	
R		*Natrix natrix helvetica*				P						
R		*Vipera berus*				P			X		X	
R		*Zootoca vivipara*				P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	4 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	27 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	7 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	2 %
N14 : Prairies ameliorées	3 %
N16 : Forêts caducifoliées	6 %
N17 : Forêts de résineux	36 %
N19 : Forêts mixtes	2 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	11 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %

Autres caractéristiques du site

Le site FR8201665 « L'Allier et ses affluents » s'inscrit dans la partie sud de l'entité géographique du Plateau ardéchois qui forme une vaste pénéplaine d'une altitude moyenne supérieure à 1 100 m, située en bordure du Massif-central. Malgré des influences méditerranéennes, le climat de type semi-continental est rude, marqué par des températures annuelles basses, des périodes d'enneigement important, la fréquence et la force du vent du nord.
Le site Natura 2000 FR8201665 « L'Allier et ses affluents »appartient à un ensemble paysager constitué d'importants massifs forestiers issus de la couverture boisée qui s'était développée à la fin de la dernière glaciation et des entités agricoles ouvertes dans les milieux forestiers originels par les activités agro-pastorales séculaires.
De nombreux affluents de l'Allier, formant un réseau de cours d'eau à la qualité préservée et un ensemble de tourbières et de zones humides complètent un assemblage de milieux naturels qui offre une biodiversité remarquable et contribue largement aux services écosystémiques assurés par la nature.

Le site FR8201665 « L'Allier et ses affluents » constitue le prolongement amont du site Natura 2000 FR8301075 des « Gorges de l'Allier et ses affluents » qui s'étend sur plus de 16 000 ha dans le département de la Haute-Loire (43).

Vulnérabilité
: La vulnérabilité du site est liée surtout aux risques de drainage de prairies à des fins agricoles, ainsi qu'au risque d'exportation systématique du bois mort. L'exploitation intensive des forêts menace la préservation de nombreux insectes xylophages, tel que la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina).
Les cours d'eau sont également menacés par les effluents issus de la fertilisation des parcelles agricoles.

4.2 Qualité et importance

Le manteau forestier issu des forêts originelles est encore très largement présent avec un taux de boisement qui dépasse 64 % sur le site Natura 2000 dont une large proportion (64%) correspond à des forêts anciennes. Le caractère patrimonial des massifs forestiers du site Natura 2000 FR8201665 « L'Allier et ses affluents » s'exprime également à travers une forte représentation des habitats forestiers d'intérêt communautaire qui couvrent 34,45 % de la surface du site et plus de 50 % de la superficie totale des habitats d'intérêt communautaire.

Les activités agricoles concernent près de 30 % de la superficie totale du site Natura 2000 FR8201665 « L'Allier et ses affluents » dont près de 99 % sont affectés à la production de ressources fourragères (en intégrant les bois pâturés). 47 % des espaces agro-pastoraux du site recèlent au moins un habitat d'intérêt communautaire. La gestion de ces espaces de prairies, pelouses, landes et de pré-bois entretient par conséquent un lien étroit avec la conservation des habitats d'intérêt communautaire. Cette synergie entre activités agricoles et préservation de l'environnement se traduit depuis 2008 par l'engagement de la profession agricole dans la souscription des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).

Enfin, 68 zones humides qui s'étendent sur 221 ha, 3 tourbières couvrant 43 ha et 120 km de cours d'eau constituent un ensemble exceptionnel de milieux naturels humides dont l'importance et la qualité ont contribué à l'intégration du site FR8201665 « L'Allier et ses affluents » au réseau Natura 2000.

La préservation des rivières, zones humides et tourbières ainsi que le maintien des milieux agricoles remarquables par une agriculture respectueuse des enjeux environnementaux comptent parmi les objectifs prioritaires du document d'objectifs (DOCOB). La pérennité de la diversité écologique des forêts et des milieux associés et la conciliation des activités humaines avec la préservation ou la restauration du bon état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire qui ont motivé la désignation du site Natura 2000 constituent également des objectifs essentiels du DOCOB.
La réalisation de ces actions prioritaires suppose la continuité de l'animation du site Natura 2000, la poursuite des inventaires et des études scientifiques nécessaires à l'évaluation de l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaires, la promotion et la mise en #uvre des actions contractuelles : Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC), contrats Natura 2000, adhésion à la charte du site.

L'information du public, des élus et des usagers du site contribue aussi à la connaissance et à la prise en compte des enjeux environnementaux du territoire.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	M01	Modifications des conditions abiotiques		O
L	G01.03	Véhicules motorisés		B
M	A02.01	Intensification agricole		I
M	A02.03	Retournement de prairies		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	A08	Fertilisation		I
M	C03.02	Production d'énergie solaire		B
M	C03.03	Production d'énergie éolienne		B
M	E01.02	Urbanisation discontinue		O
M	E04.01	Bâtiments agricoles, constructions dans le paysage		O
M	J02.01	Comblement et assèchement		I
M	K01.03	Assèchement		B
M	K03.05	Antagonisme avec des espèces introduites		B
M	K04.03	Introduction de maladies (pathogènes microbiens)		B

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I
M	A03.02	Fauche non intensive		I
M	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	0,72 %
Propriété privée (personne physique)	37,66 %
Propriété d'une association, groupement ou société	30,65 %
Collectivité territoriale	0,01 %
Domaine communal	30,36 %
Domaine départemental	0,04 %
Domaine privé de l'état	0,09 %
Zone d'intérêt économique	0,47 %

4.5 Documentation

- DENELLE N. (1982) - Une analyse de la flore vasculaire du Vivarais et du Velay oriental. Thèse sp. Ecologie Montpellier. Univ. Sc. Tech. Languedoc. 207 p.
- F.R.A.P.N.A. Ardèche (1994) - Rapport d'études et actions de l'ACNAT du haut bassin de l'Allier en Ardèche - Rapport intermédiaire, Paris, 92 p.
- MARCIAU R. (1994) - Livre Rouge des plantes en Rhône-Alpes . Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces naturels, Ministère de l'Environnement, Conseil Régional Rhône-Alpes. 142 p.
- NOBLECOURT T. (1997) - Recommandations sylvicoles pour la conservation de Rosalia Alpina (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) dans le Parc National des Cévennes. O.N.F. Languedoc-Roussillon, Service départemental de l'Aude, Division de Quillan.
- PETETIN A. & HUGONNOT V. (1998) - Etudes - diagnostics des sites B20, B21 et B26 pro parte inventoriés au titre de la Directive 92/43/CEE en Ardèche. Conservatoire Botanique National du Massif Central. 28 p. + annexes.
- SULMONT E. & PETETIN A. (2000) - Caractérisation des hêtraies de l'Asperulo-Fagetum en Auvergne. Conservatoire Botanique National du Massif Central. 39 p. + annexes.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
80	Parc naturel régional	30 %
21	Forêt domaniale	25 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : communauté de communes Montagne d'Ardèche

Adresse : place de la mairie 07470 COUCOURON

Courriel : environnement@montagne-ardeche.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : document d'objectifs du site FR8201665
Lien :
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8201665-allier-et-ses-affluents-a20969.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation