NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8201666 - Loire et ses affluents

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8201666

1.3 Appellation du site

Loire et ses affluents

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d'actualisation

25/01/2023

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Rhône-Alpes	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/11/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385548&dateTexte=

Explication(s) :

mise à jour dans le cadre de l'extension du périmètre (régularisation).

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,10621°

Latitude : 44,79343°

2.2 Superficie totale

11474 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
82	Rhône-Alpes

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
07	Ardèche	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
07018	ASTET
07026	BEAGE
07045	BURZET
07071	COUCOURON
07075	CROS-DE-GEORAND
07105	ISSANLAS
07106	ISSARLES
07119	LAC-D'ISSARLES
07121	LACHAPELLE-GRAILLOUSE
07130	LANARCE
07137	LAVILLATTE
07154	MAZAN-L'ABBAYE
07161	MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
07200	ROUX

07203	SAGNES-ET-GOUDOULET
07224	SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
07235	SAINTE-EULALIE
07326	USCLADES-ET-RIEUTORD

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 *Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea*		0,91 *(0,01 %)*		G	B	C	B	B
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		13,66 *(0,11 %)*		P	B	C	B	B
4030 *Landes sèches européennes*		8,03 *(0,07 %)*		G	C	C	B	B
5120 *Formations montagnardes à Cytisus purgans*		158,62 *(1,38 %)*		G	C	C	B	B
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		0,65 *(0,01 %)*		G	C	C	B	B
6230 *Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	X	192,27 *(1,68 %)*		G	B	C	B	B
6410 *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*		159,91 *(1,39 %)*		G	B	C	B	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		99,28 *(0,87 %)*		G	B	C	B	B
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		1,4 *(0,01 %)*		G	B	C	B	B
6520 *Prairies de fauche de montagne*		545,93 *(4,76 %)*		G	B	B	B	B
7110 *Tourbières hautes actives*	X	24,69 *(0,22 %)*		G	B	C	B	B
7120 *Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle*		1,84 *(0,02 %)*		G	B	C	B	B

7140 *Tourbières de transition et tremblantes*		55,86 *(0,49 %)*		G	B	C	B	B
7150 *Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion*		1,28 *(0,01 %)*		G	B	C	B	B
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		3,32 *(0,03 %)*		G	B	C	B	B
8120 *Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)*		14,13 *(1 %)*		G	B	C	B	B
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		7,4 *(0,06 %)*		G	B	C	B	B
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		4,36 *(0,04 %)*		G	B	C	B	B
91D0 *Tourbières boisées*	X	1,1 *(0,01 %)*		G	B	C	B	B
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	65,68 *(0,57 %)*		G	B	C	B	B
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		716,55 *(6,24 %)*		G	B	C	B	B
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		12,26 *(0,11 %)*		G	B	C	B	B

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1042	*Leucorrhinia pectoralis*	p			i	R	M	C	B	C	C
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	R	M	C	B	C	B

I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	R	M	C	B	C	B
I	1087	*Rosalia alpina*	p			i	R	M	C	B	C	B
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p			i	V	M	C	C	C	B
X	1163	*Cottus gobio*	p			i	P	M	C	B	C	B
A	1193	*Bombina variegata*	p			i	R	G	C	B	A	B
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1305	*Rhinolophus euryale*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1307	*Myotis blythii*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1310	*Miniopterus schreibersii*	p			i	R	DD	C	B	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1323	*Myotis bechsteinii*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p			i	P	M	C	B	C	C
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	P	G	C	A	C	B
P	1386	*Buxbaumia viridis*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	1387	*Orthotrichum rogeri*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	1758	*Ligularia sibirica*	p			i	P	G	C	B	C	B
P	6216	*Hamatocaulis vernicosus*	p			i	P	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.

- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Triturus alpestris*				P						
A		*Alytes obstetricans*				C	X				X	
A		*Rana dalmatina*				C	X				X	
A		*Rana temporaria*				C		X			X	
A		*Lissotriton vulgaris*				P					X	
A		*Lissotriton helveticus*				P					X	
A		*Epidalea calamita*				P	X				X	
A		*Bufo spinosus*				P					X	
B		*Scolopax rusticola*				P					X	
B		*Pernis apivorus*				P					X	
B		*Milvus migrans*				P					X	
B		*Milvus milvus*				P			X		X	
B		*Circaetus gallicus*				P					X	
B		*Circus cyaneus*				P					X	
B		*Circus pygargus*				P			X		X	
B		*Phasianus colchicus*				P					X	
B		*Bubo bubo*				P					X	

B		*Aegolius funereus*				P					X	
B		*Merops apiaster*				P					X	
B		*Dryocopus martius*				P					X	
B		*Lullula arborea*				P					X	
B		*Alauda arvensis*				P					X	
B		*Lanius collurio*				P					X	
B		*Lanius excubitor*				P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*				P					X	
B		*Saxicola rubetra*				P			X		X	
B		*Cisticola juncidis*				P			X		X	
B		*Phylloscopus trochilus*				P					X	
B		*Ficedula hypoleuca*				P			X		X	
B		*Lanius senator*				P			X		X	
B		*Carduelis citrinella*				P					X	
B		*Carduelis cannabina*				P			X			
B		*Emberiza citrinella*				P			X		X	
I		*Coenonympha tullia*				P			X			
I		*Limenitis populi*				P						
I		*Fabriciana niobe*				P						
I		*Maculinea alcon*				P						
I		*Parnassius mnemosyne*				P	X				X	
I		*Ischnura pumilio*				P						
I		*Coenagrion pulchellum*				P			X			

I		*Coenagrion lunulatum*				P			X			
I		*Coenagrion hastulatum*				P			X			
I		*Lestes virens*				P						
I		*Lestes sponsa*				P						
I		*Lestes dryas*				P						
I		*Sympetrum danae*				P			X			
I		*Sympetrum flaveolum*				P						
I		*Sympetrum vulgatum*				P						
I		*Leucorrhinia dubia*				P						
I		*Cordulia aenea*				P						
I		*Somatochlora arctica*				P						
I		*Aeschna juncea gomphus*				P						
I		*Polysarcus denticauda*				P						
I		*Metrioptera brachyptera*				P						
I		*Lycaena alciphron*				P						
I		*Boloria selene*				P						
I		*Zygaena romeo*				P						
I		*Araneus alsine*				P						
I		*Phengaris alcon*				P						
M		*Erinaceus europaeus*				P					X	
M		*Eptesicus nilssoni*				P						
M		*Eptesicus serotinus*				P	X				X	
M		*Myotis mystacinus*				P	X				X	

M		*Myotis nattereri*				P	X				X	
M		*Nyctalus lasiopterus*				P	X				X	
M		*Nyctalus leisleri*				P	X				X	
M		*Nyctalus noctula*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus pygmaeus*				P	X				X	
M		*Pipistrellus nathusii*				P	X				X	
M		*Hypsugo savii*				P	X				X	
M		*Plecotus austriacus*				P	X				X	
M		*Vespertilio discolor*				P						
M		*Tadarida teniotis*				P	X				X	
M		*Arvicola sapidus*				P						
M		*Myotis brandtii*				P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*				P	X				X	
M		*Myotis daubentonii*				P	X				X	
O		Salmo trutta				P						
P		*Carex limosa*				P						
P		*Drosera rotundifolia*				P						
P		*Gentiana pneumonanthe*				P						
P		*Lithodora fruticosa*				P						
P		*Luzula sudetica*				P						
P		*Oenanthe lachenalii*				P						
P		*Oenanthe peucedanifolia*				P						

P		*Ophioglossum vulgatum*				P			X			
P		*Papaver cambricum*				P						
P		*Pedicularis palustris*				P						
P		*Saxifraga pedemontana*				P						
P		*Sedum amplexicaule*				P			X			
P		*Sedum villosum*				P						
P		*Spiranthes aestivalis*				P	X		X		X	
P		*Tephroseris helenitis*				P						
P		*Sparganium emersum subsp. emersum*				P						
R		*Lacerta agilis*				P	X				X	
R		*Podarcis muralis*				P	X				X	
R		*Coronella austriaca*				P	X				X	
R		*Natrix natrix helvetica*				P						
R		*Vipera berus*				P			X		X	
R		*Zootoca vivipara*				P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2,6 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	2,16 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	22 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1,6 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5,6 %
N14 : Prairies ameliorées	32 %
N16 : Forêts caducifoliées	10,61 %
N17 : Forêts de résineux	17 %
N19 : Forêts mixtes	6,32 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	0,11 %

Autres caractéristiques du site

Le site FR8201666 « La Loire et ses affluents » s'inscrit dans l'entité géographique du Plateau ardéchois qui forme une vaste pénéplaine située en bordure orientale du Massif-central. L'altitude du site est comprise entre 858 m et 1 456 m et malgré des influences méditerranéennes, le climat de type semi-continental est rude, marqué par des températures annuelles basses, des périodes d'enneigement important, la fréquence et la force du vent du nord.

Orné de sucs issus de son histoire géologique, parcouru par un réseau de cours d'eau à la qualité préservée qui irriguent les prairies, pelouses et landes héritées d'un système d'exploitation agricole séculaire tourné vers l'élevage, il comprend également d'importantes formations boisées où les forêts anciennes gardent une large part. Un vaste réseau de tourbières et de zones humides complète un assemblage de milieux naturels qui offre une biodiversité remarquable et contribue largement aux services écosystémiques assurés par la nature.

Vulnérabilité
:

4.2 Qualité et importance

Le site FR8201666 est fortement marqué par l'identité pastorale du Massif-central souvent qualifié de « plus grande prairie d'Europe ». Depuis le milieu du néolithique, les activités pastorales ont progressivement ouvert de larges espaces dans la couverture forestière qui s'était développée à la fin de la dernière glaciation. Les milieux naturels et les paysages représentés sur le site Natura 2000 FR8201666 "La Loire et ses affluents" témoignent de l'empreinte agro-sylvo-pastorale séculaire des activités humaines sur les milieux forestiers originels. Ainsi, les zones contribuant à la production de ressources fourragères (prairies, landes et bois pâturés) représentent 55 % de la surface du site et près de 20 % des milieux agropastoraux concernés sont rattachés à un habitat d'intérêt communautaire.

Le manteau forestier issu des forêts originelles est encore largement présent avec un taux de boisement de 32 % dans le site Natura 2000 FR8201666 dont 37 % de forêts anciennes. Plus de 22 % des espaces forestiers du site abritent un ou plusieurs habitat(s) d'intérêt communautaire.

Enfin, 21 tourbières couvrant 325 ha, 400 zones humides qui s'étendent sur 2 156 ha et 571 km de cours d'eau constituent un ensemble exceptionnel de milieux naturels humides dont l'importance et la qualité ont contribué à l'intégration du site FR8201666 au réseau Natura 2000.

Un grand nombre d'habitats d'intérêt communautaire accompagne naturellement la diversité et la qualité des milieux naturels présents. Ainsi, 22 habitats d'intérêt communautaire couvrant plus de 2 000 ha ont été identifiés sur le site Natura 2000 FR8201666, 4 d'entre-eux, concernant près de 290 ha, sont reconnus d'intérêt communautaire prioritaire.
La richesse spécifique n'est pas en reste avec 21 espèces inscrites à l'annexe II de la directive « Habitat », 26 espèces inscrites aux annexes IV ou V de la même directive et 14 espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » soit au total 61 espèces relevant des directives européennes pour la nature.
La préservation des rivières, zones humides et tourbières ainsi que le maintien des milieux agricoles remarquables par une agriculture respectueuse des enjeux environnementaux comptent naturellement parmi les objectifs prioritaires du document d'objectifs (DOCOB). La pérennité de la diversité écologique des forêts et des milieux associés et la conciliation des activités humaines avec la préservation ou la restauration du bon état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire qui ont motivé la désignation du site Natura 2000 constituent également des objectifs essentiels du DOCOB.
La réalisation de ces actions prioritaires suppose la poursuite de l'animation du site Natura 2000, la réalisation des inventaires et des études scientifiques nécessaires à l'évaluation de l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaires, la promotion et la mise en #uvre des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 : Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC), contrats Natura 2000, adhésion à la charte du site. L'information du public, des élus, des usagers du site participe également à la connaissance et à la prise en compte des enjeux environnementaux du territoire.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	C03.02	Production d'énergie solaire		O
L	C03.03	Production d'énergie éolienne		O
L	G01.03	Véhicules motorisés		O
M	A02.01	Intensification agricole		I
M	A02.03	Retournement de prairies		I
M	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
M	A08	Fertilisation		I
M	E01.02	Urbanisation discontinue		B
M	E04.01	Bâtiments agricoles, constructions dans le paysage		B
M	J02.01	Comblement et assèchement		I
M	K03.05	Antagonisme avec des espèces introduites		O
M	K04.05	Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)		O
M	M01	Modifications des conditions abiotiques		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I
M	A03.02	Fauche non intensive		I

M	A04.02	Pâturage extensif		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	2,24 %
Propriété privée (personne physique)	73,61 %
Propriété d'une association, groupement ou société	10,98 %
Collectivité territoriale	0,18 %
Domaine communal	11,37 %
Domaine privé communal	0,08 %
Domaine départemental	0,04 %
Domaine privé de l'état	0,21 %
Concessions privatives du domaine public	0,08 %
Zone d'intérêt économique	1,21 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	0,8 %
80	Parc naturel régional	69,2 %
N77	Site inscrit selon la loi de 1930	0,25 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
32	Lac d'Issarlès (partie classée)	+	1%
80	Monts d'Ardèche	*	69%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone spécialement protégée de la convention de Nairobi (Afrique orientale)	Lac d'Issarlès (partie inscrite)	*	0%
	Ruines de l'abbaye de Mazan et leurs abords	*	0%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : communauté de communes Montagne d'Ardèche

Adresse : place de la mairie 07470 COUCOURON

Courriel : environnement@montagne-ardeche.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : document d'objectifs du site FR8201666
Lien :
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8201666-loire-et-ses-affluents-a20970.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation