NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR8201678 - Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 8
6. GESTION DU SITE ..... 9

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR8201678

### 1.3 Appellation du site

Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme

### 1.4 Date de compilation

31/12/1995

### 1.5 Date d'actualisation

09/06/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Rhône-Alpes | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 18/05/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297216

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 4,925°

**Latitude :** 44,74556°

## 2.2 Superficie totale

371 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 82 | Rhône-Alpes |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 26 | Drôme | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 26006 | ALLEX |
| 26065 | CHABRILLAN |
| 26125 | EURRE |
| 26144 | GRANE |
| 26165 | LIVRON-SUR-DROME |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3130<br>*Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea* | | 0,1<br>*(0,03 %)* | | P | D | | | |
| 3140<br>*Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.* | | 4,6<br>*(1,24 %)* | | M | B | C | B | B |
| 3150<br>*Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition* | | 0,4<br>*(0,11 %)* | | M | B | C | B | B |
| 3220<br>*Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée* | | 103,4<br>*(27,87 %)* | | M | A | B | B | B |
| 3240<br>*Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos* | | 37,4<br>*(10,08 %)* | | M | A | B | A | A |
| 3250<br>*Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum* | | 11,5<br>*(3,1 %)* | | M | A | C | A | A |
| 3260<br>*Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion* | | 1,1<br>*(0,3 %)* | | M | C | C | A | A |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 8,5<br>*(2,29 %)* | | M | B | C | A | B |
| 6220<br>*Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* | X | 0,1<br>*(0,03 %)* | | P | D | | | |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 0,1<br>*(0,03 %)* | | P | D | | | |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 0,8<br>*(0,22 %)* | | M | C | C | A | B |
| 7210<br>*Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae* | X | 0,1<br>*(0,03 %)* | | P | D | | | |
| 7220 | X | 0,1 | | P | D | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* | | *(0,03 %)* | | | | | | |
| 8240<br>*Pavements calcaires* | X | 0,1<br>*(0,03 %)* | | P | D | | | |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 53,7<br>*(14,47 %)* | | M | A | C | B | B |
| 92A0<br>*Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba* | | 94<br>*(25,34 %)* | | M | C | C | B | C |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1041 | *Oxygastra curtisii* | p | 10 | 20 | i | R | G | C | B | B | B |
| I | 1044 | *Coenagrion mercuriale* | p | 1000 | 2000 | i | C | G | C | B | C | B |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | 54 | 200 | i | C | G | C | A | C | B |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | C | M | C | B | C | B |
| F | 1138 | *Barbus meridionalis* | p | | | i | P | G | D | | | |
| F | 1158 | *Zingel asper* | p | | | i | V | G | B | A | B | B |
| F | 1163 | *Cottus gobio* | p | | | i | V | G | D | | | |
| A | 1166 | *Triturus cristatus* | p | 1 | 10 | i | V | G | C | A | B | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | r | 190 | 400 | p | R | G | C | B | C | C |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | r | 1 | 10 | i | V | G | C | B | C | C |
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | p | 1 | 10 | i | V | G | C | B | C | C |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1310 | *Miniopterus schreibersii* | r | 1 | 10 | i | V | G | C | B | C | C |
| M | 1321 | *Myotis emarginatus* | p | 800 | 1600 | p | R | G | C | B | C | C |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | r | 72 | 150 | p | V | G | C | B | C | C |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | p | 1 | 10 | i | V | G | C | B | C | C |
| M | 1337 | *Castor fiber* | p | 20 | 23 | p | C | G | C | A | C | B |
| M | 1355 | *Lutra lutra* | p | 1 | 2 | p | R | G | C | A | B | B |
| F | 6147 | *Telestes souffia* | r | | | i | C | G | C | A | C | B |
| F | 6150 | *Parachondrostoma toxostoma* | r | | | i | R | G | C | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| F | | *Esox lucius* | | | i | P | | | X | | | |
| I | | *Zerynthia polyxena* | 1 | 3 | i | V | X | | | | X | |
| I | | *Maculinea arion* | 10 | 50 | i | R | X | | | | X | |
| I | | *Fissuria boui* | | | i | P | | | | X | | |
| I | | *Ischnura pumilio* | | | i | P | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | *Boyeria irene* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Moitessieria locardi* | | | i | P | | | | X | | |
| I | | *Moitessieria puteana* | | | i | P | | | | X | | |
| I | | *Cordulegaster boltonii boltonii* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Cordulegaster boltonii immaculifrons* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Cordulegaster boltonii* | | | i | P | | | | | | X |
| I | | *Gomphus simillimus* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Calamagrostis pseudophragmites* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Callitriche obtusangula* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Hordeum secalinum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Juncus sphaerocarpus* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Nigella gallica* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Oenanthe pimpinelloides* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Phleum paniculatum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Poa infirma* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Ridolfia segetum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Trifolium resupinatum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Typha minima* | | | i | P | | | | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 42 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 3 % |
| N15 : Autres terres arables | 2 % |
| N19 : Forêts mixtes | 44 % |
| N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) | 6 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 3 % |

### Autres caractéristiques du site

Les habitats fluviaux sont ici d'une grande qualité (ou "naturalité"). La rivière Drôme est l'une des rares rivières d'Europe de cette importance (110 km) qui n'ait pas de barrage sur son bassin versant. Il en résulte une dynamique spontanée des habitats qui a été bien conservée jusque dans la basse vallée de la Drôme, où se situent les Ramières du Val de Drôme.

Partie de la rivière Drôme non canalisée.

Ce site inclut :
- la réserve naturelle nationale des Ramières du val de Drôme
- le DPF (Domaine public fluvial) entre les deux rives des Ramières aval, classé en grande partie en APPB.

Vulnérabilité
: Réduction de la bande active et de la dynamique.
Incision du lit de la rivière.

## 4.2 Qualité et importance

Rivière dynamique préservée.

Les habitats sont tous d'origine naturelle.
La forêt riveraine (200 Ha) par exemple est entièrement spontanée et n'a jamais été exploitée.
Les successions végétales sont liées à la dynamique induite par les crues et les variations de la hauteur de la nappe alluviale.
L'état de conservation du site est exeptionnel.
La préservation du site est prise en compte dans le SAGE de la rivière Drôme, notamment les questions de gestion des matériaux alluvionnaires et des débits d'étiage.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | G01.08 | Autres activités de plein air et de loisirs | | I |
| L | B01.02 | Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) | | I |
| L | C01.01.01 | Carrières de sable et graviers | | O |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L | D01.02 | Routes, autoroutes | | I |
| L | D01.04 | Voie ferrée, TGV | | I |
| L | D01.05 | Pont, viaduc | | I |
| L | E03.01 | Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives | | I |
| L | H06.01 | Nuisance et pollution sonores | | I |
| L | K03.05 | Antagonisme avec des espèces introduites | | I |
| M | D02.02 | Canalisations (gaz, pétrole<br>) | | I |
| M | H01 | Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) | | I |

| Incidences positives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 19 % |
| Propriété d'une association, groupement ou société | 1 % |
| Collectivité territoriale | 14 % |
| Domaine régional | 0 % |
| Domaine public de l'état | 66 % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 36 | Réserve naturelle nationale | 83 % |
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 16 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 36 | Ramières du Val-de-Drôme | + | 87% |
| 38 | Ensemble des Freydières | + | 16% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de communes du Val de Drôme

Adresse : Gare des Ramières - Route de Grâne 26400 ALLEX (FRANCE)

Courriel : ramieres@espaces-naturels.fr

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8201678
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523633/2007-document-d-objectifs-natura-2000-milieux-aquatiques-et-alluviaux-de-la-basse-vallee-de-la-drome

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs "Moyenne vallée du Rhône" établi pour quatre sites (dont celui-ci) et validé en décembre 1998.
Plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Ramières du Val de Drôme.
SAGE Drôme.
Contrat de rivière.

Ce site inclut :
- la réserve naturelle nationale des Ramières du val de Drôme
- le DPF (Domaine public fluvial) entre les deux rives des Ramières aval, classé en grande partie en APPB.

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION

- Conserver et restaurer la fonctionnalité de la rivière : gestion des débits solides, dynamique latérale, gestion concertée de la ressource en eau en qualité et quantité (nappe, eau de surface)
- Mise en oeuvre des préconisations du SAGE Drôme
- Gestion conservatoire des forêts alluviales des ramières
- Gestion et restauration des prairies et pelouses sèches

INSTRUMENTS CONTRACTUELS, REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS
- Plan de gestion de la réserve naturelle
- Contrat de rivière Drôme et SAGE
- Document d'objectifs moyenne vallée du Rhône
- Maîtrise foncière pour gestion conservatoire.