NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR8210018 - Delta de la Dranse

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 9
6. GESTION DU SITE ..... 10

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

A (ZPS)

### 1.2 Code du site

FR8210018

### 1.3 Appellation du site

Delta de la Dranse

### 1.4 Date de compilation

30/09/1986

### 1.5 Date d'actualisation

20/09/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Rhône-Alpes | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 6,51583°

**Latitude :** 46,39861°

## 2.2 Superficie totale

53 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 82 | Rhône-Alpes |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 74 | Haute-Savoie | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 74218 | PUBLIER |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A004 | *Tachybaptus ruficollis* | w | 10 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A004 | *Tachybaptus ruficollis* | r | 2 | 5 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A004 | *Tachybaptus ruficollis* | c | 10 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A005 | *Podiceps cristatus* | w | 50 | 500 | i | P | M | C | B | C | B |
| B | A005 | *Podiceps cristatus* | c | 50 | 500 | i | P | M | C | B | C | B |
| B | A008 | *Podiceps nigricollis* | w | 50 | 200 | i | P | M | C | B | C | B |
| B | A008 | *Podiceps nigricollis* | c | 50 | 200 | i | P | M | C | B | C | B |
| B | A021 | *Botaurus stellaris* | w | 1 | 1 | i | P | M | C | B | A | B |
| B | A022 | *Ixobrychus minutus* | c | 1 | 2 | i | P | M | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A023 | *Nycticorax nycticorax* | c | 1 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A026 | *Egretta garzetta* | c | 1 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A028 | *Ardea cinerea* | p | 2 | 5 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A029 | *Ardea purpurea* | c | 1 | 2 | i | P | M | D | | | |
| B | A036 | *Cygnus olor* | w | 10 | 50 | i | P | M | D | | | |
| B | A036 | *Cygnus olor* | r | 2 | 3 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A036 | *Cygnus olor* | c | 10 | 50 | i | P | M | D | | | |
| B | A052 | *Anas crecca* | c | 1 | 13 | i | P | M | D | | | |
| B | A053 | *Anas platyrhynchos* | w | 5 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A053 | *Anas platyrhynchos* | r | 5 | 20 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A053 | *Anas platyrhynchos* | c | 10 | 50 | i | P | M | D | | | |
| B | A058 | *Netta rufina* | r | 0 | 1 | p | P | M | D | | | |
| B | A058 | *Netta rufina* | c | 1 | 5 | i | P | M | D | | | |
| B | A059 | *Aythya ferina* | w | 10 | 30 | i | P | M | D | | | |
| B | A059 | *Aythya ferina* | c | 50 | 150 | i | P | M | D | | | |
| B | A061 | *Aythya fuligula* | w | 10 | 30 | i | P | M | B | B | B | B |
| B | A061 | *Aythya fuligula* | r | 10 | 20 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A061 | *Aythya fuligula* | c | 300 | 600 | i | P | M | B | B | B | B |
| B | A070 | *Mergus merganser* | r | 5 | 15 | p | P | M | B | B | B | B |
| B | A073 | *Milvus migrans* | r | | | p | P | DD | D | | | |
| B | A073 | *Milvus migrans* | c | 50 | 100 | i | P | M | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | r | | | p | P | DD | D | | | |
| B | A103 | *Falco peregrinus* | c | 1 | 1 | i | P | M | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A118 | *Rallus aquaticus* | w | 0 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A118 | *Rallus aquaticus* | r | 2 | 5 | p | P | M | D | | | |
| B | A119 | *Porzana porzana* | c | 1 | 2 | i | P | M | D | | | |
| B | A123 | *Gallinula chloropus* | w | 5 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A123 | *Gallinula chloropus* | r | 2 | 5 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A123 | *Gallinula chloropus* | c | 10 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A125 | *Fulica atra* | w | 10 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A125 | *Fulica atra* | r | 3 | 5 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A125 | *Fulica atra* | c | 50 | 200 | i | P | M | D | | | |
| B | A136 | *Charadrius dubius* | r | 2 | 5 | p | P | M | C | B | C | C |
| B | A136 | *Charadrius dubius* | c | 5 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A145 | *Calidris minuta* | c | 1 | 4 | i | P | M | D | | | |
| B | A149 | *Calidris alpina* | c | 1 | 30 | i | P | M | D | | | |
| B | A153 | *Gallinago gallinago* | c | 1 | 4 | i | P | M | D | | | |
| B | A162 | *Tringa totanus* | c | 1 | 25 | i | P | M | D | | | |
| B | A164 | *Tringa nebularia* | c | 1 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A165 | *Tringa ochropus* | c | 1 | 7 | i | P | M | D | | | |
| B | A166 | *Tringa glareola* | c | 1 | 30 | i | P | M | D | | | |
| B | A168 | *Actitis hypoleucos* | w | 1 | 2 | i | P | M | C | B | C | B |
| B | A168 | *Actitis hypoleucos* | r | 1 | 2 | p | P | M | C | B | C | B |
| B | A168 | *Actitis hypoleucos* | c | 5 | 15 | i | P | M | C | B | C | B |
| B | A176 | *Larus melanocephalus* | c | 1 | 3 | i | P | M | D | | | |
| B | A179 | *Larus ridibundus* | w | 100 | 500 | i | P | M | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A179 | *Larus ridibundus* | r | 50 | 100 | p | P | M | C | B | C | B |
| B | A179 | *Larus ridibundus* | c | 100 | 500 | i | P | M | D | | | |
| B | A182 | *Larus canus* | w | 10 | 50 | i | P | M | A | B | A | B |
| B | A182 | *Larus canus* | r | 1 | 3 | p | P | M | B | B | A | B |
| B | A182 | *Larus canus* | c | 10 | 50 | i | P | M | A | B | A | B |
| B | A193 | *Sterna hirundo* | c | 1 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A197 | *Chlidonias niger* | c | 1 | 11 | i | P | M | D | | | |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | w | 1 | 5 | i | P | M | D | | | |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | p | 1 | 1 | p | P | M | D | | | |
| B | A338 | *Lanius collurio* | r | | | p | P | DD | D | | | |
| B | A391 | *Phalacrocorax carbo sinensis* | w | 5 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A391 | *Phalacrocorax carbo sinensis* | c | 5 | 10 | i | P | M | D | | | |
| B | A734 | *Chlidonias hybrida* | c | 1 | 7 | i | P | M | D | | | |
| B | A856 | *Spatula querquedula* | c | 1 | 5 | i | P | M | D | | | |
| B | A857 | *Spatula clypeata* | c | 1 | 5 | i | P | M | D | | | |
| B | A861 | *Calidris pugnax* | w | 1 | 5 | i | P | M | B | B | A | B |
| B | A889 | *Mareca strepera* | w | 1 | 5 | i | P | M | D | | | |
| B | A889 | *Mareca strepera* | r | 0 | 1 | p | P | M | C | C | C | C |
| B | A889 | *Mareca strepera* | c | 5 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A604 | *Larus michahellis* | w | 100 | 500 | i | P | M | D | | | |
| B | A604 | *Larus michahellis* | c | 100 | 500 | i | P | M | D | | | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Buteo buteo* | 1 | 3 | i | P | | | | | | X |
| B | | *Falco subbuteo* | 1 | 2 | i | P | | | | | | X |
| B | | *Accipiter nisus* | 1 | 2 | i | P | | | | | | X |
| B | | *Larus cachinnans* | | | i | P | | | | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots | 4 % |
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 30 % |
| N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, | 4 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 35 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 7 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 15 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 5 % |

### Autres caractéristiques du site

La zone proposée correspond à la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Haute-Savoie).

Vulnérabilité
: Les principaux aspects à prendre en compte sur ce site reposent sur la dynamique fluviale (et en particulier les flux solides) qui doit être conservée ou restaurée. Les îlots dénudés constituent en effet des milieux favorables pour la nidification de certaines espèces (Goéland cendré, Petit Gravelot, ...) ; leur maintien aidera au retour de la Sterne pierregarin.

La basse Dranse est très dégradée. Le régime hydrique est artificialisé par trois barrages sur les principaux affluents et les flux liquides et solides sont déséquilibrés. Le delta lui-même est contraint par les activités humaines. Des projets d'endiguement existent.

Situé à proximité de plusieurs agglomérations, le problème de la fréquentation du site doit également être étudié, car celle-ci peut nuire à la reproduction d'espèces sensibles au dérangement.

## 4.2 Qualité et importance

Situé sur la rive sud du lac Léman, le site du Delta de la Dranse constitue une halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (Laridés, limicoles, anatidés, ardéidés, ...), ainsi qu'un site d'hivernage pour certaines d'entre elles.

Quelques espèces s'y reproduisent de façon régulière (Martin-pêcheur, Fuligule morillon, Grèbe castagneux, Mouette rieuse, ...) ou de manière plus exceptionnelle (Canard chipeau, Nette rousse, ...).

Le Delta de la Dranse est le seul site de reproduction en Rhône-Alpes du Goéland cendré. Cette petite colonie représente une part importante de la population française et est la plus méridionale d'Europe.

Ce site constitue l'un des lieux de chasse de certains rapaces (Faucon pélerin, Faucon hobereau, Epervier d'Europe, ...) ou de nourrissage d'autres oiseaux (Héron cendré, Harle bièvre, ...), sans qu'on ait prouvé à ce jour que ces espèces nichent sur le site lui-même.

La Sterne pierregarin est vue régulièrement en étape migratoire et a même tenté de se reproduire en 2001.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | J02.05 | Modifications du fonctionnement hydrographique | | O |
| L | G01.03 | Véhicules motorisés | | I |
| M | F03.01 | Chasse | | B |
| M | G01.02 | Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés | | I |
| M | G05 | Autres intrusions et perturbations humaines | | I |
| M | J02.12 | Endigages, remblais, plages artificielles | | O |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |
| Domaine communal | 50 % |

## 4.5 Documentation

*TOURNIER H. LEBRETON P. 1979 : Une approche synecologique des milieux humides savoyards. La Terre et la Vie.
*GEROUDET P. : L'avifaune et la conservation des zones humides de Haute Savoie. In Problemes ecologiques lies aux marais et aux zones humides. 1977 Annecy.

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 36 | Réserve naturelle nationale | 100 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 36 | Delta de la Dranse | = | 100% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| Zone humide protégée par la convention de Ramsar | Rives du Lac Léman | - | 100% |
| Réserve Biogénétique du Conseil de l'Europe | DELTA DE LA DRANSE | = | 100% |

### 5.3 Désignation du site

Le Delta de la Dranse fait partie de la ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) RA 12 "Lac Léman".

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : ASTERS (CEN Haute-Savoie)

Adresse : 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy 74370 PRINGY

Courriel : asters@asters.asso.fr

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8210018
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0523707/2009-document-d-objectifs-natura-2000-delta-de-la-dranse-fr8201719

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation

Le Plan de gestion de la réserve naturelle du Delta de la Dranse a été approuvé comme document d'objectifs pour la ZSC et donc la ZPS du Delta de la Dranse le 31 juillet 2000.

Des négociations doivent être menées à l'échelle du bassin versant pour résoudre les problèmes de fréquentation, de qualité d'eau, de flux.

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE GESTION (à préciser avec les acteurs locaux) :
- Maintenir et améliorer la qualité de l'eau.
- Restaurer la dynamique fluviale et les flux de sédiments grossiers.
- Maîtriser la fréquentation humaine sur la rivière.
- Gérer les pelouses sèches et les terrasses dans la partie aval du cours.

INSTRUMENTS CONTRACTUELS, REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS à envisager :
- Plan de gestion de la réserve naturelle.
- Document d'objectifs Natura 2000
- Négociations multipartenariales (communes, E.D.F., sports d'eau vive, pêcheurs, I.N.R.A., S.N.C.F., D.D.E., agriculteurs,...).