NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8301074 - Val d'Allier / Vieille Brioude / Langeac

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR8301074

1.3 Appellation du site

Val d'Allier / Vieille Brioude / Langeac

1.4 Date de compilation

30/11/1995

1.5 Date d'actualisation

22/10/2021

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/11/2015
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/02/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032063087&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,39806°

Latitude : 45,19333°

2.2 Superficie totale

2929 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
43	Haute-Loire	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
43011	AUBAZAT
43031	BLASSAC
43044	CERZAT
43070	CHILHAC
43118	LAVOUTE-CHILHAC
43132	MAZEYRAT-D'ALLIER
43175	SAINT-CIRGUES
43195	SAINT-ILPIZE
43206	SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE
43222	SAINT-PRIVAT-DU-DRAGON
43262	VIEILLE-BRIOUDE
43264	VILLENEUVE-D'ALLIER

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
					A|B|C|D	A|B|C		
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
2330 *Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis*		0,01 *(0 %)*		G	D			
3150 *Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*		0,08 *(0 %)*		G	D			
3250 *Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum*		6,43 *(0,22 %)*		G	D			
3260 *Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion*		1,22 *(0,04 %)*		G	A	C	B	B
3270 *Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.*		0,54 *(0,02 %)*		G	D			
4030 *Landes sèches européennes*		0,5 *(0,02 %)*		G	B	C	C	B
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		0,04 *(0 %)*		G	D			
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		121,19 *(4,14 %)*		G	B	C	B	B
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		5,91 *(0,2 %)*		G	B	C	B	B
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		223,5 *(7,63 %)*		G	B	C	B	C
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		1,11 *(0,04 %)*		G	B	C	B	C
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		11,67 *(0,4 %)*		G	B	C	B	B
91E0	X	7,83		G	C	C	B	C

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)		*(0,27 %)*						
91F0 *Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)*		77,53 *(2,65 %)*		G	C	C	B	C
9120 *Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)*		0,4 *(0,01 %)*		G	D			
9130 *Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum*		3,09 *(0,11 %)*		G	C	C	C	C
9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*	X	0,08 *(0 %)*		G	D			

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1041	*Oxygastra curtisii*	p			i	P	G	C	B	C	B
I	1060	*Lycaena dispar*	p			i	P	G	D			
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	P	G	D			
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	P	G	C	C	C	C
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	R	DD	D			
X	1095	*Petromyzon marinus*	p			i	R	DD	D			
X	1106	*Salmo salar*	p			i	P	G	C	C	C	C
A	1193	*Bombina variegata*	p	8	12	i	P	G	C	C	B	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	p	90	157	i	P	G	C	C	C	C

M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	p	339	438	i	P	G	C	C	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	p	1	13	i	P	G	C	C	C	C
M	1321	*Myotis emarginatus*	p	20	52	i	P	G	C	C	C	C
M	1324	*Myotis myotis*	p	4	4	i	P	G	C	C	C	C
M	1337	*Castor fiber*	p	5	7	i	V	M	C	B	B	C
M	1355	*Lutra lutra*	p			i	C	G	C	A	C	A
X	5316	*Cottus duranii*	p			i	P	DD	D			
X	6150	*Parachondrostoma toxostoma*	p			i	P	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*			i	P	X				X	
A		*Bufo calamita*			i	P	X					X
B		*Streptopelia turtur*	3	29	p	P			X		X	
M		*Eptesicus serotinus*			i	P	X				X	
M		*Myotis mystacinus*			i	P	X				X	

M		*Myotis nattereri*			i	P	X				X	
M		*Myotis daubentoni*			i	P		X				X
M		*Nyctalus leisleri*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus brachyotos*			i	P	X					X
M		*Plecotus austriacus*			i	P	X				X	
M		*Tadarida teniotis*			i	P	X				X	
M		*Pipistrellus kuhlii*			i	P	X				X	
M		*Hypsugo savii savii*			i	P		X				X
O		Barbus barbus			i	P						X
O		Thymallus decorus			i	P		X				X
P		*Convolvulus cantabrica*			i	P						X
P		*Gagea bohemica*			i	P						X
P		*Gagea saxatilis*			i	P						X
P		*Gratiola officinalis*			i	P						X
P		*Leucanthemum monspeliense*			i	P						X
P		*Sempervivum tectorum*			i	P						X
P		*Ulmus laevis*			i	P						X
P		*Galanthus nivalis subsp. imperati*			i	P						X
P		*Minuartia viscosa subsp. confertiflora*			i	P						X
P		*Tuberaria guttata subsp. bupleurifolia*			i	P						X
P		*Plantago holosteum var. holosteum*			i	P						X
R		*Lacerta bilineata*			i	P		X			X	
R		*Lacerta viridis*			i	P	X					X

R		*Zamenis longissimus*			i	P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	20 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	4 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	5 %
N14 : Prairies ameliorées	26 %
N16 : Forêts caducifoliées	30 %
N17 : Forêts de résineux	5 %
N19 : Forêts mixtes	6 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

Intérêt archéologique (abri sous roche de la falaise de Blot).

Intérêt paysager affirmé.

Vulnérabilité
: L'habitat le plus vulnérable est constitué par les forêts d'essence à bois dur de la partie alluviale. Les autres habitats sont peu menacés hormis le risque de banalisation des prairies de fauche.
Vulnérabilité des pelouses pionnières liées aux bonnes pratiques agricoles et à leur maintien.

4.2 Qualité et importance

Grande diversité de milieux en mosaïques.

Certains habitats très représentatifs et très bien exprimés (pelouses pionnières). Présence d'espèces pionnières végétales rares (Gagée de Bohème).

Très nombreuses espèces d'oiseaux vulnérables.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		B

L	E03.04	Autres décharges		I
L	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		O
L	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		B
L	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		B
L	J02.06	Captages des eaux de surface		O
M	A03.01	Fauche intensive ou intensification		I
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I

Incidences positives

Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	A03.02	Fauche non intensive		I
M	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	95 %
Domaine public communal	5 %

4.5 Documentation

Habitats naturels :

CHOISNET G. 2006 - Etude sur la connaisance des Habitats Naturels et Semi-Naturels sur le site Natura 2000 "Val d'Allier Vieille-Brioude/Langeac" FR 8301074 CBNMC , 30 p.

BALLAYDIER A. BOUCARD É. CHENAUX L. 2016 - Suivi de l'état de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire site FR 8301074 "Val d'Allier Vieille-Brioude Langeac" Mosaïque Environnement , 63 p.

Espèces :

BERNARD L., FABREGUE E.,2024. Synthèse des observations d'indices de présence du Castor d'Eurasie en 2024 sur les sites Natura 2000 « Gorges de l'Allier et affluents » FR8301075 et « Val d'Allier Vieille-Brioude/Langeac » FR8301074. SMAT du Haut Allier. 20 pages

Bernard L., FABREGUE E., 2024. Bilan du suivi de la reproduction de 4 espèces de chiroptères d'intérêt communautaire sur les sites Natura 2000 « Val d'Allier Vieille-Brioude\Langeac » FR8301074 et « Gorges de l'Allier et affluents » FR8301075. SMAT du Haut Allier.

MARATRAT, K., 2020, Prospection par détection ultrasonore pour la recherche de gîtes estivaux de chiroptères # Site Natura 2000 Val d'Allier / vieille-Brioude / Langeac. Chauve-souris Auvergne, 21 pages.

Meyer, L., 2019, Prospection du bâti à la recherche de gîtes estivaux de chiroptères # Site Natura 2000 Val d'Allier / vieille-Brioude / Langeac. Chauve-souris Auvergne, 27 pages.

BERNARD L. 2020 Bilan d'activité du Site Natura 2000 FR8301074 « Val d'Allier Vieille-Brioude / Langeac » # SMAT du Haut-Allier, 57p.

BERNARD L. 2019 Bilan d'activité du Site Natura 2000 FR8301074 « Val d'Allier Vieille-Brioude / Langeac » # SMAT du Haut-Allier, 62p.
BERNARD L., 2020. Bilan du suivi 2020 de la population de Sonneur à ventre jaune à Chazieux (commune de St Ilpize) sur le site Natura 2000 « Val d'Allier Vieille-Brioude\Langeac » FR8301074. SMAT du Haut Allier. 7 pages + annexes

BERNARD L., 2019. Bilan du suivi 2019 de la population de Sonneur à ventre jaune à Chazieux (commune de St Ilpize) sur le site Natura 2000 « Val d'Allier Vieille-Brioude\Langeac » FR8301074. SMAT du Haut Allier. 5 pages+ annexes

BERNARD L., 2018. Bilan du suivi 2018 de la population de Sonneur à ventre jaune à Chazieux (commune de St Ilpize) sur le site Natura 2000 « Val d'Allier Vieille-Brioude\Langeac » FR8301074. SMAT du Haut Allier. 7 pages+ annexes

LEGRAND R. BERNARD M. 2007 - Etat des connaissances des Chiroptères sur le territoire du SMAT du Haut-Allier - Chauves-Souris Auvergne, Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne, 29 p.

BERNARD M. 2012 - Comptage des Chiroptères en hibernation sur le territoire du SMAT du Haut-Allier en 2012. Secteur des Gorges de l'Allier (43) et du Brivadois (15-43-63) - Chauves-Souris Auvergne, 33 p.

GIRARD L. BERNARD M. 2014 - Comptage des chiroptères en hibernation sur le territoire du SMAT du Haut Allier en 2013/2014. Secteurs des Gorges de l'Allier (43) du Haut-Brivadois (15-43) et du Brivadois (43-63) - Chauves-Souris Auvergne, 24 p.

BERNARD L. 2018 - Compte-rendu du suivi de la reproduction de 4 espèces de chiroptères d'intérêt communautaire sur les sites Natura 2000 « Val d'Allier Vieille-Brioude\Langeac » FR8301074 et « Gorges de l'Allier et affluents » FR8301075 - SMAT du Haut Allier, 18 p. + annexes

BOUCHARDY C. BOULADE Y. LEMARCHAND C. 2008 - La loutre d'Europe (Lutra lutra) dans le site Natura 2000 "Val d'Allier : Vieille-Brioude - Langeac" FR 8301074 - Catiche Production, 42 p.

BERNARD L. 2018 - Bilan du suivi 2018 de la population de Sonneur à ventre jaune à Chazieux (commune de St Ilpize) sur le site Natura 2000 « Val d'Allier Vieille-Brioude\Langeac » FR8301074 - SMAT du Haut Allier, 7 p.

BERNARD L. 2018 # Compte-rendu observation Sonneur Ventre Jaune au Pont de Costet le 11 09 2018 sur le site Natura 2000 FR8301075 - SMAT du Haut Allier, 7 p.

GADEN JL. THIENPONT S. 2008 - Etude des populations de Sonneur à ventre jaune sur le site Natura 2000 "Val d'Allier Vieille-Brioude/Langeac" FR 8301074 - Ecotope Flore Faune, 26 p.

BERNARD L. 2013 # Compléments rapport d'activité Suivis scientifiques et techniques Chiroptères, Amphibiens, Lucane cerf-volant sur le site Natura 2000 "Val d'Allier Vieille-Brioude / Langeac" FR 8301074 - SMAT du Haut Allier, 15 p.

MOULIN N. 2008 - Suivis du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et du Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus) sur le site Natura 2000 "Val d'Allier Vieille-Brioude / Langeac" FR 8301074 - Nicolas Moulin Entomologiste, 25 p.

BACHELARD P. 1999 - Résultats des prospections concernant le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) sur la zone Natura 2000 : "Val d'Allier : Vieille-Brioude / Langeac" FR 8301074 - Société d'Histoire naturelle Alcide-d'Orbigny, 40 p.

CANTARINI P. 2017 - Evaluation de l'état de conservation des populations de Lépidoptères diurnes d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 : "Val d'Allier : Vieille-Brioude / Langeac" FR 8301074 # Acer Campestre, 36 p.

PARAISOT S. DESECURES R. 1999 - Inventaire d'Oxygastra Curtisii sur le site Natura 2000 "Val d'Allier -Vieille Brioude-Langeac" FR8301074 - Fédération de Protection de la Nature de Haute-Loire, 23 p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
32	Site classé selon la loi de 1930	%
51	Réserve nationale de chasse et de faune sauvage	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier (SMAT)

Adresse : 42, avenue Victor Hugo - BP 64 43300 LANGEAC

Courriel : accueil@haut-allier.com

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8301074
Lien :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/fr8301074-val-d-allier-vieille-brioude-langeac-a5155.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation