NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR8301086 - Sucs du Velay / Meygal

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 3
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 7
6. GESTION DU SITE ..... 8

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site
FR8301086

### 1.3 Appellation du site
Sucs du Velay / Meygal

### 1.4 Date de compilation
30/11/1995

### 1.5 Date d'actualisation
26/06/2020

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Auvergne | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/11/2015
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 02/10/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029582955

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 4,1325°

**Latitude :** 45,055°

## 2.2 Superficie totale

217 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 83 | Auvergne |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 43 | Haute-Loire | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 43007 | ARAULES |
| 43053 | CHAMPCLAUSE |
| 43143 | MONTUSCLAT |
| 43158 | QUEYRIERES |
| 43200 | SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 4030<br>*Landes sèches européennes* | | 6,56<br>*(3,02 %)* | | G | A | C | A | B |
| 5120<br>*Formations montagnardes à Cytisus purgans* | | 0,31<br>*(0,14 %)* | | G | A | C | A | A |
| 5130<br>*Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires* | | 15,58<br>*(7,17 %)* | | G | C | C | A | A |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 0,15<br>*(0,07 %)* | | G | B | C | A | B |
| 8110<br>*Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)* | | 15,43<br>*(7,1 %)* | | G | B | C | A | B |
| 8220<br>*Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique* | | 1,24<br>*(0,57 %)* | | G | C | C | A | B |
| 9120<br>*Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)* | | 4,09<br>*(1,88 %)* | | G | C | C | B | B |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C |

| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Pernis apivorus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Circaetus gallicus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Tachymarptis melba* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Dryocopus martius* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Tichodroma muraria* | | | i | R | | | X | | X | |
| B | | *Lanius collurio* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Prunella collaris* | | | i | R | | | X | | X | |
| B | | *Monticola saxatilis* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Turdus torquatus* | | | i | P | | | X | | X | |
| B | | *Corvus corax* | | | i | P | | | X | | X | |
| I | | *Limenitis populi* | | | i | P | | | X | | | |
| M | | *Myotis mystacinus mystacinus* | | | i | P | | X | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Arctostaphylos uva-ursi* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Arnica montana* | | | | P | | X | | | | X |
| P | | *Cardamine resedifolia* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Gentiana lutea* | | | | P | | X | | | | X |
| P | | *Huperzia selago* | | | i | R | | X | | | | X |
| P | | *Leucanthemum monspeliense* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Lilium martagon* | | | | P | | | | | | X |
| P | | *Sorbus mougeotii* | | | | P | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 35 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 1 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 2 % |
| N17 : Forêts de résineux | 35 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 27 % |

### Autres caractéristiques du site

Ensemble de sucs phonolitiques ayant une forme originale de dôme (pic du Lizieux) et coulée caractéristique.

Ces Sucs caractérisent le paysage du Meygal.

Fréquentation touristique sur le Pic de Lizieux et le Testavoyre moyenne et principalement estivale.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité du site :

Fréquentation touristique sur le Pic de Lizieux et le Testavoyre moyenne et principalement estivale.
Le piétinement humain et la construction de cairns sont les principales menaces sur les populations de plantes vasculaires. Le changement climatique est la deuxième menace possible pour les populations de Lonicera alpigena et Huperzia selago.

## 4.2 Qualité et importance

Ces sucs sont remarquables au niveau géologique en particulier l'étendue et la qualité de conservation des éboulis siliceux. Ces éboulis siliceux sont en connexion spatiale avec différentes formes de landes d'intérêts communautaires. Ils accueillent le Merle de roche, espèce rare en Auvergne, ainsi que tout un cortège de plantes pionnières.

Le site présente un caractère botanique remarquable :

- Présence du raisin d'ours, espèce rare en Auvergne et du Lycopode dressé (espèce également rare en Auvergne) sur les versants nord.
- Plus récemment (en 2018), la présence d'une population de Coscinodon horridus sur le versant le plus chaud et ensoleillé de l'un des sucs du site, au niveau de micro-habitats abrités et ombragés. L'inventaire de ce taxon exceptionnel, jamais encore signalé pour la France est une découverte de première importance pour la bryologie nationale et départementale. Cette espèce de bryophyte est présente sur la liste rouge de l'IUCN comme vulnérable.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| L | G01.02 | Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés | | I |
| L | G05.01 | Piétinement, surfréquentation | | I |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M | M01 | Modifications des conditions abiotiques | | B |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 15 % |
| Domaine public d'une collectivité territoriale | 12 % |
| Domaine de l'état | 73 % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 21 | Forêt domaniale | 73 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 12 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 21 | Forêt domaniale du Meygal | * | 73% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

## 5.3 Désignation du site

# 6. GESTION DU SITE

## 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office National des Forêts

Adresse : Résidence Bel Anis - 3, rue de l'Ecole Normale 43750 Vals près le Puy

Courriel : laure.guillerand@onf.fr

## 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8301086
Lien : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0545854/2011-document-d-objectifs-du-site-sucs-du-velay-meygal-fr8301086

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

## 6.3 Mesures de conservation

ONF.