NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8312005 - Planèze de Saint Flour

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 13
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR8312005

1.3 Appellation du site

Planèze de Saint Flour

1.4 Date de compilation

31/10/2005

1.5 Date d'actualisation

13/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,00972°

Latitude : 45,03167°

2.2 Superficie totale

25193 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
15	Cantal	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
15004	ANDELAT
15041	CHAPELLE-D'ALAGNON
15053	COLTINES
15055	COREN
15059	CUSSAC
15100	LAVEISSENET
15141	NEUSSARGUES EN PINATELLE
15142	NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
15148	PAULHAC
15161	REZENTIERES
15164	ROFFIAC
15187	SAINT-FLOUR
15231	TALIZAT
15232	TANAVELLE
15235	TERNES
15244	USSEL
15248	VALUEJOLS
15262	VILLEDIEU

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A480	*Cyanecula svecica*	c			i	P	M	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	1	1	p	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	M	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	P	M	D			
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	P	M	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	P	M	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	M	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c			i	P	M	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	M	D			

B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	M	D			
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P	M	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	M	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	M	D			
B	A043	*Anser anser*	c			i	P	M	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c			i	P	M	D			
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			p	P	M	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	M	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	M	D			
B	A059	*Aythya ferina*	c			i	P	M	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	M	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	3	3	p	P	M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	25	30	p	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w	40	55	i	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	r	80	110	p	P	G	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	M	B	B	C	B
B	A078	*Gyps fulvus*	c			i	P	M	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	M	D			

B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	2	4	p	P	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	r	2	3	p	P	M	C	C	C	C
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	M	C	C	C	C
B	A091	*Aquila chrysaetos*	c			i	P	M	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	0	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	M	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	M	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	M	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	M	C	B	B	C
B	A119	*Porzana porzana*	w	2	3	i	P	M	B	B	C	B
B	A119	*Porzana porzana*	r	3	3	p	P	M	C	B	C	C
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	M	B	B	C	B
B	A122	*Crex crex*	c			i	P	M	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	M	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	M	D			
B	A125	*Fulica atra*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A125	*Fulica atra*	c			i	P	M	C	B	C	C

B	A127	*Grus grus*	c			i	P	M	D			
B	A128	*Tetrax tetrax*	c			i	P	M	D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	p			i	P	M	D			
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	1	1	p	P	M	C	B	C	C
B	A131	*Himantopus himantopus*	c			i	P	M	D			
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c			i	P	M	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c			i	P	M	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	2	p	P	M	C	B	C	C
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	M	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P	M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c			i	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w			i	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	r	1	1	p	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	M	D			
B	A143	*Calidris canutus*	c			i	P	M	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	P	M	D			
B	A146	*Calidris temminckii*	c			i	P	M	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c			i	P	M	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c			i	P	M	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	M	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	M	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	r	2	4	p	P	M	B	B	C	B

B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	M	D			
B	A154	*Gallinago media*	c	1	1	i	P	G	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	M	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	r	2	5	p	P	M	C	B	C	C
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	M	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P	M	D			
B	A157	*Limosa lapponica*	c			i	P	M	D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c			i	P	M	D			
B	A160	*Numenius arquata*	r	17	21	p	P	M	C	B	C	C
B	A160	*Numenius arquata*	c			i	P	M	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c			i	P	M	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	M	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	M	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	M	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	M	D			
B	A169	*Arenaria interpres*	p			i	P	M	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c			i	P	M	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	M	D			
B	A182	*Larus canus*	p			i	P	M	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c			i	P	M	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	M	D			
B	A194	*Sterna paradisaea*	c			i	P	M	D			

B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	P	M	D			
B	A215	*Bubo bubo*	c			i	P	M	D			
B	A222	*Asio flammeus*	r	1	2	p	P	G	C	B	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	M	C	B	C	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	5	10	p	P	M	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	M	D			
B	A231	*Coracias garrulus*	c			i	P	M	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	25	40	p	P	M	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	r	100	150	p	P	M	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	M	D			
B	A294	*Acrocephalus paludicola*	c			i	P	M	C	B	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r	400	600	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	M	D			
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c			i	P	M	D			
B	A734	*Chlidonias hybrida*	c			i	P	M	D			
B	A773	*Ardea alba*	c			i	P	M	D			
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	P	M	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c			i	P	M	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	M	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	M	D			

B	A868	*Leiopicus medius*	r			p	P	DD	D			
B	A889	*Mareca strepera*	c			i	P	M	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Buteo lagopus*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	35		p	P			X		X	
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			

B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Merops apiaster*			i	P						X
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Hirundo rustica*			i	P			X		X	
B		*Delichon urbica*			i	P			X		X	
B		*Anthus cervinus*	1	5	i	P					X	
B		*Remiz pendulinus*			i	P						X
B		*Lanius excubitor*	20	45	p	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P						X
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Phylloscopus bonelli*			i	P			X		X	
B		*Phylloscopus trochilus*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Passer montanus*			i	P						X
B		*Carduelis spinus*			i	P			X		X	
B		*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	
B		*Miliaria calandra*			i	P						X
B		*Periparus ater*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	3 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	84 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	2 %
N14 : Prairies ameliorées	5 %
N15 : Autres terres arables	%
N16 : Forêts caducifoliées	2 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N19 : Forêts mixtes	%
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	%

Autres caractéristiques du site

La Planèze de Saint-Flour est un vaste plateau basaltique comprenant de grands ensembles prairiaux parsemés de nombreux bosquets de pins. L'originalité de ce paysage de milieux ouverts et de bocages, tient à la présence de milieux humides. La planéité du relief, l'imperméabilité des substrats, alliés à un régime hydrologique souvent marqué par des épisodes tels que la fonte des neiges et une lame d'eau importante au printemps, créeent les conditions d'existence d'un réseau très développé de zones humides (plans d'eau, marais, prairies humides et prairies d'inondation).

Vulnérabilité
: Intensification de l'agriculture, projets de carrière et autres projets d'aménagement, asséchement des zones humides.

4.2 Qualité et importance

L'avifaune nicheuse de ces zones est originale par l'altitude moyenne élevée à laquelle se retrouvent des oiseaux devenus rares en plaine : Courlis cendré et Vanneau huppé, Bécassine des marais et Marouette ponctuée (seule zone en Auvergne où leur reproduction est régulière), Hibou des marais, anatidés (notamment Sarcelles d'été et d'hiver, Canard souchet), Mouette rieuse, Grèbe castagneux, ainsi que toute l'avifaune migratrice liée à ces zones humides. L'ensemble de ces milieux ouverts est fréquenté également par des rapaces : Milan royal, Milan noir, Busards cendré et Saint-Martin, ainsi que d'autres espèces intéressantes : les 3 pies-grièches, la Caille des blés, le Tarier des prés

Signalons également une petite population de Perdrix grises implantée à la suite de lâchers par la Fédération départementale des chasseurs.

Au passage, c'est une zone de halte migratoire importante originale par son altitude au niveau français. Sont trouvées à ces époques de migration, outre les passereaux et les colombidés, la plupart des espèces de limicoles, anatidés, rapaces (dortoirs de busards et de milans, Hibou des marais), des Grues cendrées.
En hivernage, outre le Hibou des marais et le Busard Saint-Martin, l'existence d'un gros dortoir de Milan royal est aujourd'hui exceptionnelle en France.
Au total, 55 espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive fréquentent le site, dont 10 s'y reproduisent régulièrement.

D'autres espèces migratrices concernées par la directive (60 espèces) et justifiant également la désignation du site (article L.414.1.2 2e alinéa du code de l'environnement), sont citées, avec les 55 espèces précédentes.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
H	A04	Pâturage		I
H	A08	Fertilisation		I
H	C01.01.01	Carrières de sable et graviers		I
H	E02.01	Usine		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
H	J02.01	Comblement et assèchement		I
H	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Site désigné également au titre de la directive habitats

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Saint-Flour Communauté

Adresse : Village d'entreprises ZA du Rozier-Coren 15100 Saint-Flour

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8312005
Lien :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0548546/2011-document-d-objectifs-natura-2000-des-sites-planeze-de-saint-flour-fr8301059-fr8312005

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation