NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8312011 - Pays des Couzes

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 5
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR8312011

1.3 Appellation du site

Pays des Couzes

1.4 Date de compilation

30/11/2005

1.5 Date d'actualisation

12/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,08306°

Latitude : 45,51889°

2.2 Superficie totale

51756 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
63	Puy-de-Dôme	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
63005	ANTOINGT
63006	ANZAT-LE-LUGUET
63007	APCHAT
63009	ARDES
63017	AUGNAT
63026	AYDAT
63038	BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
63046	BOUDES
63074	CHALUS
63077	CHAMBON-SUR-LAC
63080	CHAMPEIX
63084	CHANONAT
63087	CHAPELLE-MARCOUSSE
63097	CHASSAGNE
63109	CHIDRAC
63111	CLEMENSAT
63114	COLLANGES
63122	COURGOUL
63123	COURNOLS

63126	CREST
63134	DAUZAT-SUR-VODABLE
63172	GRANDEYROLLES
63199	LUDESSE
63202	MADRIAT
63209	MAREUGHEOL
63220	MAZOIRES
63234	MONTAIGUT-LE-BLANC
63242	MORIAT
63247	MUROL
63250	NESCHERS
63259	OLLOIX
63282	PLAUZAT
63299	RENTIERES
63303	ROCHE-CHARLES-LA-MAYRAND
63313	SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE
63315	SAINT-AMANT-TALLENDE
63330	SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE
63335	SAINT-DIERY
63342	SAINT-FLORET
63345	SAINT-GENES-CHAMPANELLE
63356	SAINT-GERVAZY
63357	SAINT-HERENT
63380	SAINT-NECTAIRE
63383	SAINT-PIERRE-COLAMINE
63395	SAINT-SANDOUX
63396	SAINT-SATURNIN
63401	SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE
63403	SAINT-VINCENT
63409	SAURIER
63422	SOLIGNAT
63429	TERNANT-LES-EAUX
63435	TOURZEL-RONZIERES
63440	VALBELEIX
63449	VERNET-SAINTE-MARGUERITE

63452	VERRIERES
63456	VICHEL
63458	VILLENEUVE
63466	VODABLE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r			i	P	M	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	M	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	M	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	M	C	B	B	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r			i	P	M	C	B	B	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	M	C	B	B	B
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P	M	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	M	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	M	D			

B	A043	*Anser anser*	c			i	P	M	D			
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	P	M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	M	D			
B	A054	*Anas acuta*	c			i	P	M	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	30	50	p	P	M	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	r	30	60	p	P	M	C	B	C	B
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	r	25	40	p	P	M	C	B	C	B
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A078	*Gyps fulvus*	c			i	P	M	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	20	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	M	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	r	1	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	r	5	10	p	P	M	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	M	D			
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	3	5	p	P	M	C	B	C	B

B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	M	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	M	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	r	1	2	p	P	M	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	M	D			
B	A119	*Porzana porzana*	r			i	P	M	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	M	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			p	P	M	C	B	C	B
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A127	*Grus grus*	c			i	P	M	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r			p	P	M	D			
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	c			i	P	M	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c			i	P	M	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c			i	P	M	D			
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c			i	P	M	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	r			p	P	M	C	B	C	B
B	A142	*Vanellus vanellus*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A144	*Calidris alba*	c			i	P	M	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c			i	P	M	D			

B	A146	*Calidris temminckii*	c			i	P	M	D			
B	A152	*Lymnocryptes minimus*	c			i	P	M	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w			i	P	M	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	P	M	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	P	M	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	r			p	P	M	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	c			i	P	M	D			
B	A156	*Limosa limosa*	c			i	P	M	D			
B	A161	*Tringa erythropus*	c			i	P	M	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c			i	P	M	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c			i	P	M	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	P	M	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	M	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	r			p	P	M	C	B	C	B
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	M	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c			i	P	M	D			
B	A215	*Bubo bubo*	p	30	40	p	P	M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	M	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	M	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	100	100	p	P	M	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	M	D			

B	A234	*Picus canus*	p			i	P	M	C	B	C	B
B	A236	*Dryocopus martius*	p	50	50	p	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	w			i	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	r	100	100	p	P	M	C	B	C	B
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	M	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	500	500	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	10	15	p	P	M	D			
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	M	D			
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c			i	P	M	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	c			i	P	M	D			
B	A856	*Spatula querquedula*	c			i	P	M	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c			i	P	M	D			
B	A861	*Calidris pugnax*	c			i	P	M	D			
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	M	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	M	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	46	463	p	P			X		X	
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Athene noctua*			i	P			X			
B		*Apus melba*			i	P						X
B		*Merops apiaster*			i	P						X
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Alauda arvensis*			i	P			X		X	
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Ptyonoprogne rupestris*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	

B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B		*Turdus torquatus*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Sylvia hortensis*			i	P						X
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Corvus corax*			i	P			X		X	
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	6 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	2 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	61 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	5 %
N15 : Autres terres arables	10 %
N16 : Forêts caducifoliées	8 %
N17 : Forêts de résineux	1 %
N19 : Forêts mixtes	4 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	1 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %

Autres caractéristiques du site

Située dans les « Pays coupés », cette zone Natura 2000 à la géographie très variée (alt 430m à 1275 m), est un site important pour la conservation des rapaces forestiers et rupestres.

La Zone de Protection Spéciale du Pays des Couzes englobe les anciennes ZICO de la Montagne de la Serre, des Couzes nord et des Couzes sud.

Deux grands secteurs sont à distinguer : la partie nord qui comprend les gorges remarquables de la Monne, de la Couze Chambon, de la Couze Pavin et de la Couze de Valbeleix. Le secteur sud qui s'étend autour d'Ardes-sur-Couze, dans lequel on trouve la Couze d'Ardes ainsi que d'autres petits affluents de l'Alagnon.

Vulnérabilité
: Tourisme et sports de nature (oiseaux rupestres notamment)

Agriculture : modification des pratiques, abandon de patûrage
ponctuellement.

Energies renouvelables (éoliennes, photovoltaïques)

4.2 Qualité et importance

Il s'agit d'un des sites les plus intéressants en Auvergne et en France pour la conservation des rapaces forestier et rupestres. La densité et la diversité de ce groupe sont remarquables. Sont présents Faucon pélerin, Hibou grand Duc, Aigle botté, Circaëte Jean-Le-Blanc, Bondrée apivore, Milan noir. La population de Milan royal compte également parmi les plus importantes de la région Auvergne. Les deux espèces de busards (Busard cendré et Busard Saint-Martin) nichent dans les landes et les cultures, le Saint-Martin est également hivernant dans cette ZPS.
La population de Bruant ortolan, bien qu'en diminution, reste encore bien présente sur les coteaux, les chaux et même les plaines cultivées. les chaux (pelouses, prairies et zones humides) abritent le Bruant ortolan et les limicoles et rapaces en migration.

D'autres oiseaux de la Directive fréquentent également les milieux forestiers comme le Pic noir et le rare Pic cendré. L'Engoulevent d'Europe est présent dans les zones buissonnantes et arbustives avec une des plus fortes densités de la région. Il en est de même pour l'Alouette lulu et la Pie grièche écorcheur, qui sont également présents dans les secteurs cultivés.

Le site est aussi une voie de migration majeure pour l'Auvergne pour les rapaces, cigognes, pigeons et passereaux. Le site de la Montagne de la Serre a permis entre 1986 et 2004 un suivi de la migration sur toute cette région, et il en résulte un intérêt exceptionnel du passage migratoire entre la rivière Allier et les massifs environnants (chaine des Puys et massif du Sancy) : plusieurs centaines de milliers d'oiseaux dont plus de 5000 rapaces (seuil de sélection pour l'inventaire ZICO) sur le seul site de la Serre et plus de 10000 sur le site de Creste.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
L	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
L	C01.01.01	Carrières de sable et graviers		I
L	G01.04	Alpinisme, escalade, spéléologie		I
M	A03	Fauche de prairies		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
M	G01.03	Véhicules motorisés		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	1 %
32	Site classé selon la loi de 1930	1 %
36	Réserve naturelle nationale	%
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	%
80	Parc naturel régional	60 %
90	Autre protection	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Territoire désigné aussi au titre de la Directive habitats
Site classé des Gorges de la Monne
Réserve Naturelle Régionale du Puy de Marmant
Réserve Naturelle Nationale du rocher de la Jacquette
Arreté préfectoral de protection de biotope du marais salé de Saint Nectaire

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : LPO Auvergne

Adresse : 2 bis rue du Clos Perret 63000 Clermont-ferrand

Courriel : sabine.boursange@lpo.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8312011
Lien :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0545824/2010-document-d-objectifs-du-site-pays-des-couzes-fr8312011

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation

Plans de gestion de la RNN Jacquette

DOCOB sites directive habitats :

FR8301035 : Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes/Limagnes - validéle 13/07/2001
FR8302012 : Gîtes du Pays des Couzes - approuvé par AP le 16/03/2009