NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR9110111 - Basses Corbières

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 10
6. GESTION DU SITE ..... 11

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type
A (ZPS)

### 1.2 Code du site
FR9110111

### 1.3 Appellation du site
Basses Corbières

### 1.4 Date de compilation
30/11/1998

### 1.5 Date d'actualisation
05/08/2014

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Languedoc-Roussillon | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/10/2020

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427625

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 2,75417°

**Latitude :** 42,85278°

## 2.2 Superficie totale

29495 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 91 | Languedoc-Roussillon |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 11 | Aude | 50 % |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 50 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 66014 | BAIXAS |
| 11055 | BUGARACH |
| 66030 | CALCE |
| 11065 | CAMPS-SUR-L'AGLY |
| 66041 | CASES-DE-PENE |
| 66046 | CAUDIES-DE-FENOUILLEDES |
| 11086 | CAVES |
| 11112 | CUBIERES-SUR-CINOBLE |
| 11113 | CUCUGNAN |
| 11123 | DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE |
| 11125 | EMBRES-ET-CASTELMAURE |
| 66069 | ESPIRA-DE-L'AGLY |
| 66071 | ESTAGEL |
| 66077 | FENOUILLET |
| 11143 | FEUILLA |
| 11144 | FITOU |
| 66083 | FOSSE |
| 11157 | FRAISSE-DES-CORBIERES |

| | |
|---|---|
| 66096 | LATOUR-DE-FRANCE |
| 66097 | LESQUERDE |
| 66107 | MAURY |
| 11245 | MONTGAILLARD |
| 66127 | OPOUL-PERILLOS |
| 11270 | PADERN |
| 11188 | PALME |
| 11276 | PAZIOLS |
| 66143 | PLANEZES |
| 66152 | PRUGNANES |
| 66158 | RASIGUERES |
| 11322 | ROQUEFORT-DES-CORBIERES |
| 11326 | ROUFFIAC-DES-CORBIERES |
| 11352 | SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU |
| 66184 | SAINT-MARTIN-DE-FENOUILLET |
| 66187 | SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET |
| 66190 | SALSES-LE-CHATEAU |
| 11384 | SOULATGE |
| 66205 | TAUTAVEL |
| 11398 | TREILLES |
| 11401 | TUCHAN |
| 66231 | VINGRAU |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | r | 2 | 4 | p | | M | C | B | B | B |
| B | A073 | *Milvus migrans* | c | 10 | 500 | i | | M | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | c | 0 | 5 | i | | M | D | | | |
| B | A076 | *Gypaetus barbatus* | w | 0 | 3 | i | | G | D | | | |
| B | A076 | *Gypaetus barbatus* | c | 0 | 3 | i | | G | D | | | |
| B | A077 | *Neophron percnopterus* | r | 0 | 1 | p | | G | C | C | B | C |
| B | A078 | *Gyps fulvus* | w | 20 | 40 | i | | G | D | | | |
| B | A078 | *Gyps fulvus* | c | 20 | 180 | i | | G | D | | | |
| B | A079 | *Aegypius monachus* | c | 0 | 2 | i | | G | D | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A080 | *Circaetus gallicus* | r | 10 | 15 | p | | M | C | B | C | B |
| B | A082 | *Circus cyaneus* | p | 10 | 20 | i | C | M | C | C | B | C |
| B | A084 | *Circus pygargus* | r | 5 | 10 | p | | G | C | C | C | C |
| B | A091 | *Aquila chrysaetos* | p | 4 | 4 | p | | G | C | B | C | B |
| B | A092 | *Hieraaetus pennatus* | r | 0 | 2 | p | | M | C | B | B | B |
| B | A095 | *Falco naumanni* | c | 0 | 20 | i | | M | D | | | |
| B | A100 | *Falco eleonorae* | c | 0 | 5 | i | | M | D | | | |
| B | A103 | *Falco peregrinus* | p | 8 | 10 | p | | M | C | B | C | B |
| B | A215 | *Bubo bubo* | p | 20 | 30 | p | | P | B | B | C | B |
| B | A224 | *Caprimulgus europaeus* | r | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | p | 0 | 2 | p | | M | C | B | C | B |
| B | A231 | *Coracias garrulus* | r | 2 | 3 | p | | G | C | A | B | B |
| B | A236 | *Dryocopus martius* | p | 1 | 3 | p | | M | C | A | B | A |
| B | A243 | *Calandrella brachydactyla* | r | 2 | 3 | p | | G | C | C | B | C |
| B | A245 | *Galerida theklae* | p | 100 | 175 | p | | M | A | C | A | C |
| B | A246 | *Lullula arborea* | p | 150 | 250 | p | | M | C | A | C | B |
| B | A255 | *Anthus campestris* | r | 50 | 100 | p | | M | C | C | C | C |
| B | A302 | *Sylvia undata* | p | 300 | 800 | p | | M | C | C | C | C |
| B | A338 | *Lanius collurio* | r | 15 | 25 | p | | M | C | B | B | C |
| B | A346 | *Pyrrhocorax pyrrhocorax* | p | 15 | 25 | p | | M | C | B | C | B |
| B | A379 | *Emberiza hortulana* | r | 40 | 70 | p | | M | C | C | C | C |
| B | A707 | *Aquila fasciata* | p | 2 | 2 | p | | G | B | C | B | C |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Streptopelia turtur* | 265 | 265 | p | C | | | X | | X | |
| B | | *Clamator glandarius* | 1 | 2 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Tachymarptis melba* | 20 | 50 | p | | | | | | X | |
| B | | *Merops apiaster* | 2 | 7 | p | | | | | | X | |
| B | | *Jynx torquilla* | 5 | 20 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Ptyonoprogne rupestris* | | | | P | | | | | X | |
| B | | *Hirundo daurica* | 0 | 2 | p | | | | X | | | |
| B | | *Tichodroma muraria* | 1 | 5 | i | | | | | | X | |
| B | | *Prunella collaris* | 10 | 40 | i | | | | | | X | |
| B | | *Oenanthe hispanica* | 70 | 120 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Monticola saxatilis* | 40 | 70 | p | | | | | | X | |
| B | | *Monticola solitarius* | 20 | 40 | p | | | | | | X | |
| B | | *Sylvia conspicillata* | 4 | 10 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Sylvia hortensis* | 150 | 300 | p | | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | *Sylvia communis* | 30 | 80 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Muscicapa striata* | 5 | 15 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Lanius senator* | 40 | 70 | p | | | | X | | X | |
| B | | *Sturnus unicolor* | | | | P | | | X | | X | |
| B | | *Petronia petronia* | | | | P | | | | | X | |
| B | | *Carduelis cannabina* | | | | C | | | X | | X | |
| B | | *Miliaria calandra* | | | | P | | | X | | | |
| B | | *Lanius meridionalis* | 0 | 2 | p | | | | X | | X | |
| I | | *Zerynthia rumina* | | | | P | X | | | | | X |
| M | | *Tadarida teniotis* | | | | P | X | | | | X | |
| M | | *Genetta genetta* | | | | P | | X | | | X | |
| R | | *Psammodromus algirus* | | | | P | | | | | X | |
| R | | *Timon lepidus* | | | | P | | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 30 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 20 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 6 % |
| N18 : Forêts sempervirentes non résineuses | 20 % |
| N19 : Forêts mixtes | 3 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 5 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 10 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 5 % |

### Autres caractéristiques du site

Le massif des basses Corbières constitue un remarquable ensemble de collines à la limite des départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude. Les paysages y sont caractéristiques des collines méditerranéennes avec de vastes ensembles de garrigues, plus ou moins fermés du fait de la régression du pastoralisme. Ces milieux accueillent encore une bonne diversité d'espèces d'oiseaux de milieux ouverts et de grands rapaces. Les massifs, composés pour l'essentiel de massifs calcaires, sont entaillés de vallons, parfois de gorges donnant à ce site un caractère très rupestre. Ce relief tourmenté allié à une sécheresse marquée (effet conjugué d'un fort ensoleillement, d'un vent fort et fréquent, d'une forte évapotranspiration de la végétation et du substrat karstiques) confère un aspect singulier à ce site.

Vulnérabilité
: La fermeture des milieux est une menace prégnante sur le site qui diminue ses potentialités écologiques, autant pour ce qui concerne les passereaux méditerranéens que les grands rapaces.

## 4.2 Qualité et importance

Cette zone a été désignée en particulier pour la conservation des rapaces : l'Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Busard cendré (Circus pygargus), l'Aigle botté (Aquila pennata). La fréquentation du site par les vautours est de plus en plus régulière: Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) # qui a tenté de se reproduire sur le site au milieu des années 2000-, Vautour fauve (Gyps fulvus) # qui niche maintenant à quelques kilomètres du site-, Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) # présent à l'année-, Vautour moine (Aegypius monachus). Les menaces générales sur ces grands rapaces sont liées à la fermeture des milieux (qui diminue l'abondance de leurs proies et leur accessibilité), aux dérangements, à la mortalité accidentelle (électrocution, tir ?, empoisonnement ?) des adultes ou des jeunes.
Ce site est également très intéressant pour les passereaux des milieux ouverts comme l'Alouette lulu (Lullula arborea), le Pipit rousseline (Anthus campestris), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) et tout particulièrement le Cochevis de Thékla (Galerida theklae) et le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), pour lesquelles la population nichant sur le site constitue plus de la moitié de la population française.
La ZPS Basses Corbières constitue également un bastion français pour la Fauvette pitchou (Sylvia undata), la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), la Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata), l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) ainsi que pour les passereaux rupestres : Monticole de roche (Monticola saxatilis), Monticole bleu (Monticola solitarius) et Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
La fermeture des milieux, due à la disparition de l'élevage sur la moitié orientale de la ZPS, entraîne une homogénéisation des milieux (augmentation des milieux arbustifs et arborés) et, par conséquent, une banalisation de la biodiversité (augmentation des espèces forestières et ubiquistes et diminution des espèces des milieux ouverts ou des milieux buissonnants bas).

Outre cette menace principale, l'augmentation des dérangements (activités de pleine nature), l'artificialisation des milieux (infrastructures de production d'électricité, d'extraction de matériaux, infrastructure de transport) et la fragmentation induite sont des menaces qui ont récemment augmenté.
Outre les oiseaux, la ZPS Basses Corbières abrite des populations significatives de reptiles, en particulier de Lézard ocellé (Timon lepidus) et de Psammodrome algire (Psammodromus algirus), de mammifères (chiroptères et Genette commune) et d'insectes (en particulier la Proserpine Zerynthia rumina).

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

### Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | B |
| H | C01 | Exploitation minière et en carrière | | B |
| H | D05 | Amélioration de l'accessibilité au site | | B |
| H | G01.03 | Véhicules motorisés | | I |
| H | G01.04 | Alpinisme, escalade, spéléologie | | I |
| L | A07 | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques | X | B |
| L | G01.05 | Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon | | I |
| L | J01.02 | Lutte contre les incendies naturels | | I |
| M | A06.04 | Arrêt de la mise en culture d'une parcelle | | B |
| M | D01.04 | Voie ferrée, TGV | | I |
| M | D02.01 | Lignes électriques et téléphoniques | | B |
| M | E01 | Zones urbanisées, habitations | T | B |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | J01.01 | Incendies | | B |
| L | G04 | Usage militaire et trouble civil | | O |
| M | A04 | Pâturage | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 35 % |
| Collectivité territoriale | 65 % |

## 4.5 Documentation

Bourgeois M., Gilot F. & Savon C, 2010. Gestion d'un milieu naturel pour le Cochevis de Thékla Galerida Theklae dans les Corbières. Ornithos N°17-2 : 106-115.
Bourgeois M., 2009. Programme LIFE NAT/05/F/000139 « Conservation de l'avifaune patrimoniale des Corbières Orientales ». Action D5 : Suivi scientifique des zones gérées expérimentalement. Site internet : http://aude.lpo.fr/life-consavicor/images/Suivi_scientifique_zones_experimentales_web.pdf
Bourgeois, M., Gilot, F. & Savon, C. (Eds), 2009. Gestion des garrigues méditerranéennes en faveur des passereaux patrimoniaux. LIFE NAT/05/F/000139 « Conservation de l'avifaune patrimoniale des Corbières Orientales ». LPO Aude & GOR. Narbonne. 123p.
Bourgeois, M., Gilot, F. & Savon, C. (Eds), 2009. Gestion conservatoire des rapaces méditerranéens : retours d'expériences. LIFE NAT/05/F/000139 « Conservation de l'avifaune patrimoniale des Corbières Orientales ». LPO Aude & GOR. Narbonne. 144p.
Bourgeois M., Gilot F., Gonin J & Fliti A., in prep. Le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) en France : état actuel, répartition historique et perspectives. Ornithos.
Bourgeois M. & Gilot F., 2011. Suivi des Oiseaux Nicheurs rares en menacés en France en 2011 : Le Cochevis de Thékla. Ornithos 18-3 : 173-174.
Bourgeois M. & Gilot F., 2012. Suivi des Oiseaux Nicheurs rares en menacés en France en 2011 : Le Cochevis de Thékla. Ornithos 19-5 : 318.
Chambre d'Agriculture du Roussillon, 2005. Document d'objectifs du site Natura 2000 FR 9110111 « Zone de Protection Spéciale des Basses Corbières ». 264p.
Collin B., 1997 : Evolution du paysage végétal et peuplements d'oiseaux dans les Corbières orientales. Mémoire de D.E.S. Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, Université Paris VI. 49p.
Gilot, F. & Rousseau, E., 2008. La Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata en France : répartition, effectifs et évolution. Alauda. 76 (1) 47-58.
Gilot F. & Courmont L., 2004. Caractérisation des habitats des passereaux nicheurs d'intérêt patrimonial de la ZPS Basses Corbières. LPO Aude & GOR. Rapport DIREN LR, non publié.
Gilot F., 2003. L'Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) dans le vignoble audois : premiers résultats. Meridionalis N °2.
Gilot F. & Rousseau E., 2004. Première nidification arboricole de l'Aigle royal (Aquila chrysaetos) dans les Corbières. Meridionalis N°6.
Gilot F., Bourgeois M. & Savon C., 2010. Evolution récente de l'avifaune des Corbières Orientales et du Fenouillèdes (Aude/Pyrénées-Orientales). Alauda N°78 : 119-130.
Gilot F. & Bourgeois M, 2013. Suivi des Oiseaux Nicheurs rares en menacés en France en 2012 : Le Cochevis de Thékla. Ornithos 20-6 : 325-326.
Goar J-L. & Clouet M., 2013. L'Aigle royal Aquila chrysaetos dans les Corbières : variations du régime alimentaire et des paramètres de reproduction. Alauda 82 (1) :41-49.
Gonin J., 2008. Le Cochevis de Thékla (Galerida theklae) en Languedoc-Roussillon : répartition, biologie/écologie. Mémoire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE). LPO Aude/GOR.
Gonin J., 2010. Avancée des connaissances sur le Cochevis de Thékla Galerida theklae en France. Ornithos, 17-2 : 73-105.
Rousseau E. & Gilot F., 2008. La Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) dans l'Aude. Meridionalis N°8.
Savon C. (Coord.), 2009. Garrigues méditerranéennes : vers une gestion d'un milieu remarquable. Guide pratique. LIFE NAT/05/F/000139 « Conservation de l'avifaune patrimoniale des Corbières Orientales ». 143p.
Savon C., Bourgeois M., 2009. Plan de Conservation après-LIFE. LIFE NAT/05/F/000139 « Conservation de l'avifaune patrimoniale des Corbières Orientales ». 19p.
Union International pour la Conservation de la Nature # Comité français, 2013. Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Site internet.

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 38 | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 2 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 37 | FR9112008 | / | 0% |
| 38 | FR9112028 | / | 0% |
| 38 | arrétés de protection du biotope de l'Aigle de Bonelli | + | 2% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

Continuité écologique avec les ZPS FR9112008 "Corbières-Orientales" et ZPS Fr9112028 "Hautes-Corbières.

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes

Adresse : Antenne du PNR à Estagel, Centre Aragon, Place Francis Ferrer
66310 Estagel

Courriel : natura@valleedelagly.fr

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom :
Lien :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/docob-des-basses-corbieres-a1037.html

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation

Cf actions de conservation initiées par le programme LIFE NAT/05/F/000139 "Conservation de l'Avifaune patrimoniale des Corbières-Orientales"