NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9301502 - Steppique Durancien et Queyrassin

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 14
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR9301502

1.3 Appellation du site

Steppique Durancien et Queyrassin

1.4 Date de compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

13/07/2021

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2003
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 02/06/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297271

Explication(s) :

MAJ 2014.07 : conversion surf site en Lamb93. Actualisation listes, surf et cotations hab esp selon DOCOB + études post DOCOB 2009 (carto hab) et 2011 (chiros, poissons, bryophytes, insectes). # MAJ 2014.09 : suppression de 2 hab (H3250, H3270). # MAJ 2015.01 : ajout Vertigo angustior. # MAJ 2015.03 : pour habitats H1340 et H6110, ajout commentaire expliquant forte baisse de surface, due à un artefact. Ajout 1 esp (Syntrichia caninervis) dans § 3.3. # MAJ 2017-04 : ajout E1220 E1604. # MAJ 2021-07 ajout tourterelle des bois.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 6,62528°

Latitude : 44,67222°

2.2 Superficie totale

19658 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
05	Hautes-Alpes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
05001	ABRIES RISTOLAS
05003	AIGUILLES
05006	ARGENTIERE-LA-BESSEE
05007	ARVIEUX
05012	BARATIER
05026	CEILLAC
05031	CHAMPCELLA
05036	CHATEAUROUX-LES-ALPES
05038	CHATEAU-VILLE-VIEILLE
05044	CREVOUX

05046	EMBRUN
05052	EYGLIERS
05058	FREISSINIERES
05065	GUILLESTRE
05082	MONT-DAUPHIN
05116	REOTIER
05119	RISOUL
05122	ROCHE-DE-RAME
05128	SAINT-ANDRE-D'EMBRUN
05134	SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE
05136	SAINT-CREPIN
05151	SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES
05156	SAINT-SAUVEUR
05180	VIGNEAUX

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
1340 *Prés-salés intérieurs*	X	0,28 *(0 %)*		M	A	C	B	A
3220 *Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée*		340 *(1,73 %)*		M	A	B	B	B
3230 *Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica*		10 *(0,05 %)*		P	A	C	B	B
3240 *Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos*		311 *(1,58 %)*		M	A	B	B	B
4030 *Landes sèches européennes*		179 *(0,91 %)*		M	B	C	B	B
4060 *Landes alpines et boréales*		82 *(0,42 %)*		M	B	C	A	A
4090 *Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux*		261 *(1,33 %)*		M	A	C	B	B
5130 *Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires*		91 *(0,46 %)*		M	A	C	A	A
5210 *Matorrals arborescents à Juniperus spp.*		124 *(0,63 %)*		M	A	C	B	A
6110 *Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi*	X	0,86 *(0 %)*		P	C	C	B	B
6170 *Pelouses calcaires alpines et subalpines*		63 *(0,32 %)*		M	C	C	B	C
6210 *Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)*		4657 *(23,69 %)*		M	A	C	B	A
6410		35		M	A	C	B	B

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)		*(0,18 %)*						
6430 *Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*		10 *(0,05 %)*		M	B	C	B	B
6510 *Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*		484 *(2,46 %)*		M	A	C	A	A
6520 *Prairies de fauche de montagne*		261 *(1,33 %)*		M	A	B	A	A
7220 *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)*	X	0,01 *(0 %)*		M	B	C	A	B
7230 *Tourbières basses alcalines*		21 *(0,11 %)*		M	B	C	B	B
8110 *Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)*		0,58 *(0 %)*		M	D			
8120 *Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)*		60 *(0,31 %)*		M	C	C	B	B
8130 *Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles*		561 *(2,85 %)*		M	A	C	A	A
8210 *Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique*		475 *(2,42 %)*		M	A	C	A	A
8220 *Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique*		7,32 *(0,04 %)*		M	B	C	A	C
8230 *Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii*		1,32 *(0,01 %)*		M	C	C	A	B
8240 *Pavements calcaires*	X	1 *(0,01 %)*		P	B	C	A	A
8310 *Grottes non exploitées par le tourisme*		0 *(0 %)*	40	P	B	C	A	A
91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	X	590 *(3 %)*		M	A	C	B	A
9410 *Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)*		15 *(0,08 %)*		M	C	C	B	C
9420 *Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra*		837 *(4,26 %)*		M	B	B	A	A
9430 *Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)*	X	600 *(3,05 %)*		P	A	C	A	A

9430 *Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)*		339 *(1,72 %)*		P	A	C	A	A
9560 *Forêts endémiques à Juniperus spp.*	X	0,84 *(0 %)*		M	A	C	A	A

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1014	*Vertigo angustior*	p	2	2	localities	V	P	B	B	A	B
I	1044	*Coenagrion mercuriale*	p	3	5	localities	P	M	C	C	A	C
I	1065	*Euphydryas aurinia*	p			i	R	P	C	B	C	C
I	1074	*Eriogaster catax*	p			i	V	P	D			
I	1075	*Graellsia isabellae (Graells, 1849)*	p			i	C	P	A	B	C	A
I	1083	*Lucanus cervus*	p			i	R	P	C	B	C	C
I	1084	*Osmoderma eremita*	p	1	1	localities	V	P	C	C	C	B
I	1088	*Cerambyx cerdo*	p			i	R	P	C	B	C	C
I	1092	*Austropotamobius pallipes*	p	2	2	localities	P	P	C	B	C	B
F	1163	*Cottus gobio*	p			i	R	P	C	B	B	B
A	1193	*Bombina variegata*	p	500	800	i	P	M	C	C	B	B
R	1220	*Emys orbicularis*	p	1	1	localities		P	C	C	C	C
M	1303	*Rhinolophus hipposideros*	c			i	R	P	C	B	C	B

M	1304	*Rhinolophus ferrumequinum*	r	100	150	i	P	P	C	B	C	B
M	1307	*Myotis blythii*	r	200	400	i	P	P	C	B	C	A
M	1308	*Barbastella barbastellus*	w			i	R	DD	C	B	C	C
M	1308	*Barbastella barbastellus*	c			i	R	P	C	B	C	B
M	1324	*Myotis myotis*	r	100	200	i	P	P	C	B	C	A
M	1352	*Canis lupus*	p			i	V	DD	D			
P	1387	*Orthotrichum rogeri*	p	2	2	localities	P	P	B	C	A	C
P	1604	*Eryngium alpinum*	p	2	2	localities		P	C	B	C	C
P	1689	*Dracocephalum austriacum*	p	1000	2000	i	P	M	B	A	C	A
P	1903	*Liparis loeselii*	p	1000	3000	i		G	C	B	A	B
I	1926	*Stephanopachys linearis*	p			i	V	DD	B	B	B	B
I	1927	*Stephanopachys substriatus*	p			i	V	P	B	B	B	B
F	6147	*Telestes souffia*	p			i	V	P	C	C	A	C
F	6150	*Parachondrostoma toxostoma*	p			i	V	DD	D			
I	6199	*Euplagia quadripunctaria*	p			i	C	M	D			
P	6269	*Astragalus alopecurus*	p	10000	20000	i	P	M	A	A	C	A

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
A		*Alytes obstetricans*			i	P	X		X		X	
A		*Bufo calamita*			i	P	X		X		X	
B		*Streptopelia turtur*				R			X		X	
I		*Maculinea arion*			i	P	X		X			
I		*Papilio alexanor*			i	P	X		X		X	
I		*Parnassius apollo*			i	P	X		X		X	
I		*Proserpinus proserpina*			i	P	X		X		X	
I		*Hyles hippophaes*			i	P	X		X		X	
M		*Eptesicus serotinus*			i	P			X		X	
M		*Myotis mystacinus*			i	P			X		X	
M		*Myotis nattereri*			i	P			X		X	
M		*Nyctalus leisleri*			i	P			X		X	
M		*Pipistrellus pipistrellus*			i	P			X		X	
M		*Hypsugo savii*			i	P			X		X	
M		*Plecotus austriacus*			i	P			X		X	
M		*Vespertilio murinus*			i	P			X		X	
M		*Pipistrellus kuhlii*			i	P			X		X	
P		*Adoxa moschatellina*			i	P						X
P		*Alisma lanceolatum*			i	P						X

P		*Anacamptis palustris*			i	P			X			
P		*Androsace helvetica*			i	P						X
P		*Asperula arvensis*			i	P						X
P		*Astragalus austriacus*			i	P						X
P		*Astragalus stella*			i	P						X
P		*Berula erecta*			i	P						X
P		*Bupleurum alpigenum*			i	P						X
P		*Campanula bononiensis*			i	P						X
P		*Campanula stenocodon*			i	P						X
P		*Ceratocephala falcata*			i	P						X
P		*Cotoneaster atlanticus*			i	P						X
P		*Cynoglossum dioscoridis*			i	P						X
P		*Ephedra negrii*			i	P						X
P		*Festuca chasii*			i	P						X
P		*Gagea villosa*			i	P						X
P		*Geranium divaricatum*			i	P						X
P		*Inula bifrons*			i	P						X
P		*Juniperus thurifera*			i	P						X
P		*Luzula pedemontana*			i	P						X
P		*Lythrum thymifolia*			i	P			X			
P		*Nonea erecta*			i	P						X
P		*Orchis spitzelii*			i	P			X			
P		*Paeonia officinalis*			i	P						X

P		*Pedicularis foliosa*			i	P						X
P		*Poa perconcinna*			i	P						X
P		*Puccinellia fasciculata*			i	P						X
P		*Pulsatilla halleri*			i	P						X
P		*Rhinanthus burnatii*			i	P						X
P		*Salvia aethiopis*			i	P						X
P		*Sclerochloa dura*			i	P						X
P		*Silene noctiflora*			i	P						X
P		*Thesium bavarum*			i	P			X			
P		*Tulipa platystigma*			i	P			X	X		
P		*Typha domingensis*			i	P						X
P		*Typha minima*			i	P					X	
P		*Veronica triphyllos*			i	P						X
P		*Allium flavum subsp. flavum*			i	P						X
P		*Allium pallens subsp. pallens*			i	P						X
P		*Androsace maxima subsp. maxima*			i	P						X
P		*Arabis serpyllifolia subsp. serpyllifolia*			i	P						X
P		*Astragalus vesicarius subsp. vesicarius*			i	P						X
P		*Centaurea triumfetti subsp. triumfetti*			i	P						X
P		*Odontites viscosus subsp. viscosus*			i	P						X
P		*Plantago atrata subsp. fuscescens*			i	P						X
P		*Potentilla anserina subsp. anserina*			i	P						X
P		*Rorippa sylvestris subsp. sylvestris*			i	P						X

P		*Telephium imperati subsp. imperati*			i	P						X
P		*Syntrichia caninervis*				P						X
R		*Lacerta viridis*			i	P	X					X
R		*Podarcis muralis*			i	P	X		X		X	
R		*Coluber viridiflavus*			i	P	X					X
R		*Coronella austriaca*			i	P	X		X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	5 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	15 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	6 %
N15 : Autres terres arables	4 %
N16 : Forêts caducifoliées	5 %
N17 : Forêts de résineux	19 %
N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)	3 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	11 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	12 %

Autres caractéristiques du site

Zone calcaire et morainique à remaniement fluvial. Site exceptionnel de systèmes steppiques rares en Europe.

Vulnérabilité
: La problématique est que l'on assiste à une forte déprise agricole avec l'abandon des pratiques d'entretien sur ces pelouses. Il figure des enjeux socio-économiques de taille à l'échelle du département sur ce site. Dans les décennies à venir, il y aura des emprises anthropiques supplémentaires sur ces milieux (infrastructures de transport, zones artisanales, pôles touristiques).

4.2 Qualité et importance

Site exceptionnel de systèmes steppiques rares en Europe. Cette zone calcaire et morainique à remaniement fluvial dispose de la plus belle forêt relique de Genévrier thurifère (vieux sujets de 600 ans) . Présence d'un cortège spécifique ibero-marocain. Les milieux sont très variés : source halophile avec végétation particulière, prairies de fauche montagnardes, bocage très riche, nombreuses forêts subnaturelles. La flore est d'une grande richesse, avec notamment la présence de 4 espèces N2000, dont l'unique station connue à ce jour de l'orchidée Liparis de Loesel. C'est le secteur en France accueillant les stations les plus importantes du papillon Isabelle de France.

Bryophytes (= mousses) : selon une étude réalisée en 2011, le site recèle une richesse exceptionnelle en taxons du genre Orthotrichum et du genre Syntrichia. Il n'existe à l'heure actuelle aucun site en France présentant une telle richesse en espèces appartenant à ces deux genres. Les caractéristiques climatiques et géomorphologiques du site permettent de l'expliquer. Plusieurs taxons de ces deux genres sont en outre rarissimes à l'échelle européenne (Orthotrichum vitii, O. crenulatum, Syntrichia caninervis, S. handelii, S. rigescens). Ces espèces de bryophytes sont, à la différence d'Orthotrichum rogeri (2 micro-stations sur le site), hautement caractéristiques du site Natura 2000.

Précisions concernant les pelouses steppiques subcontinentales (Stipo-Poion carnolicae) :
Un des rares sites Natura 2000 présentant ce type de pelouses, constituant un enjeu très fort de conservation car occupant de très faibles surfaces à l'échelle de la France (quelques vallées des Alpes occidentales), des Alpes dans leur ensemble et de l'Union européenne. Pressions de disparition ou de dégradation accentuées ces dernières années (abandon pastoral en raison de leur faible productivité ou a contrario tentative d'intensification par irrigation, urbanisation et développement récent d'installations industrielles de production d'énergie renouvelable).
Initialement rattachées au code EUR27 / 6240 dans le précédent FSD, ces pelouses ont été intégrées dans le code 6210, dont elles constituent un sous-type particulier (= sous-type 1 dans le cahier d'habitats tome 4 volume 2). Décision résultant d'une concertation entre plusieurs experts nationaux (MNHN, CBNA, CSRPN PACA), en mai 2010. A considérer comme un enjeu de conservation prioritaire, et à bien distinguer des autres sous-types de pelouses du 6210, moins rares donc de moindre enjeu.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		I
H	B02.01	Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après éclaircie)		I
H	D01	Routes, sentiers et voies ferrées		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
H	J02.03	Canalisation et dérivation des eaux		I
H	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
H	K04.01	Compétition (flore)		I
H	L	Evénements géologiques, catastrophes naturelles		I
L	A09	Irrigation		I
L	B01	Plantation forestière en milieu ouvert		I
L	E01.01	Urbanisation continue		I
L	K01.01	Erosion		I
M	C01.01	Extraction de sable et graviers		I
M	C01.01.01	Carrières de sable et graviers		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
M	E03	Décharges		I
M	F03.02.01	Collecte d'animaux (insectes, reptiles, amphibiens, ...)		I
M	F04.01	Pillage de stations floristiques		I
M	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
M	J02.12	Endigages, remblais, plages artificielles		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A04	Pâturage		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.

- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Indéterminé	100 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	6 %
32	Site classé selon la loi de 1930	1 %
34	Parc national, aire d'adhésion	28 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %
80	Parc naturel régional	34 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
31	Mont Dauphin	+	1%
31	Basse vallée du Guil	*	5%
32	Plaine dite sous le Roc	+	1%
34	Ecrins [aire d'adhésion]	*	28%
38	Adoux de Grépon	+	1%
80	Queyras	*	34%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de communes du Guillestrois

Adresse : Le bourg 05600 MONT DAUPHIN

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/971_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt
Nom :
Lien :
http://hautes-alpes.n2000.fr/

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation