NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 11
6. GESTION DU SITE ..... 12

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR9301511

### 1.3 Appellation du site

Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur

### 1.4 Date de compilation

31/01/1996

### 1.5 Date d'actualisation

08/11/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2003
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 02/06/2010

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022297276

### Explication(s) :

MAJ 2013.12 : actualisation donnees biologiques DOCOB (surf hab) et ajout/retrait esp post DOCOB + ajustement perimetre sur limite regionale BD TOPO, pour coherence avec site tangeant cote Rhone-Alpes (surf : 35530 ha au lieu de 35604 ha). MAJ 2016.04 : actu insectes (DH2 + autres) selon étude Y. Braud (terrain 2014). MAJ 2017-04 : ajout E1387.

## 2. LOCALISATION DU SITE

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 5,91417°

**Latitude :** 44,61444°

### 2.2 Superficie totale

35530 ha

### 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

### 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |

### 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 05 | Hautes-Alpes | 100 % |

### 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 05010 | ASPRES-SUR-BUECH |
| 05139 | DEVOLUY |
| 05054 | FARE-EN-CHAMPSAUR |
| 05055 | FAURIE |
| 05061 | GAP |
| 05062 | GLAIZIL |
| 05072 | LAYE |
| 05087 | MONTMAUR |
| 05095 | NOYER |
| 05104 | POLIGNY |
| 05112 | RABOU |
| 05123 | ROCHE-DES-ARNAUDS |

| | |
|---|---|
| 05146 | SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE |
| 05179 | VEYNES |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (90%)
Méditerranéenne (10%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 3220<br>*Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée* | | 0,1<br>*(0 %)* | | M | D | | | |
| 4060<br>*Landes alpines et boréales* | | 701<br>*(1,97 %)* | | M | B | C | A | B |
| 5110<br>*Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)* | | 31<br>*(0,09 %)* | | M | C | C | B | C |
| 5130<br>*Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires* | | 46<br>*(0,13 %)* | | M | C | C | B | B |
| 5210<br>*Matorrals arborescents à Juniperus spp.* | | 0,5<br>*(0 %)* | | M | D | | | |
| 6110<br>*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* | X | 0,1<br>*(0 %)* | | M | D | | | |
| 6170<br>*Pelouses calcaires alpines et subalpines* | | 6130<br>*(17,25 %)* | | M | A | B | A | A |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 1577<br>*(4,44 %)* | | M | A | C | B | A |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 3,5<br>*(0,01 %)* | | M | C | C | C | C |
| 6430<br>*Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin* | | 10<br>*(0,03 %)* | | M | C | C | B | C |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 451<br>*(1,27 %)* | | M | A | C | B | A |
| 6520<br>*Prairies de fauche de montagne* | | 397<br>*(1,12 %)* | | M | A | B | B | A |
| 7220 | X | 0,3 | | M | C | C | C | C |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* | | *(0 %)* | | | | | | |
| 7230<br>*Tourbières basses alcalines* | | 0,8<br>*(0 %)* | | M | C | C | B | C |
| 8120<br>*Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)* | | 3400<br>*(9,57 %)* | | M | A | B | A | A |
| 8130<br>*Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles* | | 1394<br>*(3,92 %)* | | M | A | B | A | A |
| 8210<br>*Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique* | | 2040<br>*(5,74 %)* | | M | A | B | A | A |
| 8310<br>*Grottes non exploitées par le tourisme* | | 0<br>*(0 %)* | 100 | M | B | C | B | B |
| 91E0<br>*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | X | 269<br>*(0,76 %)* | | M | A | C | B | B |
| 9150<br>*Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion* | | 2386<br>*(6,72 %)* | | M | A | C | B | A |
| 9180<br>*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | X | 82<br>*(0,23 %)* | | M | A | C | B | B |
| 9430<br>*Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)* | X | 262<br>*(0,74 %)* | | M | A | C | A | A |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1059 | *Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)* | p | 2 | 3 | localities | | M | C | C | C | B |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | | | i | R | M | C | B | C | B |
| I | 1074 | *Eriogaster catax* | p | 5 | 5 | localities | | M | C | B | C | C |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | R | P | C | B | C | C |
| I | 1087 | *Rosalia alpina* | p | | | i | R | M | C | B | C | B |
| I | 1088 | *Cerambyx cerdo* | p | | | i | R | P | C | B | C | C |
| I | 1092 | *Austropotamobius pallipes* | p | 2 | 2 | localities | P | M | C | C | B | C |
| F | 1163 | *Cottus gobio* | p | | | i | R | M | C | B | C | B |
| A | 1193 | *Bombina variegata* | p | | | i | V | M | C | B | B | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | c | | | i | R | P | C | B | C | B |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | c | 110 | 110 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | p | | | i | R | DD | C | B | C | B |
| M | 1310 | *Miniopterus schreibersii* | c | | | i | R | G | C | B | B | B |
| M | 1321 | *Myotis emarginatus* | c | | | i | V | P | C | B | B | B |
| M | 1324 | *Myotis myotis* | c | | | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1352 | *Canis lupus* | p | 1 | 7 | i | P | G | B | B | C | B |
| M | 1361 | *Lynx lynx* | p | 1 | 1 | i | | G | C | B | B | B |
| P | 1386 | *Buxbaumia viridis* | p | | | i | R | M | B | B | C | B |
| P | 1387 | *Orthotrichum rogeri* | p | 2 | 2 | localities | | P | C | B | C | C |
| P | 1474 | *Aquilegia bertolonii* | p | 1 | 1 | localities | P | G | B | B | C | B |
| P | 1689 | *Dracocephalum austriacum* | p | 10 | 10 | i | P | G | B | B | C | B |
| P | 1902 | *Cypripedium calceolus* | p | 15 | 20 | localities | P | M | B | B | C | B |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | R | M | D | | | |
| P | 6282 | *Klasea lycopifolia* | p | 10000 | 10000 | i | P | G | B | B | C | B |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| I | | *Otiorhynchus bigoti* | | | | R | | | | X | | |
| I | | *Chazara briseis* | | | | R | | | X | | | |
| I | | *Erebia epistygne* | | | | V | | | | | | X |
| I | | *Nymphalis antiopa* | | | | R | | | | | | X |
| I | | *Maculinea arion* | | | | C | X | | | | X | |
| I | | *Papilio alexanor* | | | | V | X | | | | X | |
| I | | *Zerynthia rumina* | | | | R | X | | | | | X |
| I | | *Parnassius mnemosyne* | | | | R | X | | | | X | |
| I | | *Duvalius delphinensis louveti* | | | | V | | | | X | | |
| I | | *Zygaena brizae vesubiana* | | | | V | | | | | | X |
| I | | *Otiorhynchus coachei* | | | | V | | | | X | | |
| I | | *Parnassius apollo geminus* | | | | C | X | | | | | X |
| I | | *Boudinotiana touranginii* | | | | V | | | | | | X |
| I | | *Maculinea alcon rebeli* | | | | C | | | | | | X |
| I | | *Luraphaenops gaudini gaudini* | | | | V | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Allium narcissiflorum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Allium scaberrimum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Androsace chaixii* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Androsace maxima* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Artemisia chamaemelifolia* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Avenula versicolor* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Bromus pannonicus* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Callianthemum coriandrifolium* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Carduus personata* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Carex hostiana* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Coristospermum ferulaceum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Cotoneaster raboutensis* | | | i | P | | | | X | | |
| P | | *Cystopteris alpina* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Dianthus subacaulis* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Dracocephalum ruyschiana* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Epipactis microphylla* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Galium saxosum* | | | i | P | | | X | X | | |
| P | | *Juniperus thurifera* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Lactuca quercina* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Lepidium villarsii* | | | i | P | | | X | X | | |
| P | | *Nepeta nuda* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Oxytropis amethystea* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Papaver aurantiacum* | | | i | P | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Primula hirsuta* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Stemmacantha heleniifolia* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Taxus baccata* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Trochiscanthes nodiflora* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Valeriana saliunca* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Viola cenisia* | | | i | P | | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 15 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 6 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 2 % |
| N11 : Pelouses alpine et sub-alpine | 22 % |
| N15 : Autres terres arables | 1 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 11 % |
| N17 : Forêts de résineux | 14 % |
| N19 : Forêts mixtes | 13 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 2 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 13 % |

### Autres caractéristiques du site

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques: 90% pour le domaine alpin et 10% pour le domaine méditerranéen.

Vulnérabilité
: Zone peu perturbée par l'homme, (falaises, éboulis, forêt avec accès difficile) ou milieu en équilibre sylvo-pastoral depuis des siècles (Plateau du Dévoluy). La menace viendrait d'un abandon du milieu rural. Le maintien des agrosystèmes traditionnels est indispensable pour garantir la biodiversité.

## 4.2 Qualité et importance

Ensemble exceptionnel en contexte calcaire disposant des plus beaux éboulis de France. Zone limite Alpes du Nord, Alpes du Sud avec affinité ouest alpine ; zone dont les sommets ont échappé aux glaciations. La position de massif charnière et le foyer endémique en font un site remarquable. Le cortège spécifique faune-flore est remarquable. Grottes abondantes et intéressantes dans ce relief karstique. Espèces végétales présentant un très fort intérêt patrimonial, notamment sur le plateau sommital de Bure bénéficiant d'un arrêté de protection de biotope.

Présence d'un vaste domaine sylvatique de très grande qualité où certaines zones ont été peu exploitées. Les peuplements sont essentiellement des sapinières et sapinières-hêtraies, pour la plupart traitées en futaie jardinée ou irrégulière. Les taillis sont présents à la marge dans les secteurs où le hêtre est plus abondant. Le pin à crochets est ponctuellement présent dans les parties plus rocheuses des hauts de versants. Une des caractéristiques du secteur est l'abondance de l'if (Taxus baccata) dans plusieurs forêts. Cette essence réputée typique des forêts anciennes a été fortement éliminée par l'homme par le passé. On trouve ici de façon localisée des stations assez denses, notamment dans le grand bois de Poligny coté Champsaur.

Site très favorable aux chiroptères (20 espèces recensées à ce jour).

Serratula lycopifolia : station de Montmaur incluse au sein de la forêt domaniale des Sauvas. L'espèce y est abondante et n'est pas directement menacée (source : DOCOB).

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |

| Incidences positives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A03 | Fauche de prairies | | I |
| H | A04 | Pâturage | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 12 % |
| Domaine communal | 35 % |
| Domaine privé de l'état | 36 % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

## 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 23 | Réserve biologique dirigée | 1 % |
| 27 | Réserve biologique domaniale dirigée | 1 % |
| 29 | Réserve biologique | 1 % |
| 21 | Forêt domaniale | 36 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 17 % |

## 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 29 | Bois du Chapitre | + | 1% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Animateur N2000 : SMIGIBA

Adresse : Grande Rue, Maison de l'Intercommunalité 05140 Aspres-sur-Buech

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom : Document d'Objectifs N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/974_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt
Nom :
Lien :
http://hautes-alpes.n2000.fr/

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

### 6.3 Mesures de conservation

Document d'Objectifs (approuvé le 06 octobre 2003 par le Préfet des Hautes-Alpes)