NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR9301570 - Préalpes de Grasse

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 12
6. GESTION DU SITE ..... 12

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR9301570

### 1.3 Appellation du site

Préalpes de Grasse

### 1.4 Date de compilation

31/01/1996

### 1.5 Date d'actualisation

16/07/2021

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 21/01/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028558266

### Explication(s) :

MAJ nov 2012 : ajout surfaces habitats issues du DOCOB + champ data quality + conversion surface site en Lamb 93 sans modification du périmètre. # MAJ 2013.01.09 : actualisation hab H6210. # MAJ 2013.04.22 : compléments mineurs pour esp (eff. max, qualité données). # MAJ 2013.10.22 : re-ajout Euphydryas aurinia (bug logiciel lors de la maj de nov.2012). # MAJ 2016.04 : actu datas chiros et flore selon études 2014. # MAJ 2016.06 : ajout du Loup. # MAJ 2021-07 ajout tourterelle des bois

## 2. LOCALISATION DU SITE

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 6,92556°

**Latitude :** 43,73528°

### 2.2 Superficie totale

18192 ha

### 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

### 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |

### 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 06 | Alpes-Maritimes | 100 % |

### 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 06003 | ANDON |
| 06010 | BAR-SUR-LOUP |
| 06037 | CAUSSOLS |
| 06041 | CIPIERES |
| 06049 | COURMES |
| 06050 | COURSEGOULES |
| 06058 | ESCRAGNOLLES |
| 06068 | GOURDON |
| 06070 | GREOLIERES |
| 06107 | ROQUE-EN-PROVENCE |
| 06122 | SAINT-JEANNET |

| | |
|---|---|
| 06130 | SAINT-VALLIER-DE-THIEY |
| 06148 | TOURRETTES-SUR-LOUP |
| 06157 | VENCE |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| 4090<br>*Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux* | | 461<br>*(2,53 %)* | | M | A | C | A | B |
| 5210<br>*Matorrals arborescents à Juniperus spp.* | | 88<br>*(0,48 %)* | | M | B | C | A | B |
| 6110<br>*Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* | X | 1<br>*(0,01 %)* | | P | B | C | A | B |
| 6170<br>*Pelouses calcaires alpines et subalpines* | | 18<br>*(0,1 %)* | | M | A | C | B | B |
| 6210<br>*Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | | 640<br>*(3,51 %)* | | M | B | C | A | B |
| 6220<br>*Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* | X | 1,9<br>*(0,01 %)* | | M | A | C | B | B |
| 6410<br>*Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)* | | 19<br>*(0,1 %)* | | M | A | C | B | B |
| 6420<br>*Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion* | | 1,7<br>*(0,01 %)* | | M | B | C | B | C |
| 6510<br>*Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)* | | 124<br>*(0,68 %)* | | M | B | C | B | C |
| 7220<br>*Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* | X | 0,02<br>*(0 %)* | | M | B | C | A | C |
| 8130<br>*Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles* | | 19<br>*(0,1 %)* | | M | B | C | A | B |
| 8210<br>*Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique* | | 4,6<br>*(0,03 %)* | | P | A | C | A | A |
| 8240 | X | 24 | | M | A | C | A | A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pavements calcaires* | | *(0,13 %)* | | | | | | |
| 8310<br>*Grottes non exploitées par le tourisme* | | 0<br>*(0 %)* | 500 | M | A | C | A | B |
| 9180<br>*Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | X | 3,1<br>*(0,02 %)* | | M | B | C | A | C |
| 9340<br>*Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia* | | 719<br>*(3,94 %)* | | M | A | C | A | B |
| 9540<br>*Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques* | | 41<br>*(0,22 %)* | | M | B | C | B | C |
| 9580<br>*Bois méditerranéens à Taxus baccata* | X | 3<br>*(0,02 %)* | | M | A | B | A | B |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| I | 1065 | *Euphydryas aurinia* | p | | | i | C | P | C | B | C | B |
| I | 1074 | *Eriogaster catax* | p | | | i | P | DD | C | B | C | B |
| I | 1083 | *Lucanus cervus* | p | | | i | C | M | C | A | C | B |
| I | 1084 | *Osmoderma eremita* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| I | 1087 | *Rosalia alpina* | p | | | i | P | P | C | B | C | B |
| I | 1088 | *Cerambyx cerdo* | p | | | i | C | M | C | A | C | B |
| I | 1092 | *Austropotamobius pallipes* | p | | | i | P | P | D | | | |
| F | 1138 | *Barbus meridionalis* | p | | | i | R | M | C | B | C | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1298 | *Vipera ursinii* | p | 10000 | 10000 | i | P | M | A | B | A | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | w | 30 | 40 | i | V | M | C | B | C | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | r | 1 | 10 | i | V | M | C | B | C | B |
| M | 1303 | *Rhinolophus hipposideros* | c | 30 | 40 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | w | 1 | 10 | i | V | M | C | B | C | C |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | r | | | i | V | P | C | B | C | B |
| M | 1304 | *Rhinolophus ferrumequinum* | c | | | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1305 | *Rhinolophus euryale* | c | | | i | V | P | C | C | C | C |
| M | 1307 | *Myotis blythii* | w | | | i | V | P | C | B | C | C |
| M | 1307 | *Myotis blythii* | c | | | i | V | P | C | B | C | C |
| M | 1308 | *Barbastella barbastellus* | c | | | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1310 | *Miniopterus schreibersii* | c | 200 | 300 | i | R | M | C | C | C | B |
| M | 1321 | *Myotis emarginatus* | c | | | i | R | P | C | B | C | C |
| M | 1323 | *Myotis bechsteinii* | c | | | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1352 | *Canis lupus* | p | | | i | R | P | C | B | C | C |
| P | 1379 | *Mannia triandra* | p | 3 | 3 | localities | V | G | B | B | B | A |
| P | 1386 | *Buxbaumia viridis* | p | 2 | 3 | localities | V | M | C | B | B | C |
| P | 1387 | *Orthotrichum rogeri* | p | 1 | 1 | localities | V | M | C | B | B | C |
| P | 1474 | *Aquilegia bertolonii* | p | 3 | 3 | localities | P | M | C | A | B | A |
| P | 6176 | *Acis nicaeensis* | p | 50 | 60 | localities | R | G | B | A | B | B |
| I | 6199 | *Euplagia quadripunctaria* | p | | | i | C | M | C | B | C | C |
| P | 6282 | *Klasea lycopifolia* | p | 1000000 | 1000000 | i | C | M | B | B | B | A |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| A | | *Hyla meridionalis* | | | i | P | X | | X | | X | |
| A | | *Rana dalmatina* | | | i | P | X | | X | | X | |
| B | | *Streptopelia turtur* | | | | R | | | X | | X | |
| I | | *Maculinea arion* | | | i | P | X | | X | | | |
| I | | *Papilio alexanor* | | | i | P | X | | X | | X | |
| I | | *Parnassius apollo* | | | i | P | X | | X | | X | |
| I | | *Parnassius mnemosyne* | | | i | P | X | | X | | X | |
| I | | *Saga pedo* | | | i | P | X | | X | | X | |
| M | | *Eptesicus serotinus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Myotis nattereri* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Myotis daubentoni* | | | i | P | | | | | | X |
| M | | *Nyctalus leisleri* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Pipistrellus pipistrellus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Pipistrellus nathusii* | | | i | P | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | | *Hypsugo savii* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Plecotus auritus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Plecotus austriacus* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Tadarida teniotis* | | | i | P | | | X | | X | |
| M | | *Pipistrellus kuhlii* | | | i | P | | | X | | X | |
| P | | *Brassica montana* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Carex buxbaumii* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Cytisus ardoinoi* | | | i | P | | | X | X | | |
| P | | *Delphinium fissum* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Erodium rodiei* | | | i | P | | | X | X | | |
| P | | *Ferulago campestris* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Fritillaria orientalis* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Gagea lutea* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Gagea pratensis* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Gagea saxatilis* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Geranium macrorrhizum* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Iris graminea* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Lathraea squamaria* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Lavatera maritima* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Ophrys aurelia* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Orchis laxiflora* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Phyllitis scolopendrium* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Primula marginata* | | | i | P | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | *Pulsatilla halleri* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Sedum fragrans* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Stachys heraclea* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Veratrum nigrum* | | | i | P | | | X | | | |
| P | | *Viola jordanii* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Paeonia officinalis subsp. huthii* | | | i | P | | | | | | X |
| P | | *Holosteum umbellatum var. hirsutum* | | | i | P | | | | X | | |
| R | | *Lacerta viridis* | | | i | P | X | | | | | X |
| R | | *Podarcis muralis* | | | i | P | X | | X | | X | |
| R | | *Coluber viridiflavus* | | | i | P | X | | | | | X |
| R | | *Coronella austriaca* | | | i | P | X | | X | | X | |
| R | | *Elaphe longissima* | | | i | P | X | | | | | X |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 52 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 15 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 1 % |
| N11 : Pelouses alpine et sub-alpine | 1 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 1 % |
| N14 : Prairies ameliorées | 1 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 14 % |
| N17 : Forêts de résineux | 5 % |
| N18 : Forêts sempervirentes non résineuses | 4 % |
| N19 : Forêts mixtes | 1 % |
| N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) | 1 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 1 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 1 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 1 % |

### Autres caractéristiques du site

Site exceptionnel de par son ensemble complexe de systèmes steppiques et karstiques.

Vulnérabilité
: La fermeture des milieux en raison d'une dynamique très forte du Pin sylvestre est une menace de banalisation.

## 4.2 Qualité et importance

Ce site accueille de nombreuses espèces rares, voire endémiques, notamment sur le plan floristique. Il est également important pour la vipère d'Orsini.

Données anciennes :
Habitats 9150, 5110, 8230 : habitats listés dans l'ancien FSD, mais dont l'identification a été remise en cause dans le DOCOB.

Données anciennes : présence à confirmer :
Euphorbia hyberna L. subsp. canutii (Parl.) Tutin
Leucanthemum burnatii Briq. & Cavillier
Myrrhoides nodosa
Smyrnium perfoliatum L.
Hydromantes strinatii : donnée de 1953.
Lutra lutra

L'évaluation globale de la qualité du site pour les chiroptères est difficile car il manque des informations de terrain . Pour l'ensemble des chiroptères cités, la présence pour la reproduction et l'hivernage est probable à très probable. L'état de conservation est très lié à la fréquentation des sites (dérangements...)
(Source : GCP). Barbastelle et Pipistrelle soprane ont été découvertes récemment dans le site ou à proximité immédiate.

Mannia triandra : une station a été découverte en limite de site sur la commune de St Jeannet. L'espèce est présente sur une dizaine de mètres carrés, il y a une vingtaine d'individus. Découverte le 01/12/2002 (échantillon d'herbier), Leg. Benoît OFFERHAUS, Det. Vincent HUGONNOT). Une autre station a été découverte à proximité du site FR9301574 RIVIERE LA SIAGNE ET SES GORGES.

Serratula lycopifolia : une station connue à Caussols, lieu dit "les grands prés", sur une parcelle agricole de 12 000 m2, comprenant 100 à 1000 individus.

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

### Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| H | J01.01 | Incendies | | I |
| H | K03.06 | Antagonisme avec des animaux domestiques | | I |
| M | A01 | Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) | | I |
| M | A04.01 | Pâturage intensif | | I |
| M | G05.01 | Piétinement, surfréquentation | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04.02 | Pâturage extensif | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Domaine communal | 10 % |
| Domaine de l'état | 10 % |

## 4.5 Documentation

Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 31 | Site inscrit selon la loi de 1930 | 39 % |
| 32 | Site classé selon la loi de 1930 | 41 % |
| 37 | Réserve naturelle volontaire | 3 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 31 | Site inscrit - 'nom du site inconnu' | * | 39% |
| 32 | Site classé - Les Baous : extension du classement | * | 32% |
| 32 | Site classé - Les Baous : ensemble formé par l'arriere pays | * | 9% |
| 37 | RNV Domaine des Courmettes | * | 3% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Comm Agglo Sophia Antipolis (CASA)

Adresse : 449 Route des Crêtes 06560 Sophia Antipolis

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'Objectifs N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/956_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

## 6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs approuvé en 2004 par le Préfet des Alpes Maritimes.