NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR9312002 - Préalpes de Grasse

1. IDENTIFICATION DU SITE ..... 1
2. LOCALISATION DU SITE ..... 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ..... 4
4. DESCRIPTION DU SITE ..... 9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ..... 11
6. GESTION DU SITE ..... 11

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type
A (ZPS)

### 1.2 Code du site
FR9312002

### 1.3 Appellation du site
Préalpes de Grasse

### 1.4 Date de compilation
30/11/1999

### 1.5 Date d'actualisation
10/08/2017

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen | Responsable du site | Responsable technique et scientifique national |
|---|---|---|
| Ministère en charge de l'écologie | DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur | MNHN - Service du Patrimoine Naturel |
| www.developpement-durable.gouv.fr | www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr | www.mnhn.fr<br>www.spn.mnhn.fr |
| en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr | | natura2000@mnhn.fr |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/09/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037499017

Explication(s) :

MAJ 2008-09 : actualisation listes espèces selon DOCOB (?). MAJ 2015-08 : conversion surface en lamb93. Actualisation listes espèces selon inventaire complémentaire post-DOCOB (LPO 2014). MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca).

# 2. LOCALISATION DU SITE

## 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :** 6,99111°

**Latitude :** 43,75972°

## 2.2 Superficie totale

23113 ha

## 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

## 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région |
|---|---|
| 93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |

## 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|---|---|---|
| 06 | Alpes-Maritimes | 100 % |

## 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes |
|---|---|
| 06003 | ANDON |
| 06010 | BAR-SUR-LOUP |
| 06027 | CAGNES-SUR-MER |
| 06028 | CAILLE |
| 06037 | CAUSSOLS |
| 06041 | CIPIERES |
| 06044 | COLLE-SUR-LOUP |
| 06049 | COURMES |
| 06050 | COURSEGOULES |
| 06058 | ESCRAGNOLLES |
| 06068 | GOURDON |
| 06070 | GREOLIERES |
| 06107 | ROQUE-EN-PROVENCE |
| 06105 | ROQUEFORT-LES-PINS |
| 06112 | ROURET |

| | |
|---|---|
| 06122 | SAINT-JEANNET |
| 06130 | SAINT-VALLIER-DE-THIEY |
| 06148 | TOURRETTES-SUR-LOUP |
| 06157 | VENCE |
| 06161 | VILLENEUVE-LOUBET |

## 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | | Représent -ativité | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | | Évaluation du site | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Type | Taille | | Unité | Cat. | Qualité des données | A\|B\|C\|D | A\|B\|C | | |
| | | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | | Pop. | Cons. | Isol. | Glob. |
| B | A025 | *Bubulcus ibis* | w | 10 | 50 | i | | P | C | B | C | C |
| B | A026 | *Egretta garzetta* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A028 | *Ardea cinerea* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A053 | *Anas platyrhynchos* | p | 11 | 16 | grids1x1 | C | P | C | B | C | C |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | r | 3 | 4 | p | P | M | D | | | |
| B | A072 | *Pernis apivorus* | c | | | i | C | DD | D | | | |
| B | A073 | *Milvus migrans* | r | 0 | 1 | p | | M | D | | | |
| B | A073 | *Milvus migrans* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A074 | *Milvus milvus* | c | | | i | V | DD | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A077 | *Neophron percnopterus* | c | 0 | 1 | i | V | P | D | | | |
| B | A078 | *Gyps fulvus* | c | 20 | 100 | i | P | P | C | B | C | C |
| B | A079 | *Aegypius monachus* | c | 1 | 5 | i | | P | D | | | |
| B | A080 | *Circaetus gallicus* | r | 10 | 12 | p | P | G | C | A | C | A |
| B | A080 | *Circaetus gallicus* | c | | | i | R | DD | C | B | C | C |
| B | A081 | *Circus aeruginosus* | c | 1 | 5 | i | P | P | D | | | |
| B | A082 | *Circus cyaneus* | w | 1 | 2 | i | V | P | D | | | |
| B | A084 | *Circus pygargus* | c | 1 | 5 | i | R | P | D | | | |
| B | A091 | *Aquila chrysaetos* | p | 2 | 3 | p | P | G | C | A | C | B |
| B | A095 | *Falco naumanni* | c | 5 | 10 | i | | P | D | | | |
| B | A097 | *Falco vespertinus* | c | 0 | 20 | i | P | M | D | | | |
| B | A098 | *Falco columbarius* | w | 0 | 1 | i | V | P | D | | | |
| B | A103 | *Falco peregrinus* | p | 1 | 2 | p | P | G | C | B | C | B |
| B | A123 | *Gallinula chloropus* | p | 5 | 10 | p | R | P | C | B | C | C |
| B | A155 | *Scolopax rusticola* | w | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A155 | *Scolopax rusticola* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A166 | *Tringa glareola* | c | 1 | 5 | i | | P | D | | | |
| B | A168 | *Actitis hypoleucos* | c | 1 | 10 | i | R | P | D | | | |
| B | A179 | *Larus ridibundus* | w | 100 | 200 | i | C | P | C | B | C | C |
| B | A215 | *Bubo bubo* | p | 1 | 2 | p | P | G | C | B | C | B |
| B | A223 | *Aegolius funereus* | p | 0 | 1 | p | P | P | C | B | B | C |
| B | A224 | *Caprimulgus europaeus* | r | 200 | 300 | p | C | P | C | A | C | A |
| B | A229 | *Alcedo atthis* | p | 1 | 2 | p | P | M | D | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A231 | *Coracias garrulus* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A236 | *Dryocopus martius* | p | 8 | 12 | p | P | M | D | | | |
| B | A243 | *Calandrella brachydactyla* | r | 2 | 3 | p | V | M | C | C | A | C |
| B | A246 | *Lullula arborea* | p | 300 | 400 | p | P | P | C | A | C | A |
| B | A255 | *Anthus campestris* | r | 200 | 300 | p | C | M | C | A | C | A |
| B | A302 | *Sylvia undata* | p | 60 | 70 | p | R | M | C | B | C | C |
| B | A338 | *Lanius collurio* | r | 150 | 200 | p | P | M | C | A | C | A |
| B | A338 | *Lanius collurio* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A346 | *Pyrrhocorax pyrrhocorax* | p | 20 | 30 | p | P | M | C | B | C | B |
| B | A379 | *Emberiza hortulana* | r | 200 | 300 | p | P | P | C | A | C | A |
| B | A379 | *Emberiza hortulana* | c | | | i | R | DD | D | | | |
| B | A661 | *Tetrao urogallus aquitanicus* | p | 5 | 10 | males | P | M | C | C | B | C |
| B | A727 | *Eudromias morinellus* | c | 10 | 50 | i | R | P | C | B | C | C |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

## 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | | | Population présente sur le site | | | | Motivation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique | Taille | | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. | | Autres catégories | | | |
| | | | Min | Max | | C\|R\|V\|P | IV | V | A | B | C | D |
| B | | *Falco subbuteo* | 1 | 5 | p | P | | | | | X | |
| B | | *Accipiter gentilis* | 1 | 5 | p | P | | | | | X | |
| B | | *Coturnix coturnix* | 7 | 14 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Streptopelia turtur* | 0 | 4 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Otus scops* | 10 | 23 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Athene noctua* | 1 | 5 | p | P | | | | | X | |
| B | | *Upupa epops* | 39 | 86 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Jynx torquilla* | 10 | 35 | grids1x1 | R | | | | | X | |
| B | | *Picus viridis* | 48 | 114 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Cinclus cinclus* | 9 | 17 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Phoenicurus phoenicurus* | 1 | 20 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Oenanthe oenanthe* | 37 | 49 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Oenanthe hispanica* | 0 | 1 | p | V | | | X | | | |
| B | | *Monticola saxatilis* | 15 | 28 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Monticola solitarius* | 4 | 9 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Sylvia conspicillata* | 5 | 10 | p | V | | | X | | X | |
| B | | *Sylvia hortensis* | 19 | 52 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Sylvia communis* | 54 | 68 | grids1x1 | | | | | | X | |
| B | | *Parus ater* | 47 | 70 | grids1x1 | | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | *Lanius senator* | 1 | 2 | p | V | | | | | X | |
| B | | *Petronia petronia* | 1 | 1 | grids1x1 | V | | | | | X | |
| B | | *Serinus citrinella* | 4 | 9 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Carduelis cannabina* | 34 | 72 | grids1x1 | | | | X | | X | |
| B | | *Emberiza citrinella* | 17 | 32 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Emberiza cia* | 20 | 47 | grids1x1 | P | | | | | X | |
| B | | *Miliaria calandra* | 10 | 16 | grids1x1 | | | | | | X | |
| B | | *Lanius meridionalis* | 1 | 5 | p | V | | | X | | X | |

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

# 4. DESCRIPTION DU SITE

## 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) | 1 % |
| N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana | 10 % |
| N09 : Pelouses sèches, Steppes | 30 % |
| N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées | 2 % |
| N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) | 1 % |
| N15 : Autres terres arables | 1 % |
| N16 : Forêts caducifoliées | 10 % |
| N17 : Forêts de résineux | 10 % |
| N18 : Forêts sempervirentes non résineuses | 10 % |
| N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) | 1 % |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 23 % |
| N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 1 % |

### Autres caractéristiques du site

Zone de plateaux karstiques entrecoupés de vallées encaissées (gorges).

Vulnérabilité
: - Disparition des pelouses par embroussaillement et reforestation naturelle suite à la déprise pastorale.
- Fort développement de la fréquentation et des sports de plein air susceptibles de causer des dérangements, le site étant à proximité immédiate de la zone urbanisée du littoral des Alpes-Maritimes (escalade, parapente, VTT, randonnée...).
- Site traversé par de nombreuses lignes électriques (THT, moyenne et basse tension).
- Présence de ranchs : la divagation mal contrôlée des chevaux peut engendrer une détérioration des milieux.

## 4.2 Qualité et importance

Grande variété de milieux, faciès rupicoles des falaises, zones karstiques, présentant une grande richesse écologique. L'hétérogénéité de la couverture végétale est importante. Les pelouses à caractère steppique alternent avec les milieux forestiers et quelques ripisylves. Ces conditions sont favorables à la présence d'une avifaune riche et variée inféodée aux zones ouvertes ou fermées ou utilisant les deux.

Les falaises des bordures du site présentent des sites de nidification favorables à diverses espèces patrimoniales : Aigle royal, Faucon pèlerin, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Grand-duc d'Europe, Crave à bec rouge. Les plateaux constituent leurs territoires de chasse.

Les pelouses à caractère steppique des plateaux, alternant avec des zones boisées, sont favorables à l'Engoulevent d'Europe, l'Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Pie-grièche écorcheur, le Bruant ortolan, le Pipit rousseline.

Certaines espèces d'affinité montagnarde, telles que le Tétras lyre ou la Chouette de Tengmalm, sont en limite méridionale de leur aire de répartition naturelle, ce qui leur confère une certaine originalité.

Les vallées sont utilisées comme couloirs de migration.

Espèces nichant à proximité et utilisant le site comme zone d'alimentation : Vautour fauve et Vautour moine (population du Verdon).

## 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04.03 | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage | | I |
| H | G01.05 | Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon | | O |
| H | G05.01 | Piétinement, surfréquentation | | I |
| L | F03.01 | Chasse | | I |
| L | G01.02 | Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés | | I |
| M | D02.01 | Lignes électriques et téléphoniques | | I |
| M | G01.03 | Véhicules motorisés | | I |
| M | G01.04 | Alpinisme, escalade, spéléologie | | I |
| M | G01.05 | Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon | | I |
| Incidences positives | | | | |
| Importance | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i\|o\|b] |
| H | A04 | Pâturage | | I |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

## 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|
| Propriété privée (personne physique) | 70 % |
| Domaine communal | 23 % |
| Domaine départemental | 3 % |
| Domaine privé de l'état | 4 % |

## 4.5 Documentation

BOET & BOET. 1987. Statut de l'avifaune des environs de Vence (Alpes-Maritimes). Riviera scientifique.

LPO PACA. 2014. Inventaire et cartographie de l'avifaune du site Natura 2000 ZPS « Préalpes de Grasse ».

Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|
| 13 | Terrain acquis par un département | 3 % |
| 32 | Site classé selon la loi de 1930 | 35 % |
| 21 | Forêt domaniale | 4 % |
| 22 | Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier | 10 % |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|
| 32 | Les Baous : extension du classement | * | 28% |
| 32 | Les Baous : ensemble formé par l'arrière pays | * | 7% |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|---|---|---|---|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA)

Adresse : Les Genêts - 449, route des Crêtes 06901 Sophia Antipolis Cedex

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1370_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

## 6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs commun avec ceux des deux sites FR9301570 et FR9301571. Ces deux DOCOB sont finalisés et approuvés par le Préfet des Alpes Maritimes.