NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9312012 - Plateau de Valensole

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 10
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 11
6. GESTION DU SITE 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9312012

1.3 Appellation du site

Plateau de Valensole

1.4 Date de compilation

31/10/2005

1.5 Date d'actualisation

15/12/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345533

Explication(s) :

MAJ 2007-07 : ? MAJ 2015-08 : conversion surface en lamb93. Actualisation listes espèces selon DOCOB (2013) et datas LPO 2014. MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca).

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 6,07778°

Latitude : 43,815°

2.2 Superficie totale

44712 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
04	Alpes-de-Haute-Provence	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
04004	ALLEMAGNE-EN-PROVENCE
04035	BRUNET
04081	ESPARRON-DE-VERDON
04094	GREOUX-LES-BAINS
04124	MONTAGNAC-MONTPEZAT
04135	MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
04157	PUIMOISSON
04158	QUINSON
04166	RIEZ
04172	ROUMOULES
04176	SAINTE-CROIX-DU-VERDON
04184	SAINT-JURS
04186	SAINT-LAURENT-DU-VERDON
04189	SAINT-MARTIN-DE-BROMES
04230	VALENSOLE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	30	50	i		M	C	B	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	10	50	i	R	M	C	B	C	C
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	10	50	i		M	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	50	100	i		P	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	R	DD	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c			i	R	DD	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	c	10	50	i		P	D			

B	A052	*Anas crecca*	c	10	20	i		M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	50	100	i		M	D			
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	10	20	p	C	P	C	B	C	C
B	A059	*Aythya ferina*	w	100	150	i	R	M	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	w	10	30	i		M	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	R	DD	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	r	2	3	p	P	M	D			
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	R	DD	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	C	DD	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	R	DD	D			
B	A077	*Neophron percnopterus*	c	1	5	i	P	P	C	C	C	C
B	A078	*Gyps fulvus*	c	10	50	i	P	P	C	C	C	C
B	A079	*Aegypius monachus*	c			i	V	DD	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	3	5	p	P	P	C	B	C	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	R	DD	D			
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	R	DD	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	w	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	C	DD	C	B	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	r	5	10	p	P	M	C	C	C	B
B	A084	*Circus pygargus*	c	10	50	i	P	P	C	B	C	B
B	A091	*Aquila chrysaetos*	p	1	1	p	P	G	C	B	C	C
B	A095	*Falco naumanni*	c	30	150	i		M	A	B	B	B
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	R	DD	D			

B	A098	*Falco columbarius*	w	1	3	i	P	P	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	R	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	p	0	1	p		G	C	B	C	C
B	A118	*Rallus aquaticus*	p	1	5	p	P	P	C	B	C	C
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	5	10	p	C	P	D			
B	A125	*Fulica atra*	w	100	150	i		M	C	B	C	C
B	A125	*Fulica atra*	r	1	5	p		P	D			
B	A127	*Grus grus*	c			i	V	DD	D			
B	A128	*Tetrax tetrax*	r	5	10	males	P	G	C	C	C	B
B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	30	50	p	P	M	C	B	C	B
B	A140	*Pluvialis apricaria*	c	50	100	i	V	P	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	100	200	i	P	P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	R	DD	D			
B	A155	*Scolopax rusticola*	w			i	R	DD	D			
B	A160	*Numenius arquata*	c	1	10	i		P	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	R	DD	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	R	DD	D			
B	A215	*Bubo bubo*	p	1	3	p	P	M	C	B	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	20	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p	1	5	p	P	P	D			
B	A231	*Coracias garrulus*	r	1	5	p	P	M	C	B	C	C
B	A236	*Dryocopus martius*	p			i	R	DD	D			
B	A242	*Melanocorypha calandra*	c			i	V	DD	D			

B	A243	*Calandrella brachydactyla*	r	1	2	p	P	M	C	C	B	C
B	A246	*Lullula arborea*	p	100	200	p	P	M	C	B	C	B
B	A255	*Anthus campestris*	r	80	150	p	P	M	C	B	C	B
B	A302	*Sylvia undata*	p	50	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	r	50	100	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	R	DD	D			
B	A346	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	w	100	300	i		M	C	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	r	550	1200	p	P	M	B	B	C	B
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	C	DD	D			
B	A661	*Tetrao urogallus aquitanicus*	p			i	V	DD	D			
B	A727	*Eudromias morinellus*	c	50	100	i	R	P	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c	500	1000	i		P	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	29	38	grids1x1	P					X	

B		*Coturnix coturnix*	49	73	grids1x1	P					X	
B		*Streptopelia turtur*	55	80	grids1x1	P					X	
B		*Otus scops*	48	75	grids1x1	P					X	
B		*Athene noctua*	14	23	grids1x1	P					X	
B		*Merops apiaster*	10	20	p	P					X	
B		*Upupa epops*	53	85	grids1x1	P					X	
B		*Jynx torquilla*	2	5	grids1x1	P					X	
B		*Picus viridis*	34	68	grids1x1	P					X	
B		*Galerida cristata*	22	29	grids1x1	P					X	
B		*Cinclus cinclus*	1	3	grids1x1						X	
B		*Phoenicurus phoenicurus*	2	6	grids1x1	P					X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*	1	5	p	R			X			
B		*Sylvia conspicillata*	200	400	p	P			X			
B		*Sylvia communis*	5	14	grids1x1						X	
B		*Parus ater*	7	12	grids1x1						X	
B		*Lanius senator*	1	3	p	V					X	
B		*Passer montanus*	3	6	grids1x1	P					X	
B		*Petronia petronia*	34	52	grids1x1	P					X	
B		*Carduelis cannabina*	27	42	grids1x1				X			
B		*Miliaria calandra*	60	93	p						X	
B		*Lanius meridionalis*	5	10	p	R			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	20 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	10 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	15 %
N15 : Autres terres arables	15 %
N16 : Forêts caducifoliées	10 %
N17 : Forêts de résineux	6 %
N19 : Forêts mixtes	20 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

Terrasse alluviale au substrat relativement tendre, perméable et favorable à l'érosion. Ces alluvions correspondent à deux époques géologiques : le socle du plateau est un immense cône de déjection (marnes, graviers, galets) de la fin du crétacé et du début du tertiaire, surmonté par d'épaisses couches de conglomérats (poudingues) de la fin de l'ère tertiaire. Le climat, aride, est caractérisé par un déficit hydrique estival, un fort ensoleillement, des gelées printanières et des vents violents.

Vulnérabilité
: - réduction des milieux prairiaux et des haies et disparition des corridors.
- intensification des pratiques culturales.
- risque incendie permanent, accentué par les vents réguliers et parfois très violents qui soufflent sur le plateau.
- lignes électriques : risques de collision et d'électrocution pour l'avifaune.
- lignes téléphoniques : poteaux métalliques creux induisant un risque de mortalité pour certaines espèces cavernicoles (ex : Chevêche d'Athena). Les oiseaux en quête de cavités pour nicher y pénètrent mais ne peuvent plus en ressortir (diamètre réduit et parois lisses).

4.2 Qualité et importance

Le site de Valensole (plateau et alentour) est particulièrement remarquable par la présence d'environ 160 espèces d'oiseaux, dont une quarantaine d'espèces sont inscrites en annexe I de la Directive " Oiseaux ", parmi lesquelles figurent plusieurs espèces de forte valeur patrimoniale dont la répartition est très localisée et fragmentée en France.
Le plateau présente un paysage agricole très ouvert, devenant plus bocager à proximité des vallons formés par le Colostre et ses affluents. Les versants sont principalement constitués de boisements de chênes et de pins, entrecoupés de clairières. Les secteurs très ouverts sont particulièrement favorables aux oiseaux d'affinités steppiques (Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré), tandis que les secteurs plus fermés accueillent des oiseaux forestiers ou bocagers (Circaète Jean-le-blanc, Pie-grièche écorcheur).

Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de l'Outarde canepetière (5-10 mâles chanteurs), en déclin sur le site (16 mâles chanteurs en 1998, 12 en 2000, 6 en 2012). Il accueille également une population nicheuse d'importance nationale pour la Fauvette à lunettes, et le Bruant ortolan. Il accueille en été un dortoir post-nuptial important pour le Faucon crécerellette (33 individus en 2011, 150 individus en 2012).

Sur sa bordure sud, la ZPS intègre une partie du cours d'eau du Verdon (plan d'eau entre le barrage de Sainte-Croix et Quinson) fréquenté par quelques oiseaux inféodés aux zones humides (grèbes, canards, foulques...).

Espèces nichant hors périmètre mais fréquentant régulièrement le site pour s'alimenter : Vautour fauve, Vautour moine (très rare), Vautour Percnoptère (très rare), Milan noir.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		I
H	J01.01	Incendies		I
M	A02.01	Intensification agricole		I
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	91 %
Domaine communal	3 %
Domaine de l'état	6 %

4.5 Documentation

Etudes réalisées par le PNR Verdon.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
80	Parc naturel régional	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
80	Verdon	-	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PNR Verdon

Adresse : Domaine de Valx 04360 Moustiers-Sainte-Marie

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1697_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

programmes spécifiques de conservation conduits par le PNR Verdon et par d'autres structures (Outarde canepetière, etc).