NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR9312015 - Étangs entre Istres et Fos

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR9312015

1.3 Appellation du site

Étangs entre Istres et Fos

1.4 Date de compilation

31/10/2005

1.5 Date d'actualisation

15/12/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.provence-alpes-cote-d'azur.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345533

Explication(s) :

MAJ 2007-07 : ? MAJ 2015-08 : conversion surf en Lamb93. Actualisation listes espèces selon DOCOB (2011) et datas LPO 2014. MAJ 2017-08 : actu espèces selon bases régionales (silene + faune-paca).

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,99722°

Latitude : 43,445°

2.2 Superficie totale

1222 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
93	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
13	Bouches-du-Rhône	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
13039	FOS-SUR-MER
13047	ISTRES
13077	PORT-DE-BOUC
13098	SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site					Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w	100	150	i	P	M	C	A	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r	20	30	p	P	M	C	A	C	B
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c	100	850	i	P	M	C	A	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	w	30	60	i	P	M	C	A	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	r	20	30	p	P	M	C	A	C	B
B	A005	*Podiceps cristatus*	c			i	C	P	C	A	C	B
B	A007	*Podiceps auritus*	w	0	1	i	V	M	D			
B	A007	*Podiceps auritus*	c			i	V	P	D			
B	A008	*Podiceps nigricollis*	w	100	300	i	P	M	C	A	C	B

B	A008	*Podiceps nigricollis*	r	0	10	p	P	M	C	C	C	B
B	A008	*Podiceps nigricollis*	c			i	R	P	C	A	C	B
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	100	200	i	P	P	C	B	C	C
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c			i	R	DD	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A021	*Botaurus stellaris*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	5	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	20	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A024	*Ardeola ralloides*	c			i	R	P	D			
B	A025	*Bubulcus ibis*	w			i	R	P	C	B	C	C
B	A025	*Bubulcus ibis*	c			i	C	P	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w	40	140	i	P	M	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c			i	C	P	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	p	5	10	p	P	M	C	B	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	r	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	R	P	D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	0	10	i		M	C	B	C	C
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	w	100	200	i	P	M	C	B	C	B
B	A035	*Phoenicopterus ruber*	c	100	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	p	20	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	10	50	i	P	P	C	B	C	B

B	A048	*Tadorna tadorna*	r	15	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	50	100	i	C	P	C	B	C	B
B	A052	*Anas crecca*	w	10	50	i	R	P	C	B	C	C
B	A052	*Anas crecca*	c	100	200	i	R	P	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	50	150	i	P	M	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	30	80	p	C	M	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	C	P	D			
B	A054	*Anas acuta*	w	0	10	i	R	P	C	B	C	C
B	A054	*Anas acuta*	c	10	50	i	R	P	D			
B	A058	*Netta rufina*	w	50	100	i	R	P	C	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	r	10	15	p	P	M	C	B	C	B
B	A058	*Netta rufina*	c	100	200	i	R	P	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	w	500	2250	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	*Aythya ferina*	r	0	2	p	P	M	D			
B	A060	*Aythya nyroca*	w	0	4	i	V	M	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	1000	1500	i	P	M	B	B	C	B
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	C	P	C	B	C	B
B	A069	*Mergus serrator*	w	10	20	i	R	P	C	B	C	B
B	A072	*Pernis apivorus*	c			i	R	P	D			
B	A073	*Milvus migrans*	r	0	1	p	P	M	D			
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	C	P	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	R	P	D			
B	A080	*Circaetus gallicus*	c			i	R	P	D			

B	A081	*Circus aeruginosus*	w	1	5	i	P	M	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	r	0	2	p	P	M	C	B	C	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w			i	R	P	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	R	P	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	w	0	1	i	V	P	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	0	5	i	R	P	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	R	P	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	p	2	4	grids1x1	C	P	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	R	DD	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	p	40	80	p	P	M	D			
B	A124	*Porphyrio porphyrio*	p	3	4	p		M	B	B	B	B
B	A125	*Fulica atra*	w	3000	6500	i		M	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r	100	200	p	P	M	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	c			i	C	DD	D			
B	A130	*Haematopus ostralegus*	w	0	5	i	R	P	C	B	C	B
B	A130	*Haematopus ostralegus*	r	2	3	p	P	M	C	C	C	B
B	A130	*Haematopus ostralegus*	c	10	20	i	R	P	C	B	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	r	10	20	p	P	M	C	C	C	B
B	A131	*Himantopus himantopus*	c	100	500	i	C	P	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	w	0	30	i	R	M	C	B	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	r	0	44	p	P	G	C	C	C	B
B	A132	*Recurvirostra avosetta*	c	20	50	i	R	P	C	B	C	B

B	A133	*Burhinus oedicnemus*	r	1	2	p	P	M	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	r	1	3	p	P	M	D			
B	A136	*Charadrius dubius*	c	10	50	i	R	P	D			
B	A137	*Charadrius hiaticula*	c	10	50	i	R	P	D			
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	r	0	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A138	*Charadrius alexandrinus*	c	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A141	*Pluvialis squatarola*	c	0	10	i	R	P	D			
B	A142	*Vanellus vanellus*	c	10	50	i		P	D			
B	A145	*Calidris minuta*	c	0	50	i	C	P	D			
B	A147	*Calidris ferruginea*	c	10	20	i	R	P	D			
B	A149	*Calidris alpina*	c	50	100	i	C	P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	w	0	10	i		P	D			
B	A153	*Gallinago gallinago*	c			i	R	P	D			
B	A157	*Limosa lapponica*	c	0	10	i	R	P	D			
B	A158	*Numenius phaeopus*	c	0	10	i	V	P	D			
B	A162	*Tringa totanus*	w	0	5	i	P	M	D			
B	A162	*Tringa totanus*	r	0	1	p	P	M	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	10	50	i	R	P	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	10	20	i	R	P	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c			i	R	P	D			
B	A166	*Tringa glareola*	c			i	R	P	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	1	10	i	R	P	C	B	C	C

B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	10	50	i	C	P	C	B	C	C
B	A169	*Arenaria interpres*	c	0	5	i	R	P	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	w	500	1000	i	P	M	B	B	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	r	0	16	p	P	M	C	C	C	B
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	1000	2000	i	P	M	B	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	w	500	1000	i	C	P	C	B	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	r	0	34	p	P	G	C	C	C	B
B	A179	*Larus ridibundus*	c	500	1000	i	C	P	C	B	C	B
B	A180	*Larus genei*	w	10	50	i		M	A	B	C	B
B	A180	*Larus genei*	r	0	1	p	V	G	C	B	C	C
B	A180	*Larus genei*	c			i	R	P	D			
B	A182	*Larus canus*	c			i	R	P	D			
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c			i	R	P	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	3	74	p	P	G	C	C	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c	50	100	i	C	P	C	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c			i	R	P	D			
B	A215	*Bubo bubo*	p	0	2	p	P	M	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	R	P	D			
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	3	5	p	P	M	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	1	2	p	P	M	C	B	C	B
B	A231	*Coracias garrulus*	r	0	4	p		P	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	p	1	5	p	P	M	D			

B	A255	*Anthus campestris*	r	1	5	p	P	M	D			
B	A293	*Acrocephalus melanopogon*	w			i	R	P	C	B	C	B
B	A293	*Acrocephalus melanopogon*	r	8	15	p	P	M	C	C	C	B
B	A302	*Sylvia undata*	p	2	2	grids1x1	R	P	D			
B	A707	*Aquila fasciata*	c			i	R	P	D			
B	A773	*Ardea alba*	w	10	20	i	P	M	C	B	C	B
B	A773	*Ardea alba*	c			i	R	P	C	B	C	B
B	A855	*Mareca penelope*	w	10	50	i	R	P	C	B	C	C
B	A855	*Mareca penelope*	c	50	100	i	R	P	C	B	C	C
B	A856	*Spatula querquedula*	c	50	100	i	R	P	C	B	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	w	50	100	i	P	P	C	B	C	C
B	A857	*Spatula clypeata*	r	0	1	p	R	M	D			
B	A857	*Spatula clypeata*	c	100	500	i	R	P	C	B	C	C
B	A861	*Calidris pugnax*	c	0	10	i	R	P	D			
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	w	1	25	i	P	M	C	B	C	B
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	r	0	1	p		G	C	B	C	C
B	A863	*Thalasseus sandvicensis*	c	50	100	i	R	P	C	B	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	r	0	73	p	P	G	C	C	C	B
B	A885	*Sternula albifrons*	c	10	50	i	C	P	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	w	50	100	i	P	P	C	B	C	C
B	A889	*Mareca strepera*	r	20	30	p	P	M	C	B	C	B
B	A889	*Mareca strepera*	c	100	200	i	R	P	C	B	C	C
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	C	DD	D			

B	A604	*Larus michahellis*	c			i	C	DD	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Falco subbuteo*	1	3	p	P					X	
B		*Streptopelia turtur*	2	5	grids1x1	P					X	
B		*Clamator glandarius*	1	2	p	R					X	
B		*Otus scops*	1	4	p	P					X	
B		*Picus viridis*	3	12	grids1x1	P					X	
B		*Remiz pendulinus*			i	R			X			
B		*Acrocephalus arundinaceus*	30	60	p	P			X			
B		*Panurus biarmicus*	2	2	grids1x1	P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées	5 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	45 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	10 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	10 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	3 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	5 %
N15 : Autres terres arables	5 %
N19 : Forêts mixtes	15 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

Ce secteur, enclavé entre sites industriels et agglomérations urbaines, est composé d'un ensemble de basses collines entre lesquelles s'intercalent plusieurs zones humides (étangs et salins) de taille et d'aspect divers, ainsi que quelques parcelles à vocation agricole.

Vulnérabilité
: - eutrophisation / pollution : les étangs du Pourra et de Citis sont des cuvettes endoréique, ne possédant pas d'exutoire, et dont le niveau se trouve à une altitude négative. Ceci les rend plus sensibles aux phénomènes de concentration de polluants (l'absence d'exutoire provoque une accumulation dans le limon des polluants ne pouvant s'évaporer). De par le caractère à la fois urbanisé et industrialisé des abords du site, le risque de pollution est important.

- fortes pressions liées à l'urbanisation et l'industrialisation des communes limitrophes.

- abandon des salins : le maintien des salins est primordial pour conserver la richesse ornithologique du site. L'activité salinière ou toute autre activité favorable à ces milieux singuliers doit être favorisée.

- régression des activités agricoles : la vocation agricole de certains secteurs du site mérite d'être maintenue pour conserver une mosaïque de milieux favorables à l'avifaune.

- surfréquentation : le site est enclavé entre plusieurs agglomérations et est très fréquenté par les promeneurs. Une canalisation de la fréquentation au printemps permettrait de préserver certains secteurs sensibles, afin que les oiseaux puissent nicher sans être effarouchés. Les espèces nichant à même le sol sont les plus sensibles au dérangement.

- risque incendie sur les collines boisées.

- réseau de lignes électriques induisant des risques de collision et d'électrocution pour l'avifaune.

4.2 Qualité et importance

Du fait de sa situation littorale, entre la mer et l'Etang de Berre, ce secteur est fréquenté par de nombreuses espèces patrimoniales, notamment des oiseaux inféodés aux zones humides. Malgré le caractère industriel de ses abords, le site accueille ainsi près de 200 espèces d'oiseaux, dont environ 40 espèces d'intérêt communautaire.

La présence de divers types d'habitats, secs ou humides, complémentaires et agencés en mosaïque, permet la coexistence d'une avifaune aquatique et d'une avifaune méditerranéenne xérophile.

Le site présente un intérêt marqué pour l'hivernage des oiseaux d'eau. Il constitue un secteur majeur au sein du complexe de zones humides liées à l'Etang de Berre, qui accueille chaque hiver des milliers d'oiseaux d'eau. Ce sont les étangs de Citis, Pourra, l'Estomac/salins de Fos qui recueillent l'essentiel du peuplement (environ 97 % des effectifs) composé principalement de grèbes (huppés et castagneux), de flamants roses, de canards plongeurs, de foulques et de Laridés. Concernant le Fuligule morillon, le site accueille 1000 à 1500 individus, soit 50% des effectifs hivernants de la région PACA.

La ZPS accueille quelques couples nicheurs de Grèbe à cou noir, soit la seule population nicheuse régulière de la région PACA.

Espèces nichant hors périmètre mais fréquentant le site pour s'alimenter, notamment en période de reproduction : Bihoreau gris, Crabier chevelu, Circaète Jean-le-Blanc, Aigrette garzette, Héron garde-boeufs.

Remarque concernant la Mouette mélanocéphale : 80 à 100 couples ont tenté de se reproduire en mai 2002 sur les salins de Fos. Aucune reproduction n'a été observée en 2005, 16 couples on niché en 2007, mais 1 seul en 2010. Noyau de population présentant des effectifs très variables.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	D01.02	Routes, autoroutes		I
H	H01	Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)		I
H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
H	J02	Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
H	L09	Incendie (naturel)		I
M	D02.01	Lignes électriques et téléphoniques		I
M	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	C01.05	Salines		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Collectivité territoriale	%

Domaine communal	%
Domaine privé de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	5 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	28 %
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	25 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	Ferme de Ranquet	/	5%
31	Site Inscrit : Champ de fouilles (abords)	/	28%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Animateur N2000 : Com. Agglo. Pays de Martigues

Adresse : Rond-point de l'Hôtel de ville - BP 90104 13693 Martigues cedex

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1700_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation